Anthenfluum

Antherylium Rohr in Act. hist. Nat. Hafn: 2. p. 1. pag 211.

Character essentialis
Calyx inferus quadri partitus. Corolla 4 petala. Capsula 1locularis, 3 valvis

Rohrii ~~[illegible]~~ Vahlii Antherylium Vahl l. c. pag. 212 tab. 8.
Habitat in Insula St. Thoma Indiae Occidentalis Dn. v. Rohr et West. ♄
Arbor. Rami teretes, glabri, e casu foliorum tuberculati. Ramuli subopposit, inferne tereticusculi, superne a lineis decurrentibus subtetragoni, lateribus duabus oppositis convexis, duabus sulco exarati
Folia petiolata, opposita vel alterna, ovata interdum obovata, integerrima, subemarginata.
Aculeus brevis ad singulum latus petioli
Pedunculi 5–8, axillares, uniflori
Stamina 12–16 calyci inserta
(Affinis Legnoti Sw. et Crenea Aubleti

182.
~~171 172~~

no 4.

~~tetragantha Crenea~~

Antherylium ~~fig~~ Tab. 8.

Rami ~~inferne~~ teretes, e casu foliorum tuberculati, cortice cinereo: ramuli ~~alterni~~ oppositi, glabri, inferne teretes, aphylli, superne foliosi, e lineis quatuor a basi aculeorum decurrentibus ~~tetragoni lateribus oppositis angustioribus foliis utrinque latis~~ subtetragoni, lateribus duobus oppositis foliis exaratis angustioribus, duobus convexioribus, sub foliis parum dilatati.

Aculeus brevis, rectus, patens; utrinque ad latus singuli petioli, in ramis senescentibus evanescens.

Folia breviter petiolata, bipollicaria, ovata, acuta, interdum obovata subemarginata cum mucrone, glaberrima, venosa, nervosa, nervo marginem haud attingente, integerrima, membranacea, nitidiuscula.

Pedunculi axillares, e gemma destinita, 5–8, pauciores saepe ab altero latere, unguiculares uniflori, filiformes; sub flore parum crassiores.

Habitu haud dissimilis ~~Legno~~ et Legnoti Swartzii diversa vera insertione petalorum ~~foliorum~~ et staminum, ~~capsulaque non ad Creneam~~ Cum in plurimis convenit et habitu satis consentit cum Crenea ~~Cono~~ Aubl. forte species ejus generis erat quamvis Celeb. von Rohr capsulam uniloculatam esse dixit, quae in Crenea ~~bi~~ quinque loculari

est secundum Aubletium. In alia vero descriptione Anthenylii, a Dr. Rectore West missa, capsula ei tribuitur semitrilocularis. ~~Receptaculum~~ Quantum video est speciminibus missis, receptaculum seminum magnum triquetrum ~~mediante~~ angulis usque ad parietes valvularum extensis, ~~inde~~ capsulam ~~sic~~ quasi in tri~~bus~~ a loculamenta dividit, ~~inde que forte trilocularem dixit Aubletius~~

~~Sic 4 Si placet sub uno genere Prenea est vero differentia duarum specierum sufficit erit. Plantae videtur sub genere [illegible] notitiam fructus Preneae [illegible] et genus [illegible] quamvis [illegible] haud ubique descriptioni Aubletii fidendae haud ubique habeatur [illegible] fidendae sint~~

#Ambiguum itaque genus erit Anthenylium usque notitia ~~[illegible]~~ vera fructus Prenea habeatur, quamvis descriptiones Aubletii haud ubique ~~fidendae~~ credendae sint.

Anthirrinum vide Spreng. cat. affine purpureo an nudo ronet

Caulis tripedalis erectus strictus teres superne in ramos simplicis floriferos divisus, glaber laevis glauco purpureo ~~ro~~ violaceo maculatus. folia inferiora quaterna caulis ~~alterna~~ sparsa patula viridi glaucescentia pollicaria lanceolata. Racemus terminalis. Racemus semipedalis, multiflorus. Flores sparsi patuli bracteae lineares pedicello longiores foliola calycis lineares. Corolla Anth- purpurea labium inferius albido flavescens palato intensius colorato superius ~~albidum~~ purpureis interdum evanescentibus. ~~palatum villosum~~ ~~labium~~ inferius infra palato villosum tubus longitudine corollae parum curvatum

polystachyos C. culmo triquetro, involucro polyphyllo, panicula termi-
nali, subsessili ramosissima, spiculis lineari-lanceolatis complanatis
confertissimis Rottb. gram. pag. 39. tab. 11. fig. 1.

Habitat in India orientali bosi[?] foliosus

Culmus sesquipedalis, striatus. Folia ad basin plura, linearia, carinata,
vaginis purpurascentibus, caeterum glauca. Pedunculi
umbellati confertissimi, brevissimi, ramosissimi [illegible] ad spiculae subsessiles
in capitulo. Involucri foliola circiter 6. alterna, conferta lineari
lanceolata, pedunculis quadruplo umbella 2-3plo longiora carinata. Ochrea oblique
truncata bidentata. Spicae confertissimae, triangulares lineari
lanceolatae, acutae, compressae. Squamae circiter 20 obtusae
testaceae. Stigmata 3.

pedunculis 3-4plo longiora

umbella terminali subsessili multiflora involucro
subhexaphyllo

panicula longiore pedunculis pedi[?]

callis[?] qua brevissimis, spiculis

similis cypero vegeto at squamae obtusae enervia