

72  
74. Anthoxanthum. Cal. gluma 2-valvis, 1-flora. Cor. gluma 2-valvis, <sup>anitata</sup> anitata  
stata ~~semit~~

Del. A. vellar

Protera phytographia Lusitaniae Lubano, 1801.

J. C. W. Busch über die Fortschritte, unternommenen Entdeckungen  
etc.

Anthoxanthum

# Anthoxanthum?

1. *donatum* A. spica oblonga, glomeris subpedunculatis arcta longioribus.
2. *crinitum* A. panicula spiciformi cylindrica angusta: arctis longis  
habentibus ceteris

Capellare *Arthoxanthum*

Habitat in Canada Michaux herb. Musc.

Culmi semipedales, simpliciter. Folia plurima radicalia, setacea, palmatis,  
2-3. in culmo, supremum basi subspathaceo, Panicula longiore. Panicu-  
la patens, glaberrima, linearis, acuta. Corolla calycis longior. Spicula  
1 flora

giganteum A. panicula conferta, fasciculis aristatis plumosis Wal

fl. car. pag 65

Habitat in Carolina

Panicula magna Culmus & pedalis

non-vidi

paniculatum Anthoxanthum floribus paniculatis L.V. p. 73-5. Amon. Acad. 1  
pag. 145. Spet. pl. p. 403.

gramen praetense paniculatum flavescens Rudb. Elyf. 1. f. 14.  
Habitat in Europa australiore, ut in Monte Dei Mospelenji

mollis A. foliis tomentosis, foliolis calycis et venis patulis

Hort. Vew. 2. p. 459.

Habitat in America 5

odoratum 1. Anthoxanthum spica ovato-oblonga, flosculis subpedunculatis aristae longioribus Lin. Syst. veg. Schreb. gr. 49. t. 5. Willd. Cl. misc. 1. Less. fl. herb. 25. t. 2. f. 11. Smith. fl. angl. 1. p. 31

Gram. Anthoxanthum Lalich.

Gramen pratense spica flavescente Bauh. Theatr. 93. Schaeubr. G. gr.

CC.

B. Spica lupulina ~~gramen~~ spica laxiori; ramosa Hall. hist. n.

Gramen montanum, odoratum spicatum Loes. fl. pr. 110. ii. 22.

V. glumis calycinis pubescentibus Loes. fl. herb. 25.

Habitat in Europa pratis, inque Pennsylvania et Europa advena

Culmus semipedalis vel pedalis. Folio plerumque radicalia, unicium  
# striato vel duo in culmo, pollicaria vel ultra, culmi vix unguicularia,  
plana, attenuata, late viridia: vaginis longis, amplis, <sup>parum</sup> uti basi folio  
rum interdum raris pilosis: Ligula lanceolata, arida. Spica term  
pollicaria vel ultra, acuta. Calycis glumis, interdum pilosis, interior  
brevior. Corolla valvula aequali, versus basin aristata; aristae albica  
longior, geniculata.

Nectarium diphyllum, varis semum, cylindricum: foliis puberatis,  
amplexantibus Schreber.

Ex plicata odore fere Asperula odorato gaudet

~~Uterque Siphneum potius eniformibus fere aliorum panicula erecta  
Siphneum utriusque Siphneum eniformibus conduplicatis longis  
panicula trichotoma, pedalis est, ramis dimidio munitis  
pedic. p. 61.  
Abdit in novo Zeelandia  
Tota equidantia arguente nullatenus glabra. Caput erectum  
in medio folium eniformibus conduplicatis. L. Schreber.  
Siphneum. Glabra brevia. Pedunculis erectis. L. Schreber.  
Siphneum. Glabra brevia. Pedunculis erectis. L. Schreber.  
Siphneum. Glabra brevia. Pedunculis erectis. L. Schreber.  
Siphneum. Glabra brevia. Pedunculis erectis. L. Schreber.~~



num 2. Anthoxanthum glaucum.

Anthoxanthum amaranum Brotov ~~Phy~~ phytoz. Lusit. Del.  
spec. 1.

Habitat in Lusitania.

Anthoxantho odorato altior, tota glauca.

Nei plantam, nei librum Brotov <sup>in</sup> vidi Deoque mutuari

loci parva e Buschii conspectus Detentionum etc. vol.

p. 48.

arenaceum Anthox. spica serena calycibus pelosis, flosculi anthera longa  
tortili geniculata Retz obs. 3. p. 10.  
Habitat in India orientali

non vidi

Crinatum Anthoxanthum panicula coarctata, aristis longis, imis dens  
prodr. n. 10.

Anthoxanthum crinitum; panicula spiciformi cylindrica  
aristata: aristis longis patentibus laxis. lin. suppl. 90

Habitat in nova Zelandia.

Glabrum, pallide virens - Culmus sesquipedalis, erectus, in  
ferne vaginis foliorum vestitus. Folia convoluta, angustissima  
vagina striata. Panicula quoadi pollicari, spiciformis, in  
ferne angustior. Glazis flumina longitudine corollarum, margi-  
ne carinaeque & denticulis minutis simis ope lentis videndis & scabra.  
Corolla subvelo altera aristata: aristis <sup>seculis</sup> longis <sup>multis</sup> patentibus <sup>longis</sup> <sup>longis</sup>  
scabra.

*Andropogon decussatum* corymbis dichotomis, foliis oblongis lutescentibus flor.

Penw. 1. pag. 45. Tab. 74. fig. 6.

Habitat in nemoribus Andam. 5

Caulis scandens, ramis subnatis, teres. Rami bracteati, cinerei, ramosi, purpureo asien-  
ti. Folia opposita, petiolata, acuminata, interdum nonnulla ovata, saepe serrata  
crenata, utriusque glabra, supra nitida, patentia. Petiolis canaliculatis  
urticatis. Pedunculis axillaribus, 2-3-angulis, solitariis, foliis brevioribus, dichoto-  
mis, corymbosis. Pedicellis brevibus, bracteis oppositis, ovatis, concavis, apice cili-  
atis. Flores parvi, lutesci. Calis 5-phyllus, foliola subrotunda, dentato ciliata  
concavo, marginibus in vicem intumescens, inferis, deciduis. Petala 5.  
inaequalia ovata-oblonga, dentato-ciliata, patentia calyce 3-ple longiora. Necta-  
rium. Discus minimus cyathiformis inter petala et stamina. Stamina 3. linearia  
longitudine nectarii. Anthera erecta. Germen ovatum. Stylus brevis. Stigma  
obtusum. Embryo ignotus. Penw. Affinis *Toussella* et *Hippocrepis*

Avenaceum 4. Anthoxanthum spica secunda, calycibus pilosis, flo-  
culi antha tecto geniculata Retz. obs. 3. p. 8. +  
Habitat in India Orientali

Species omnino Aveno propter anstas, sed Stamina tantum duo.  
Grana semipedale, erectum. Retz. l. c.

An hujus generis?

Habitus. Culmi erecti, simplicissimi, teretes, glabri.

Anthoxanthum indicum a Perotide latifolia vix specie differt ni-  
fallor. Anthoxanthum giganteum Walteri et Andropogonis species

odoratum Anthoxanthum spica oblonga ovata, floculis subpedunculatis aristata longioribus L. V. p. 73. 2. ~~Spec. Pl. 18.~~ Schreb. gr. p. 49. t. 5. Less. Stillingfl. Musc. t. 1. Less. fl. 44.  
25 t. 2. f. 11.

Gramen Anthoxanthum lugo

Shear

Gramen pratense spica flavescente Bauh. Pin. 3. Scheuchz. gr. 88.

Gramen alopecurum vernum, pratense spica flavescente Monf. h. 3. p. 193. Tab. 7. f. 25.

~~Gramen avenaceum odoratum, spica flavescente Mont. p. 57. u. 84~~

~~Avena Diantha; folliculo villosa; calycis glumis inaequalibus, altera de uno dorso, altera de summo aristata Hall. l. 1491.~~

~~4 Spec. pl. p. 40. t. 8. Sec. 33. Spec. pl. p. 40. t.~~

~~β Spica laxiori, ramosa Hall. l. c.~~

Gramen erectum pomum, aut melilotum redolens panicula corymbosa Bozon. Musc. 67. t. 57.

Gramen montanum, odoratum spicatum Loef. G. 22. 110 u. 22.

γ Glumis calycinis pubescentibus Less. l. c.

an potius agrostis generis inter se debet  
Habitat in Europa partibus

Solea plurima radiceola unicum in culmo lanceolata striata  
nili raronibus uti vagina adpressae <sup>polluciana vel ultra</sup> culmi ~~ext~~ unguiculari  
Culmus semipedalis erectus glaber panicula spicata ser polluciana  
interminata.

~~Cithonia~~ fia