

Andryllis

x herbacea

1. tetraphylla A. foliis quaternis-pinnatis, floribus lateralibus sessilibus, calycibus fructiferis ovatis.
2. vulneraria A. foliis pinnatis inaequalibus, capitulis solitariis calycibus fructiferis
3. cornicina A. foliis pinnatis inaequalibus, capitulis solitariis calycibus fructiferis
4. lotoidea A. foliis ^{tripartitis} ~~tripartitis~~, calycibus ^{prismaticis fasciculatis} ~~prismaticis fasciculatis~~ longitudine legumini
num
5. gerardi A. foliis pinnatis inaequalibus, pedunculis lateralibus folio longioribus, capitulis aphyllis.
6. involucreata A. foliis ternatis petiolatis linearibus ensiformibus, floribus capitatis, calycibus hirsutissimis.
7. quinqueflora A. foliis ternatis linearibus ensiformibus, umbellis quinquefloris calycibus pelosis, caule suffruticoso.
8. montana A. foliis pinnatis aequalibus, capitulo terminali secundo, floribus obli-
quatis

** fruticosa

9. *linifolia* A. foliis ternatis sessilibus ensiformibus villosis, floribus capitatis
10. *barbajono* A. foliis pennatis equalibus tomentosis, floribus capitatis
11. *heterophylla* A. foliis pennatis, floralibus ternatis, pedunculis subbifloris
12. *visiflora* A. foliis digitato-pinnatis, calycibus hesperidi
13. *cythoides* A. foliis ternatis inaequalibus, junctis simplicibus, calycibus lonatis lateralibus
14. *ennaeica* A. fruticosa, foliis simplicibus.

onobrychoideis Anthylli

Habitat

Lib. la Riv. le Paux

Caulis lignosus, pedalis, ramosi, superne herbacei, teretes, virgati, lanugineos.
Folia bipinnata: foliola lineari lanceolata, apice ciliolata, utrinque serrata.
Stipulae nullae. Flores terminales, umbellati, parvi, 7-9. Calycis argentei.

Anthyllis

Hermanpis Anthyllis fruticosa foliis ternatis linear-cuneatis subpedunculatis
calycibus campanulatis, ramis spinescentibus.

Anthyllis hermanpis : fruticosa foliis ternatis subpedunculatis,
calycibus nudis Len. l. V. pag. 658.

Cypalathus cretica : foliis ternis cuneiformibus glabris lateralibus
brevioribus, stipulis obsoletis, floribus congestis Len. l. V. pag
647 647.

Basta joris cretica Linnaeus folio flore luteo parvo.
Tournef. Cor. 44

Basta joris cretica Ruin. Herb.

Habitat in quercu creta Palostina 5

Frut ex humilis ramospinus ramis aggregatis vertibus
familis spinescentibus. Soleola unguiculata e villis
tenuissimis adpressis subanescentibus flores in ramulis
subpedunculatis parvis aggregati 3-4.

Basta joris greca St. Linnaeus folio argenteo amplius flori
parvo luteo Tournef. herb. 44

hinc offertur in herb. hult.

rami teretes ramosi. Soleola unguiculata e villis
minutis aggregatis. Dicitur autem in oriente

53

Tetraphylla A foliis quaterno-pinnatis floribus lateralibus ^{sespiter} Lin. hort. Ups. 224.
Lepidus Calycibus fructiferis ovatis
Spei. pl. pag. 1011. *

Trifolium haliaciatum Cam. hort. 171. 4. 47.

Lobus pentaphyllus vesiana Baub. pin. 332.

Habitat in Sicilia, Haliaea O

Caules procumbentes palmares saepe pedales, simplicissimi
Vires pilosi. Folia quatuor alterna unicum ab altero latere
folioli obovati bilobis ~~veam~~ interiora versus minor, termi-
nale pollicaria, mucronata. Calycis 2-5. in axillis sespiter
primum cylindrici demum ovati inflati villosi pericis
foliolum terminatum ad basin calycium. Legumen pedicellatum
biloculatum ovatum acutum.

ex hort. Ups. plantam mis. Broberg sub nomine Anth-scirpoides
quomodo vero a *Tetraphylla* differat non video nisi foliis crasporibus pilisque
foliolorum deorsum

mont.

2 vulneraria A. herbacea, foliis pinnatis inaequalibus, capitulo duplicato len.

L. V. *Leguminosum* flore luteo Tabern. u. 525.

Ceto affinis vulneraria pratensis Bauh. pin. 332.

13. *Ceto affinis lupula, flore rubente Bauh. pin. 332.*

Vulneraria furcata, flore cori. in eo Hill. Elth. 431. V. 320. V. 473.

V. *Vulneraria suffida flore albo Tournef. f. R. 4. 291.*

Habitat in pratis Europae borealium &

Caulis procumbens interdum erectus, pilosus, verticillatis
pilis. Folia pinnata 3-juga, foliolis lateralibus
linearibus terminali reliquis major pollicare et ultra
oblongum, alterni ^{bus} ~~duo~~ internodiis caule approximatis
Petioli amplexicaulis. Capitula axillaria et terminalia
pedunculata, duo plerumque in apice fragili pedunculi
alter ^{bus} foliis alter pedicella. Foliolum palmatum 5-7 sedum
ad basem seu quibus capituli laciniis lanceolatis
Paliis oblongis pilosis demum ovatis pilosis

V. *Caulis erectus foliola lanceolata, internodia minor. Hypole lacini
lata integerrima. Capitulum terminale solitarium, herbaceum, pau
ciflorum, folium florale compositum prolo boreale herb. mus.*

add. ex figura descript. anth. et Leguminos

3 Cornicina A. foliis pennatis inaequalibus, capitulis solitariis ^{calycibus fructiferis subtota} Len. S. V. p. 644^o

Len. Spec. pl. pag. 1024

Habitat in Hispania Ove pitheum

Caules plures palmari procerum bentes subramosi vel simpliciter. folia
pinnata s. s. 7. ovale-lanceolata ^{bas. attenuata} inferum linear lanceolata, ex
tremo reliquis majori unguiculari. Pedunculi axillares solitarii uti

foliola duas infima
opposita caule opposi
mata fl

Caules villosi Longitudine foliorum. Capitula ^{solitaria} 5-12 flora, rotunda
villosa. folium ternatum vel pinnatum ad basin singuli sespale.

Calycis florigeri oblongi ~~calyx~~ ~~convexa~~ arcuata corolla parum breviora
Legumen arduatum

4 *Cotoides* A. foliis tripartitis, calycibus prismaticis fasciculatis longitudine legumi-
num. Lin. Spec. pl. pag. 1012. *

Coronopus ex cod. Cosarea Dod. pempt. 109. male

Lobus pentaphyllos fleguis curvi pedes corvinos referentibus

Bauh. pin. 332.

Habitat in Hispania O

Habitat in

pytharoi simplicis
caulea

Stipula procumbens, caule digitali et ultra. Folia ternata
lateralibus basi coadunatis in unum cuneiforme, intermedio subsple-
folia manata pollicare, cuneatum. Stipula magnitudine et figura foliorum
foliola opposita folia floralia ternata sessilia, absque stipulis. Capitula ex 5-7.
decurrentia floribus. Calyces parvelli, hirsuti, unguiculares, angusta. Legu-
min trifuga. Ramen decimum distatum ca

Cotoides A. foliis pennatis extimis connatis et confluentibus; calycibus fasci-
culatis prismaticis longitudine leguminum

front

Fruticosa Anthyllis

Anthyllis fruticosa Cavan.

^{Habitat herb. Ca. mark.}
Fruticulus humilis, ramosus; a basi persistente petiolorum dentatus. Rami
juniores teretes, iniani, uti folia et calyces, brevissimi, ter minutis
pedunculo pollicari. Folia scapula, ternata, oblonga, vix unguiculata.
Flores in capitulo 10-12 floro; involucri triphylli, linearibus; longitu-
dine calycis. Calyx senes: laciniis subulatis.

microphylla Anthylli? folus pennatis incanis lineatis, spicis terminalibus
Habitat in Perou. Herb. Guif.

Fruticulus. Caulis plures, ramosi, diffusi; rami caeci villosi subsensiti;
folia frequentia, tripeja, impari pennata, semiangulata. Stipula
parva, subulata. Flores in spica terminali, pollicari, oblonga, hirsuta.
Palya hirsuta, quinquefidus. Legumen semine binas, panum majori
ve, albidum, triangulare, compressum; tenue membranaceum, disper-
mum.

an species Dalea?

Gerardi. A. foliis pinnatis inaequalibus, pedunculis lateralibus folio longioribus, capitulis
aphyllis Len. Mant. 100. + S.V. pag. 654. Gerard prov. 490. t. 10.

Habitat in galloprovinciis maritimis versus f. Tropis sub Pinibus ^{3-4 supra cum impon}
Caulis ^{glabri} multi prostrati. Folia alternato pinnata, pubescentia.
^{subvillosa} stipula magnitudine foliorum. Legumen ovatum.

6 involucreata A. foliis ternatis petiolatis stipulatis ensiformibus, floribus capitatis
Linn. Mart. 265: & P. V. p. 654.
Ononis involucreata.

^{Berg.}
Habitat ad Cap. b. p. 17

Cauli procumbenti herbatus pedalis ramosis. rami sparsi triflori
meri simpliciter. folia petiolata. foliola ternata linearia
unguiculata sessilia pilosa, subsessilia. stipulae ut in
5 flora. Pedunculi ex apice ramorum. Flores subsessiles
in capitato uniter 8. Involucrum diphyllum tripartitum
laciniis lanceolatis longitudine calycis latiores quam in
insequente. Calyce herbaceo semi legumen ut in 5 flora

involucreata A. foliis ternatis petiolatis lineari ensiformibus
floribus capitatis calycibus herbatis semi ~~calyce herbaceo~~

1. quinque flora ^{umbella.} a foliis ternatis linearibus, capitulo ^{scabris pedicellati} quinqueflora ^{lin. suppl. p. 325,}
^{capite p.} V. p. 634.

Habitat ad Cap. b. p. i. t.

Caules ^{ramis pedicellati,} tenuis, scabiles, decumbens, basi lignosis; ramiflori;
rami alterni ascendenti pilosi. Folia petiolata, lineana
latere ^{int.} exteriore convexiore basi magis angusta, acuta
pilosa. ^{unguiculata} stipula subulata structura foliorum longitudine
sex petioli. Pedunculi terminales pilosi, bipollicares.
Flores terminales pedicellati 4. 5. bracteae quinque lineares
longitudine calycis. Calyx ventricosus pilosus. Stamina
diadelphae legumen lineare calycis duplo longior pilosus
angustum

quinquefl. a. foliis ternatis linearibus; ^{eniformibus} umbellis quinqueflori calycibus pilosis
caule suffruticoso

ondrychioides Anthyllis caule fruticoso brevi rami erecti folus
pinnati pennulis ^{sub} linearibus. Pavan. Ic. 2. p. 40.

Tab. 150

Habitat in Hispania 7

Caules crassiusculi fusci. rami sesquipedales. teretes
glabri apice sub villosi. Folia impari pennata 4-5
juga foliola saepe opposita stipulam longioribus utra
que ^{in herbis} foliis
flori umbellato-capitati. Calyci parvi pedunculati
stellas basi folio trifido ternato. Calyx villosus
legumen ovatum acuminato arcuato terminatum
monospermum. Semen ovatum. Pavan. 7

non vid.

montana A. herbacea, foliis pinnatis equalibus; capitulo terminali secundo,
floribus obliquatis spic. pl. pag. 101₂⁴ ^{fac qu. fl. austr. 4.} T. 334.

Astragalus purpureus Dalech. hist. 1347.

Astragalus villosus floribus globosis Bauh. pin. 351.

Astragalus incanus tomentosus, pallido globoso flore, *italicus* Barr.
var. 1391. T. 722.

Habitat in Helvetia, G. Narbonensi, Galloprovinciâ rure & tonis, Austria
monte Anas & palmaris

Caulis suffruticosus basi ramosus. Rami inferne vaginis membranaceis
caulis a basi petiolorum persistentibus. ^{ultra} Solia cincta 12 jugo
folioli semi unguiculatis; lanceolatis mucronatis, petiolo
profecto marginatis. Petiolo inferne depresso in vaginam
membranaceam utraque foliolo apice structura reliquorum
Pedunculati terminaliter bif. tri. pollicares petioli. Flores sub
umbellati umbella hemisphaerica, pedicelli brevissimi.
Foliola sub caps umbella trifida ~~la~~ cuneata. Calyx petioli
Cappula oblonga parva, utraque acuta, glabra longitudi-
ne calycis semen unicum

10 *Barbapari* A. foliis pinnatis aequalibus tomentosis, floribus capitatis
Linn. S. V.

Barbapari Bauh. pin 397.

Barbapari pulchre Luceni Bauh. hist. 1. p. 305.

Habitat in Italia, Hispania, Orientis partibus &c.

Truncus determinate ramosis & petiolis persistentibus squamosis

alternis vel oppositis

Rami tomentosi, incani, uti et folia et calycis. Folia pinnata cum impari 7 jugo, foliolis linearibus oblongis acutis unguiculatis

caulis duobus interioribus a reliquis remotis cauleque approximatis. Petiolus basi dilatatus amplexicaulis. Capitula terminalia et axillaria pedunculata multiflora foliola non nulla ad basin squamulae capituli

front

"heterophylla A. foliis pennatis, floralibus Ternatis ^{foliis pedunculis subflor} Lin. Spei: pl. pag. 1013. &

Barba poris minor Lusitania, flore minimo variegato Tournef. F. R. H.

651.
Habitat in Lusitania, Hispania &

Suffrutex procumbens, verno micans, subpubescens. Folia pennata
octopuga cum impari, lanceolata, acuta, sericea. Florales
sessilia, Ternata, remota, lanceolata, obtusiuscula. Pedunculi
breves, apice Ternati: folioli tribus floribusque oppositi
minuti, sessilibus

novi Le herb. Tournef. 2274

12 *visiflora* A. foliis digitato-pinnatis calycibus calycibus hirsutis Lin. suppl. p. 92
325. * L.V. p. 654.

Habitat ad Cap. b. p. 5

Caulis prostratus, prostratus. foliis petiolata. foliola linearia ovata
glabra inaequalia. duo sessilia, opposita. tria petiolata inter
media. Lateralia ternata: intermedium pennatum folio
liis. Pedunculi aphylli longitudine foliorum. Capitulum
quaeque s. 6 florum. Calyces minores, hirsuti, visif. Corolla
luteo calyce duplo longior Lin.

non ad

1) *linifolia* A. foliis ternatis sessilibus-ensiformibus, ^{vel lyti} floribus capitatis Lin. Mant.
265. + S. V. p. 654.

Habitat in Cap. b. p. i. neque b. t.

Pauli pedalis, ~~fr.~~ ^{semita foliata} ternis: ramulis pubescenti inanis, folia sessilia
terna linearilanceolata perigonis pollicaria subopposita, utraque
acuta, altero latere convexo a venia. Stipulae nullae. Capitula

terminalia subgeminata involuta bracteis variis ternatis albo
velloso hispitis uti calycis, longitudine florum. Corolla parum

vellosa

Trifolium agrorum fruticosum etc. Com. mel. herb. 2. p. 215. Tab

100. herb. Royen

~~Simplexibus potant~~ *Supremis simplicibus*
13 *Cytisoides* A. foliis ternatis inaequalibus, calycibus lacinatis lateralibus
Lin. S. V. p. 854 & Spec. pl. pag. 10134

Cytisus G. Pluf. hist. 1. p. 96.

Cytisus incanus, folio medio longiore Bauh. pin. 390

Spartium latifolium parviflorum Barr. G. 1182.

Habitat in Hispania

Caulis fruticosus erectus ramosus, rami teretes simpliciter tomentosi

foliis suprema
simplicibus

cinerei. Rudimenta ramulorum ex omnibus axillis. Folia petiolata
frequentia pollicaria oblonga ^{avenia, ~~robuste nervosa~~} mucronata, tomentosa, lateralibus
minora (interdum defuata) stipula nulla. Calycis superiore axilla
res, sepales 3 ad 4.

15 Cinnacua Anthyllis fudicosa fronsosa, foliis simplicibus Len. Spec. pl. p. 1014x

Cinnasca Clus. hist. 1. p. 107.

Geneta fraxinum fronsosum, foliis lenticulo, floribus ex conice purpurea
scantibus Bauh. pin 394.

Scopius sibi Tabernamont. icones 110

Habitat in Hispania t.

Stem ramosissimus spinis horridus. ^{stare, cunctis} Ramis rigidis. Rami teretes, striati
si glabri plerumque terni ^{stare, cunctis} aphylli. Ramuli ultimari vides
subinermes ^{si} tripollicares striati in spinam deprentes. Vasa floriferi
basi squama utraque brevis, ovata, rigida, floriferi. Venelli
flexiles, ferici basi utraque folium parvum lineare mucrona
tum fericeum deciduum. Peduncululi laterales solitarii triflori
breves cani apice ^{is} foliati tot quot floribus foli ^{unquidam} structure foliorum
ramulum. pedicelli longitudine pedunculi. Calycis ovati
inflati cani. Coricis lanceolatis acuminatis. foliolum lineare
ad basin singuli calycis lineare. Legumen lanceolatum fericeum
longitudine calycis proserto

mont. Synonyma Barrelierie in Anthyll: juxta

planta nomine len: recte determinata

na
Anthyllis

~~Barba joni leptanica flore maxima variegata~~