

Antirhea

Arbor Oleae de fructu inflorescentia laevigata foliis oblongis nitidis antheris
liberata herb. Guss.

~~vesticillata~~
~~Antiochea~~

Antiochea Querc. gen. pl. pag 204.
Funches

Habitat in *Opule Barbara* 5

Frutex ramifus. folia 3-4 ^{vesticillata}, axillis nervosa pubes glandulosa

pedunculis axillares et terminales multiflori. Flores cymosi ^{fructus}

Rami glabri inferne ^{vesticillati} teretes superne tetragoni folia ad apices ramorum

approximata, ³⁻⁴ ^{vesticillata} ^{approximata}, breviter petiolata cuneato oblonga, acumi-

nata integerrima bis ^{tripolluciana} tenuissime venosa pubes palli-

diora nervi alternis vel suboppositis glandula in singula axilla

ad costam. Stipula sepulata villosa interfolia et seminaqueculana

cum foliis decidua. Pedunculi axillares filiformes. Flores 5-6

brevissime pedicellati. Corolla parve extus villosa, fructus

oblonga glabra ^{ov} seminaqueculana ^{ov} tunc nonnullis elevatis calycis mi-

nuto coronato

Psychotria officina non herb. inter *Psychotria* inventus

bifurcata Andinica foliis ovatis utraque acutis subnudis pedunculis
apice bifurcatis floribus unilobatis
Malanea bifurcata La Martre
Habitat in Cambouan

reticulata foliis obovatis cuneatis. Ternatis verticil
latis pedunculis axillari apice bifurcatis La Martre
sub nomine Malanea (Cochonud aut.) Enc. T. p. 283
Tab. 66. fig. 1

non vid.

farmentosa Anth. foliis ovatis rugosis subtus tomentosis racemis
axillaribus compositis elongatis L. Mart.
malanea farmentosa Aubl. fl. Gu. pag. 41

non vid.

karfuta He Dyoki

nitida ^{nitida} foliis ovatis nitidis glaberrimis, pedunculis dichotomis
malacca ^{to} Mark T. E. pag 209
Habitat in Cambis 7

non vid.

fomentosa Cunninghamia Schreb gen. pag. 789

Mala neo fomentosa Aubl fl. Gu. pag. 106. tab 41

Habitat in Guiana

Caulis s. vel caudalis. Rami longissimi fomentosi, nodosi, oppositi. ramuli longi penduli tomentosi, ussiccanti. Folia opposita, petiolata, ovata, obtusa, rete gemina inferne tomentosa lanugine ussiccante. Stipulae oblongae, acute villosae deciduae utraque infra basin petiolorum: densae glomeratae, glomeruli oppositi in fructu. Spica villosa opposita, axillari: Calyx tomentosus. Corolla caerulea Aubl.

affinis antiochea Purshae

non vidi

no 5.

Bidens nivea Lin. Descriptio et alterior hujus optima habetur in
obj: Botan. in Swartzii pag. 296