

Antirrhinum

Antirrhinum

Linnaea orientalis, flore luteo maximo Tournef. Cor. 1107. 9

Habitat in Armenia herb. Tournef.

Caulis erectus, teres, glaber, uti tota planta, simplex. Folia alternis, sessilia, ovata
lanicollata, crassiuscula, semi-pollicaria, arena, enervia. Flores superne,
sessiles, magni, Calcar rectum. Bractea ovata, acuta,

Antirrhinum

Lirana cormiferae flore purpurascens palato carante

Habitata Lusitania herb. Tournef.

Caulis plures, laterales, ascendentes, superne subramosi. Folia inferiora
4^{no} 3^{no} caulina, paucis alternis, remota.

habes

Antiochicum

Linaria hispanica ad lutea et villosa
Habitat in Septimia herb. Tournef.

habes

Antirrhinum

Linaria Lusitana maritima, polygala folio Tournef. Inst. v. herb. pag. 163
Habitat in Lusitania herb. Tournef

herb

Cladonia

Lunana villosa et viscosa lutea saxatilis hispanica herb. Tournes

Habitat in hispania herb. Tournes

Caules plures, erecti, semipedales, subramosi. Folia infima uno oblonga

habes

crassifolium Antiochicum

Habitat in hispania herb. la Rev. le Pau
Caulis plures, palmares, basi ramosi

habes

Calycium Anturki num

Habitat in Persia hort. Panf.

Villoso-pubescentum. Caulis erectus, herbaceus. Folia alternas, sessilia, vix
semipollucina, ovata, obtusa trinervi. Flores axillares, sessiles. Calyx
caerescens foliosus: folioli lanceolatis, patentissimis, corolla longioribus.
Corolla corollata, violacea

Nummularium Antiochenum

Habitat in Persia herb. de Lesert

Caulis herbacei, simplicis, decumbentis, glabri. Folia sessilia, inferna alterna, minora, superiora opposita, unguiculata, subrotunda, crassa, integerrima, glabra, obscure trinervia. Flores superiores, alterni, approximati, a. lineam parum majores, glabri. Calicis parum curvatum. Labrum inferius supra vel laevum; superius purpureum. Calycis lacinae oblongae, glabrae. Bractea oblonga latitudine fere caulis

Antiochicum

Linaria orientalis, latissimo folio, floribus Linaria vulgaris Tournef. Cor. pag 9.

Habitat in Armenia herb Tournefortii

Caulis simpliciter, teres, erectus, glaber. Folia sessilia, alternata, frequentia, pollicaria, lanceolata, glabra, trinervia. Pedunculis communi inferne ramosis. Flores copiosissimi, umbellati, multo minore quam in Ant. Linaria. Calcar rectum. Bractea subulata.

Androsthenum

Linaria orientalis, foliis *Linaria* reliquis, flore corubus parato carcata Tournef.
Cor. pag. 9.

Habitat in Armenia herb. Tournef.

glabrum. Caulis semipedalis, erectus, ramosus. Folia alterna, linearia, semipollicaria. Flores rufi. Pedicelli remotissimi.

habes

marginalum Antirrhinum

Habitat.

herb. Desfont.

Caules ascendentes, ramosi, glabri, teretes. Folia lineari-lanceolata, quaterna
superne alterna. 17n. Pediculi lineari-lanceolati, pedicello brevior. Calycis
lacini lanceolati

habes

pyramidale Antirrhinum

Habitat

herb. Desfont.

Caulis herbaceus, erectus, teres, glaber, crassitie fere pennis anserinis. Folia
sespilia, alterna, pollicaria, lanceolata-oblonga, acuta, glabra, integerrima,
avenia, quinquenervi, frequentia. Bractea ovata, flos. subsessil. Corolla
mag. nitiditate fere Antirrhini majori

pedatum Antiochenum

Habitat - Herb. Lesfont

Caulis sesquipedalis, erectus, teres, glaber, purpureus, superne in pedunculos
divisi. Pedunculi, uti bractea et calycis villosi

latifolium Antirrhinum

Habitat

Herb. Desfont.

Caulis teres, glaber, in tota planta. Folia sessilia, sesqui-pollucaria, lanceolata
trinervia, acuta. Spica terminalis et ex axilla camonum, pedalis. Flores
inferiores brevissime pedicellati, reliqui sessiles, fulvi Ant. Lunaria. Calycis
lobula linear-lanceolata, attenuata. Capsula magnitudine pep.

clatunodes Ant. innaum

Habitat p

leb. Desfont.

Caule teretes, ramosi, villosi. Rami alterni patentis

habes

frutescens Antirrhinum

Habitat

herb. Desfont.

Caulis fruticosus, sicut spithameus, inferne ramulosi, utriusque folio, bracteae, calycis
et corollae extus villosi incani. Folia sicut unguiculata oblonga, acuta, crassa, a
senia. Pedunculat superne, longitudine folii, gemmiferat. Calcar rectum

galioides Androsheimum

Habitat

herb. Desfont.

Caulis glaber, teres. & folia feno, verticillata, linear lanceolata, pollicaria, glabra,
integerrima: amovum brevè, aeterna. Flores sparsi, distantes, parvi. Bractea
lineares, longitudine calycis

Fruticifera Antiochiensis

Habitat

herb. Desfont

Caulis teres virgatus. Rami superne approximati, elongati

herb

parviflorum Antiochicum

Habitat

herb. Desfont

Caulis ascendens, palmans et ultra, glaber puberulus. Folia ternaria
quidulana, lanceolata, acuta, crassa, venia, superiora minor, albena
diffusa. Calyxes et bractea alba. Flores inferiores remoti (bractea viden
tur) superiores conferti. Calyxis lacinia lanceolata

Lusitanum Antiochenum

Linaria mantinea flore pulchro, caule folioso

Habitat in mantinea Lusitania herb. Desfont

Caulis basi lignosus, subramosus, teres, glaber. Folia inferiora terna, superiora
alterna, oblonga, corospiuata, y labra, unguiculata. Pedunculi terminaliter
purpurei. Flores racemosi, magnitudine fere Linariae. Calicis subrotundum rectum
bractea minuta subuneato. Calycis lacinae oblongae, obtusae, inferne
serpis ramum attenuatae

Lebenophyllum Antiochiinum

Habitat

herb. Deyford

Caulis herbaceus, erectus, bipedalis, simplex, basi ramosus; inferne glabri, vix
plures, radicales; stentis, digitales; juniores villosi, state glabri, folia inferiora
4na lineario, caulina filiformia. Racemus terminalis, hirsutus. Bracteo lanceo
lato.

Antirrhinum

Linaria orientalis, *corisifolia*, *flore leucophloea* Tournef. Cor. pag. 9. *flore grisea*
Tournef. herb.

Habitat in Galatia herb. Tournef.

Planta vix fruticosa, basi ramosa

habes

Lupitanicum Antiochenum

Linnaei manna, caule foliis pulchro flore Lupitania.

Habitat in Lupitania herb. Guss.

Caules teretes, glabri. Folia alterna, frequentia, lanceolata, basi in cespitem simplicem
paucum attenuata, unguiculata, glabra, crassa, aevana, enervia, integerrima,
~~acuta~~. Racemi terminales, simplices. Foliola floralia lanceolata, superiora
lineana, acuta. Calycis laciniis 4^{or} brevioribus, obtusis, oblongis. Corolla ut semipetal
licans. Calicis parvam curvatur.

penifolium Antiochicum

Desfontaine

Habitat in Barbana herb Gusf.

Caulis herbaceus, erectus, teres, glaber. Folia alterna, frequentissima, semi-pollia-
na, linearia glabra. Racemus terminalis oblongus. Flores approximati.
Pedunculi inani, villosi. Calices villosi.

pyramidale Antiochenum

Linnaea orientalis liliæ persici foliis, florum specia densissima et pyramidali Tournef.
Cor.

Habitat in oriente herb. Turc.

Caulis sesquipedalis, erectus, teres, glaber, simplex, superne divisus in ramus floriferis. Folia
sespilia, tri-pollicaria, alterna, lanceolata, glaberrima, quinque nervia, integerrima.
Præmura spithamou et ultra. Flores magnitudine Ant. lenae, approximati, subim-
bricati. Bractea ovata. Calyx glaber: foliola ovata, obtusa. Calcar rectum, corolla
brevius

Antiochenus

Linnaea orientalis latissimo folio floribus linnaea vulgaris Tournef. Cal
Habitat in oriente herb. maj.

Kubes

Antirrhinum

Linaria cretica latifolia Clus. hist. 3. 23.

Plukenet. tab. 96. fig. 4.

Habitat in creta herb. Mus.

Caules plures, simplicis fimi: rami superne, teretes. Folia ternata, oblonga, trinervi, superioris alterna. Flores parvi: calicis rectum, palatum tomentosum
an varietas triphylla

Antirrhinum

Habitat herb. maf

Caules plures, uti reliquae partes plantae villosi viscosi, digitales vel palmares.

Folia foliorum ternata.

Kabeo 1821

Androsace

Linnaea lutea repens galloprovincialis herb. Vaill.

Habitat in gallia australi herb. Mus.

Caulis plures, palmares et ultra ~~est~~ Tota inferna minor, terna, cuneata, superior lanceolata, unguiculata, basi versus angustata

pedun Antennarium
Eulatum

Linaria lusitana maritime polygalaefolia Tournef. Graft. v. 6.
Habitat in Lusitania herb. Mus.
Caules ramosi

habes

Cuscuta Antiochenum

Linnaeus *manana*, flore pulchro, caule folioso *Gray* var. *Leaf*.

Habitat in *Lycania* maritima *Herb. Mus.*

Caulis plures, simplicissimi, spithamari, diffusi, glabri. Folia inferiora vernata, lanceolata
oblonga, angustulana, crassa, glabri. Pedunculi ex alio superantur, distantes, fo-
leo dimidio longiores. Calyx ^{is} foliola lanceolata. Calcar breve, subulatum.

ant. *Lycanicum* la *Marit*

Antirrhinum

Lirana orientalis flore maximo² lutes Tornef. Bor.

Habitat in Oriente per S. Musf.

Caulis teres, glaber, Solia frequentis, pinnatifida, glabra, culem fere imbricatum,
inferiora laciniolata, superiora ovata, acuta, crassa, arenaria peltata, nerva.

Floris in racemo palmari conferti, magni. P. rufes, uti Laciniis Calycis luteo
late, acuto. Corolla pollicaris, flava.

pyramida Antiochenum
6

Linaria orientalis Liliis persici folio, florum spica densissima et pyramidalis Tournef.

Cor.

Habitat in Oriente herb. Mus.

Caulis crassus perno cygneis, glaber, superne paucis ramosis. Sola sessilia, latolanceolata, attenuata, obscure nervosa, glaberrima. Racemi terminalis, spitha
m. c.

Antiochenum pyramidalis La Mart.

Parvula *Clusia* *strum*

Lirasia *salentina* *saxatilis* & *perennis* *villosa* *floribus* *luteis*.

Habitat in *Hispania* *Herb. mus.*

Caulis *villosus* *procumbens*, *ramosus*, *herbacus*. *Folia* *simplicia* *quaternaria*, *superiora* *ternaria*, *opposita*, *demum* *alterna*, *glabra* *in* *scula*, *in* *pollicariis*, *acuta*, *margine* *villosula*, *in* *nerviis*. *Flores* *terminaliter*, *subracemosi*, *oppositi*. *Bracteae* *oblongae*, *basin* *versus* *angustatae*. *Calycis* *foliola* *oblonga*, *villosa*. *Calycis* *puberulus* *in* *ventum*. *Corolla* *hiava*.

galioides Antirrhinum

Habitat herb. Rusf.

Caules erectus, teres, glaber, superne in ramos floriferos diviso. Folia remota, quinato
ve hinc illata, sessilia, semipolliciana et ultra, linearia, glabra. Rami floriferi axillares
flores terminales, racemosi. Bractea parva, lineares, longitudine pedicelli. Calyx
glaber. Corolla magnitudine Ant. monsp. calicis brevis, curvatum, calycis vix lon
gior.
prope monspes.

margnatum Antirrhinum

Habitat in Barbana herb Desfont.

Caules teretes, glabri. Folia pollicana 4na, suprema alterna, lin can lani colata
Flores approximati, magnitudine fere hexano

sem. persicaria Anthorhenum

Anthorhenum hispanicum organico folio villosa et viscosa Tournef. in fl. v. herb.

Peyroux

Habitat in Pyrenaeis herb. hisp.

Caulis fruticulosus, villosus, inaequalis, teretis, ramosus: rami laxi, adscendentes, palmares. Folia
petiolata, alterna, semipollicaria, subrotunda, integerrima, inaequalia, villosa. Pediculi
axillares, solitarii, uniflori, longitudoae foliorum. Corolla orbis armata villosa.
v. aneta foliis lanceolatis.

Diversa ab Anthorheno molli toto villosa viscosa, ramis alternis, foliis semipollicari-
bus, obtusiusculis integerrimis, corollis ciliatis

heterophyllum Antiochicum

Habitat ad montes vides Comnes. herb. frus.

Caules plures, herbaei, semipedales, simplicissimi, erecti, steriles breves. Folia terna,
cauleum inferum inferum oblonga, unguiculata, reliqua lanceolata; infera cauli
um floriferum, femipolliciana lanceolata, omnia alterna, superiora glabra. Rac
mus terminalis. Flores ^{coerulei} erecti. Bractes parvae, lanceolatae, pedicello brevis
res. Calycis foliola lanceolata. Calicis subulatum recurvum, longitudine corol
la

incarnatum Adversarium

Linnaea Lustanica, floribus palato caesentibus

Habitat in Lusitania herb. Mus.

Caulis plures, erecti, semi pedales, simplices, glabri, teretes. Folia cauliculorum steri-
lium ternis, parum latiora, breviora: caulicorum floriferorum, alterna sex unguicula-
ria, linearia glabra. Flores racemosi. Bracteae breves. Pedicelli distantes, uti pedun-
culus et calyx villosi-viscosi. Foliola calycis lanceolata, calicis parum cur-
vatur. Corolla fauce hians

Valentinum Anterbanum

Linaria valentina saxatilis et perennis villosa, flore luteo Tournef. Inst. r. h. pag
169

Habitat in regno valentino herb. Tusc.

Caules procumbentes, villosi, ramosi. Folia opposita, semipollicana vel minor, ovata
in ramis ternata, oblonga, subvillosa. Racemi axillares ramorum. Pedunculus
villosus, 6 pollicaris. Flores inferiores remoti, oppositi, superiores magis approxima-
ti; pedicelli brevissimi. Calycis foliola oblonga, villosa. Corolla unguiculata cal-
carata: calcar longitudine fere corolla
prope triphyllum.

barbatum Antiochicum

Habitat in Cap. b. p. herb. tusc.

Caule herbaceo, erecto, simplex, digitalis. Folia opposita, sessilia, unguiculata, oblonga, obtusa, dentata, glabra. Pedunculus terminalis, piloso glandulosus. Calyx bi-foliola, linearis, villosa, obtusa.

capitellatum Antirrhenum

Antirrhenum glaucum Pavan.

Habitat in Hispania herb. Lus.

Caules plures, adscendentes, filiformes, glabri. Folia lineana, crassiuscula, glabra, inferiora quaternaria, reliqua alterna, parum recurvata, unguiculata. Flores superne conferti in capitulo, demum parum remotiores, aurantii, parvi. Calicis rectum longitudine corollae

Cruciferae Antirrhinum

Habitat herb. fus.

Caulis erectus, squamulosus et ultra, glaber. Folia inferiora ternata obovata, reliqua
alterna, oblongo-lanceolata, acuta, glabra, semipollucaria, sessilia, axillaria, nervi
viri. Racemus terminalis, tripollucaris. Flores approximati, ant: purpureo
num majores. Calycis foliola subulata. Bractea lineares, calycis longiores. Cal
car rectum.

pedunculatum Antiochicum

Linnaea cathartica polygala-folius Tournef. Fruct. Pr. herb.

Habitat herb. Turc.

Caulis erectus, diffusus, spithameus, simplicis. Folia ternata, semi-unguiculata, oblonga, vel sublancoolata, subpetiolata, glabra. Racemi ex apice, circiter 6 flori.

Radicelli breves, ramati. Calycis foliola lanceolata. Corolla calicis recta

amethysteum Antirrhinum

antirrhinum bipunctatum Curran.

Habitat in hispania herb. Guss.

Caulis plures, filiiformes, glabri. ^{ascendentes,} folia ^{tenacissima} palmata, simplicia. Folia glabra, lineari,
in fenora 4na, suprema alterna. Flores versus apicem, pauci. Pedunculi ^{sub} superne
siosi. Bractea longitudine pedicellorum