

# Antirrhinum

x foliis angulatis

1. *Cymbalaria* A. foliis uniformibus quinquelobis alternis caulibusque procumbentibus  
glabris
2. *pilosum* A. foliis uniformibus novemlobatis alternis caulibusque procumbentibus  
pilosissimis.
3. *Dentatum* A. foliis oblongis inferioribus basi dentato-angulatis floralibus integer  
rimis caulibus prostratis pilosissimis
4. *elatum* A. foliis hastatis alternis, caulibus procumbentibus pilosis
5. *humile* A. foliis cordatis alternis, caulibus <sup>interioribus</sup> procumbentibus pilosis
6. *Certhopium* A. foliis hastatis alternis, caulibus <sup>acutis</sup> procumbentibus persim. *Certhopium*  
f. caulibus glabris
7. *egyptiacum* A. foliis hastatis alternis <sup>nubescuntibus inferioribus basi</sup> caulibus ~~erectis ramosis~~ <sup>ramosis</sup> utrinque  
bidentatis superioribus hastatis, caule erecto ramosissimo.
8. *lagittatum* D.
9. *h. subrotundum*

77 foliis inferioribus oppositis verticillatisve

8. triphyllum A. foliis ternis ovatis  
9. tricornithopitum A. foliis lanceolatis inferioribus quaternis superioribus ternis, pedun-  
culis verticillatis ternis  
10. purpureum A. foliis <sup>linearibus</sup> ~~angustis~~ quaternis superioribus sparsi caule erecto, floribus  
racemosis bracteis pedicello brevibus  
11. repens A. foliis linearibus congestis inferne quaternis calycibus capsulam squa-  
matis, caulibus diffusis bracteis pedicello brevibus  
12. vesicidior A. foliis linearibus canaliculatis, inferioribus ternis, caule erecto spicato.  
14. reflexum A. foliis oblongis glabris; inferioribus ternis pedunculis axillaribus,  
caulibus ascendentibus  
12. monosperulanium A. foliis linearibus filiformibus succulentis sparsi congestis,  
caule erecto, calycibus calyce brevibus bracteis pedicello longioribus  
15. prostratum A. foliis subulatis canaliculatis carnosissimis inferioribus ternis caule  
paniculato corollis que glaberrimis  
16. bipunctatum A. foliis linearibus glabris; inferioribus quaternis caule erecto pa-  
niculato, floribus spicato capitatis  
17. tristell. foliis linearibus sparsi inferioribus oppositis, nectariis subulatis, flori-  
bus subsessilibus spicato subsessilibus sub sesse filibus

18. holava A. foliis linearibus lanceolatis: inferioribus subquaternis glabris, floribus capitatis, calycibus pilosis, caulibus simplicibus
19. Thymifolium A. foliis ovalibus glabris ternatis oppositisque, floribus capitatis caulibus procumbentibus
20. supinum A. foliis linearibus inferioribus subquaternis, caule diffuso, floribus spicatis capitatis, calycibus ~~rectis~~ ~~curvatis~~ ~~rectum~~
21. arvense A. foliis sublinearibus: inferioribus quaternis, calycibus pilosis viscidis, floribus spicatis, caule erecto
22. peluseranum A. foliis caulibus linearibus alternis: radicalibus lanceolatis ternis, floribus corymbose demum racemosis
23. laxatile A. foliis linearibus lanceolatis villosis viscosis: inferioribus quaternis, caule decumbente, floribus spicatis demum racemosis
24. viscosum A. foliis radicalibus lanceolatis quaternis: caulibus linearibus alternis, calycibus villosis cauli approximatis
25. reticulatum A. foliis linearibus canaliculatis sparsis: superiorum radicalium quinis, calycibus hirsutis, pedunculis bracteis brevibus
26. multicaule A. foliis linearibus quinis carnosissimis, floribus capitatis
27. glaucum A. foliis subulatis carnosissimis quaternis, caulibus erectis floribus spicatis

28. *angustifolium* foliis linearibus inferioribus quaternis, floribus racemosis, supremo  
 calycis folio ceteris duplo longiore
29. *alpinum* A. foliis linearibus lanceolatis glaucis inferioribus quaternis, caule dif-  
 fuso, floribus racemosis, calyci recto.
30. *bicolor* A. foliis oppositis inferioribus ovato-oblongis superioribus linearibus  
 lanceolatis dentatis, caule erecto, floribus racemosis
31. *croceum* A. foliis linearibus oppositis dentatis sessilibus, caule simpliciter  
 floribus racemosis
32. *dichotomum* A. foliis ovatis oppositis sessilibus, caule dichotomo ramoso.
33. *macrocarpum* A. foliis oppositis ovatis serratis petiolatis, pedunculis axil-  
 laribus unifloris, capsulis compressis carinatis
34. *villosum* A. foliis omnibus oppositis ovatis villosis integerrimis, caulebus  
 simplicibus, floribus oppositis axillaribus
35. *organifolium* foliis plerisque oppositis, floribus alternis
36. *minus* A. foliis plerisque alternis lanceolatis obtusis, caule ramosissimo  
 diffuso.
37. *pinnatum* A. foliis oppositis pennatifidis, caule erecto, floribus racemosis
- 20-21 *halapense* A. foliis linearibus lanceolatis inferioribus subquaternis, calycibus  
 corolla longioribus, caule erecto

penifolium A. foliis feliformibus grassis, floribus spicatis pedunculis  
calycibusque hirsutis, caule ramoso <sup>velosiss. v. hirs.</sup> vrayato

Habitat in Barbano arenoso. ubi Leyi

Caulis erectus 3 vel quadrifidus, fluitans superne ramosus  
rami alterni simplicissimi elongati frequentes glabri ubi  
caulis. Folia grassa sesquipedalia sessilibus glaberrima  
crassiuscula. Pedunculi ex apice ramorum foliis  
ramoribus adpressi inter flores villosi uti bracteae et caly-  
des. Flores pronius conferti. demum remotiori brevissime  
pedicellati. Calycis villosi. Calycis longitudine corollae  
Flores Corollae. limbo duplo minori flava interdum  
labium superius purpurascens

Anterthium penifolium foliis feliformibus grassis, floribus  
spicatis, pedunculis calycibusque hirsutis Torr. et 2.  
p. 207.

Dichotomum ~~Antiochicum~~<sup>Antiochicum</sup> ~~caule~~ ~~dich~~ folus ovatis oppositis sessilibus, caule dichoto-  
mo ramofo

Habitat in Cap. b. Spei Schumacher

Caulis erectus, herbaceus, teres, glaber, Superne dichotome ramo-  
sus.

Folia sessilia, ovata, unguiculata, vel ultra, ovata, inte-  
gemina, nervosa, avenia, glabra, attenuata, remota.  
Peduncululi in dichotomia, <sup>vel ad latera oppositi</sup> gemini, breves, uniflori, vel ~~at~~  
caes oppositi.

Calycis foliola lanceolata.

Corolla

*micranthum* Andersonianum caule herbaceo erecto: foliis inferioribus quater  
mi, superioribus alternis: floribus minimis: calice brevi tubo

Cavan. ii: 1. pag. 51. tab. 69. fig. 3.

Habitat Matut. O

tenellum. Art. caulis prostratus, tenuis, floribus axillaribus  
solitariis pedunculatis foliis longioribus. Caran. v. 2. p. 61. tab. 10. fig. 2.  
Habitat in montibus umbrosis Hispaniae  
Caulis plures semipedales ramosi, vasa villosi, uti tota planta. Folia  
rotundata acuta glauca mollia copiosius opposita floralia alterna  
lacinae calycis lineari-subaequali. Corolla alba calcarata  
faux pervia. Caran.



crassifolium Ant. h. foliis oppositis ovatis crassiusculis margine ~~revo~~  
latis, <sup>floribus</sup> ~~speci~~ <sup>ca</sup> laxa, fauce perora. Cavan. <sup>2</sup> Fi. pag. 11. Tab. 114.

Antiochenum saxatile foliis serpylli Bauh. pin. v. 2.

Orontium saxatile thymi folio flore rubello Baud. Fi. 1313

Habitat in Hispania

Caulis herbari spithamei teretes versus apicem villosi  
folia breviter petiolata, parva floralia alterna. flo-  
racemofi alterni. foliola calycis lanceolata. Corolla albi-  
do purpurea. Calicis brevis obtusus. Lacinia labii superioris  
rotundata emarginata inferiori orbiculata emarginata  
Cavan.

michi ignotum

aphyllum A scapo aphylo capillari Lin. Suppl. p. 200. & L. V. p. 557.

Habitat in Cap. b. p. 0

Planta singulari Splachnum Lin. vel potius Anriulariam absque  
foliis referens. Caulis scapus digitalis vel palmari superne  
floret 2. 3. remot.

parvifloram Adhucinum

Adhucinum parviflorum Gaerq. coll. 1. p. 204. \*

~~Caulis~~  
# altit at

Caulis, pedalis erecti ramosi, rami simpliciter, glabri qdolia lanceolata-linearis  
sespita pollicina patentia, glauca, glabra, plana inferna 2. 5' superi-  
ora sparsa. Racemi terminales 4-6 pollicares, villosi. bractea foliis  
similes sed minores. Flores minuti. Calycis villosi viscosi. Corolla  
superior corolla pallidum strobilum purpureo fuscis. Corolla inferior lutea  
Palatum saturatum luteum. Calicis longum, rectum pallide  
strobilum.

Cleome Anthr. foliis alternis reniformibus integris hirsutis <sup>homo</sup> caule procumbente tosa  
in Pom. Gott. 1704 pag 60

Habitat in maderis montibus aridis ad sepes

Caules bipedales, terete villosi ramosi herbacei. Folia vix petiolata remotiuscula  
subquadrangulata, pollicaria. Pedunculi axillares solitarii uniflori  
palmares. Labium superius saturate purpureum apertum, inferius fla-  
vum. Nectarium longitudine corollae recurvatum.  
Folii integri subsessilibus ab a. villosi diversa

non vid.

Cymbalaria A. foliis cordatis quinquelobis alternis, caulebus proscumbentibus

Cin. 1. V

Cymbalaria ~~Didyma~~ Cam. epul. <sup>40 fig. 10</sup> Galich. hist. 1322.

Habitata in rupibus et munit antiquis <sup>lati</sup> Hollandia et Europa australi

Caules <sup>lati</sup> filiformes longi ramosi. folia longe petiolata <sup>subpollucana</sup> veni formia  
<sup>venosi</sup> lobis rotundatis interdum 7. duabus petiolo proximi minoribus  
reliquis aequalibus mucronatis. Petioli folio longi duplo longior  
Peduncululi axillares solitarii uniflori petiolo breviores  
calicis brevis, obtusum.

veni formibus

textibus glabris

caulebusque proscum

pelosum A. foliis reniformibus pelosiformis alternis, caulebus proterumbentibus  
Linn. Man. 249 & Sp. 354. Gaig. obs. 2. p. 29. T. 40.  
Linnaeus hederifolius villosus s. cymbalana alpina Tournef. Fr. 169  
Habitat in Alpibus Europa australi in rupibus ad Terracinae frequens  
Semeli proci at tota peloponnesu, lobis foliorum minus rotundatis ovatis

lob. novem lobatis alternis caulebusque proterumbentibus pelosiformis

23. Dentatum Antirrhinum foliis oblongis inferioribus basi dentato angulatis <sup>floralibus</sup> superioribus  
integerrimis, caulibus <sup>prostratis</sup> prostratis hirsutis pilosissimis  
in collibus aridis Tureti

Caulis prostratus, pedalis, sed interdum sesquipedalis, et hirsutis pilosissimis  
fiori, ciani, basi ramosi.

Folia petiolata, alterna, coriacea, subullosa, pallide viridia, semipollicaria  
obtusiuscula, <sup>mucronata</sup> mucronata basi inaequaliter dentata, interdum subdentato subangulata  
superiora integerrima.

Stipes Pedunculi axillares, solitarii, uniflori a medio caulis usque ad  
apicem <sup>foliola</sup> foliola

Calycis <sup>lobis</sup> lobis superioribus ovato-lanceolatis, inferioribus oblongis,  
omnibus mucronatis, membranaceis, linea dorsali viridi, villosa.

Corolla magna, <sup>antheris</sup> flavo-tenax duplo latior, flava pubescens, flava intus  
infra faucem venis purpureis. Calcar corolla duplo brevior,  
recurva

Antirrhinum spanosum Lamour herb Desf la M. et Hus

Elatine A foliis hastatis alternis, caulebus proceris benthibus Linn. S. V.  
fl. Dan. tab 426.

Elatine Cam. epit 754.

Elatine folio acuminato in basi auriculato, flore luteo Bauh. pin 253.

B. Elatine folio acuminato flore coeruleo Bauh. pin 253.

Habitat in Europa arvis ☉

Caules <sup>ramosi</sup> filiformes pilosi. folia unguiculata acuta basi lobis  
utrinque lanceolata hastatis <sup>floula</sup> <sup>petioli</sup> <sup>corolla</sup> <sup>acut</sup> <sup>patenti</sup> <sup>hinc</sup> <sup>apice</sup>  
at illarum capillarum uniflori folio longiore. Calicis subula  
tum longitudine per corollam. foliolo calycis lanceolata  
pilosum

caulis flexi

caule piloso



Egyptiacum A. foliis hastatis alternis, caule erecto & ramoso primo, pedunculis  
nigrescentibus Lin. S. V. pag. 5557  
Habitat in Aegypto

affinis cladone <sup>canescentes</sup> A. cithosi at fructior et erectus. Caules  
teretes pubescentes folia subcanescentia, basi utroque auriculis  
geminis ramuli uti pedunculi fructi rigidissimi. Pedunculi  
parum supra axillam longitudine foliorum. callos longi  
tine corollae recurvum subulatum canescentis  
variat caule folisque glabri et pilosi herb. 4.

---

pubescentibus inferioribus utraque basi biden  
tatis superioribus hastatis

*Cirrhosum* A. foliis hastatis alternis, caulebus patulis, petiolis pappi curvato  
sistentibus Lin. Mant. 244. P. V. pag. 554. Jacq. hort. t. 12.  
<sup>pappi villosa, foliis sagittatis</sup>  
Linnaeus Tell. pag. 8. 32. fig. 2.

Habitat in Aegypto C

similul. Elatine ad Venenior foliis minoribus, glaber nec villosus, Flores  
menuti, Corollae coeruleae. Calycis capsula brevior. Patitur  
sectum

glabris

Antirrhinum pygmaeum foliis sagittatis, pedunculis capillatis  
Gouan. ill. pag. 37

pygmaeum Gouan. herb. Furf

*Luzitana* D. foliis sagittatis obtusis mucronatis glabris, caulibus procumbentibus

Habitat in maris Schouboe

Facies Ant. circospi ad omnibus partibus major. Caules filiformes, glabri  
elongati. folia petiolata, glabra, fere pollicana auriculis divaricatis  
acutis lanceolatis, venis obtusa cum mucrone. pedunculi folio longior  
se filiformes apice saepe incurvati. flori magnus calicis corolla  
longius

repeated: R. ucaulis foliis petiolatis oblongis crenato-undulatis, squamis  
tis multifloris Sw. prodr. pag 93.  
Habitat in Hispaniola &

offic. m. m. m.

undulata R.

<sup>hirsutum</sup>  
vellosum A. <sup>vellosum</sup> foliis cordatis, inferioribus basi dentatis superioribus inha-  
erentibus

Habitat in Maioribus

Tota planta vellosissima velloso hirsuta. Ramuli elongati. Folio-  
bre vix petiolata pollicina superiora sensim minor obtusa  
cum mucrone.

~~vellosum Cithar. foliis villosis Jacq. coll. 1. p. 72. Hort Ken. 2. pag. 349.  
Citharexylon subferrosum ramis tetragonis raris axillaribus nictan-  
tibus, calycibus dentatis, foliis ellipticis subferroto vengis  
in pardo. n. 91  
Habitat in St. Domingo~~

*Pubbia villosa Jacq.*

non vidi

*Spunum elatius* A. foliis ovatis alternis, caulebus procumbentibus. L. V

Fl. Dan 1 913.

*Veronica foetida* Dod. pempt. 42.

*Elatine folio subrotundo* Bauh. pin. 253.

Habitat in Germania, Anglia gallia & Italia anni C.

Caules pilosi longe procumbentes. Folia in planta tetralia  
opposita, breviter petiolata, oblonga pilosa, per pollicem  
vel parum ultra. Pedunculi axillares solitarii foliis breviores  
foliola calycis ovata lanceolata. Calicis corolla subulata.

a.

*Linnaea hispanica tenuifolia villosa et viscosa Tournef. inst. v*  
h-p herb Musf

Habitat in hispania sed et Rus.



undulata Caproni

foliis sparsis inaequaliter approximatis ovatis integris subundulatis,  
necnon terminali subsimplici. (Hort. p. 26.)

Dalmaticum A foliis alternis cordatis amplexicaulebus Lin. Spec. pl. pag. 257x

Linaria latifolia Dalmatica, magno flore Bauh. prod. 106. par. 212.

Linaria maxima, folio laevi Bauh. her. 3. p. 450 Bost. cent. 1  
p. 95. v. 24.

Habitat in Oreta armenia O

Stipes ex aliis foliorum, solitarii pedunculati Lin. Caules <sup>4</sup> cubitali  
Folia glabra tenui, polline adpressa. florum grandisculi  
flavi odorati Willd. sum. pl.

Folia laevi lanceolata vel cordato lanceolata in diversis ramis  
inferne cordato lanceolata. Spec. herb. mus. cum mea in omnibus  
coeternum fœulis

nicensis M. <sup>petaloque scabri</sup> caule decumbente, foliis quinquelobis obtusis, caule pilosis

malva nicensis: caule piloso decumbente, herbaceo, foliis subcordatis  
quinquelobis, lobis acutis, pedunculis erectis All. fl. Pedem. p. n. 1416.

Habitat in agro nicensi O  
affinis sylvestris.

Daunium A. foliis lanceolatis trinerviis bracteis subulatis pedicello  
longioribus

Vesit Dr. Allioni

an varietas genistifolii? folia late alterna. Corolla parva  
palato villosa. Calycis capsula globosa brevior.

genitifolium A foliis lanceolatis acuminatis, panicula virgata flexuosa

Len. Spic. pt. p. 858 <sup>Fl. austr. 2. v. 244</sup>

Linaria pannonica L. Plur. hist. 1. p. 321.

Linaria flor. pallido: nictu auro Bauh. pin. 213.

Habitat in Sibiriâ, Austria inferiore &

Caulis paniculati, subdecumbentes vel erecti. Folia alterna lanceolata, glabra, acuminata omnino. G. & nectoria. Racemi longi in paniculam adpositi a calyce ad calycem flexuosi. Flores alterni distantes: pedicelli longitudine calycis. Calyx glaber longitudine calycis. Corolla lutea magnitudine linariae.

Len.

Linaria: bracteis in pedicello brevioribus

bracteis pedicello brevioribus

Caulis in Clusio erecti, biarticulati, alter forte caule erecto rectus genis  
vel ambo

juncum a foliis linearibus alternis, caule paniculato virgato, floribus rai-  
nosi. Lin. Am. 4. p. 2774 L.V

Habitat in Hispania dicit Desfont.

Caulis sesquipedalis, subangulatus: ramis verticibus ramosisimus. Folia  
linearia longa subaristata, supra plana, subtus rotunda. Pedicelli stamini  
calycis raienosi, glabri, quinquefidi aequales, acuti margine membranacei.  
erecti. Corolla flava, palato fulvo glabro; calicis longum arbutum  
flavum

Juncum La Martii. Marten. Cavan. an Lin

Rami radicales steriles, folia quaternaria oblonga carnosa: caulium  
linearia infima 4na reliqua alterna. Convenit potius cum Desfont  
Martii Lin. nisi quod folia 4na.

~~non nisi Martii Marten. an Lin.~~

*Linnaea* a foliis lanceolato-linearibus conferti, caule erecto, fructibus terminalibus  
sessilibus, floribus imbricatis Lin. Spec. pl. p. 350, pl. Dan.  
Sylvi. Amer. capit. 930.

*Linnaea vulgaris* lutea, flore majore Bauh. pin. t. 212.

Habitat in Europa videratis

*Pelonia* Lin. Am. 1. p. 55. t. 3. Spec. pl. p. 359

Caulis erectus simplicis spinosus interdum ramosus plerumque  
pedalis saepe albior glaber. folia sessilia frequentia  
parva sicut quae pollicaria glabra. Racemus terminalis  
in pollicari et ultra flores erecti alterni flavi fac  
labia palato villosa erectis. Bractea linearis lanceolata  
pedicello longioribus foliis calycis ovata. Capsula  
duplo major quam in *genistifolia*  
*Pelonia* corolla pyramidata basi quadrilobata tubo  
quinquefido regulari

floribus imbricatis

racemis terminalibus

*Cinifolium* A. foliis lanceolatis Innerviis, floribus racemosis: pedunculis  
distantibus bractea brevioribus Lin. spai: pt. pug. p. 58.

*Linaria americana*, parvo flore luteo Bauh. prod. 106. p. 212.

*Linaria constantinopolitana*, lini sativi foliis, flore luteo Tournef. cor.  
y. Barb. cent. 1. p. 16. t. 25. f. 2.

Habitat in Italia montibus

Caules teretes, erecti, cavi. Rami alterni. Folia lanceolata  
s. angusto-lanceolata, alterna remota, cavia obsolete trinervia  
exquisite acuminate. Racemus erectus longus. Bractea lan-  
ceolata saepe flore longioris (h. meae Lin. bractea cordato-lanceo-  
lata.) Pedunculi longius in calicem. Calycis acuti brevis  
Corolla lutea palato interne villosa; calicem recto, longitudine flo-  
ris lin



monsperulanum a foliis lineari-filiformibus succulentis parvis confectis, cau-  
le erecto, calicibus calyce brevioribus Hort. kew. 2. p. 337.

Linana capillaticeo folio, odora Bauh. prod 106. n. 4 p. 213.

Linana odorata monsperulana Bauh. hist. 3. p. 459.

Antirrhinum monsperulanum foliis lineari-bus confectis, caule nati-

do paniculato, pedunculis spicati nudis Lin. spec. pl. pag. 854

L. V.

Habitat in Gallia

Caulis erectus teres glaber flores breves utriusque pedicellati, <sup>remoti,</sup>  
bractea filiformi. calyce lineari. Calicis corolla vertum

calyce brevibus. flori odorati  
a strato La Martini non videtur differre

bracteis pedicello longioribus

pedunculatum A. foliis linearibus remotis, floribus paniculatis: pedunculatis  
foliis longioribus, fructu Lin. Spec. pl. pag. 857.

Habitat in Hispania

Caules prothamnosii lignosi, ramosissimi. Folia lanceolata, longiora  
latiore Polygoni aviculani. Pedunculi fructu, foliis triplo  
longioribus. Calyx lani. Corolla lutea extra corollam fructu  
lin.

non ordi

Toarnes: Syn. Dubium

Lagopodioides A. foliis sparsis mollibus apice recurvis, spicis ovatis villosis  
Lin. Suppl. p. 279. t. V. pag. 557.

Habitat in Siberia

Caulis herbaceus usque pedales; erectus, pubescenti - molles, superne  
ramis alternis. Folia lanceolata - linearia, erecta, a margine  
reflexa, fere tomentosa, pallida. Spicae terminales et ramosae  
solitariae, densae villosae. Calyces compositi lagopi. Corolla respectu  
reliquarum specierum parva lutea. Palatum intus punctis  
duobus fulvis lin.

non vid.

non f. Syn. Dubium

vellosum A. foliis omnibus oppositis ovatis velloso, caulebus simplicibus, floribus  
oppositis lateralibus Lin. Spec. pl. p. 352 v

Linaria Hispanica, nummularia folio velloso Tournef. G. R. 4. 169

Antirrhinum saxatile minus, origani folio visoso et velloso, flore amplo  
Barb. ii: 597.

Habitat in Hispania & herb. Mus. <sup>nitida</sup>  
Folia minuta pedunculis breviora. tota planta densissime <sup>nitida</sup>  
Caules prostrati, vellosissimi, uti tota planta, in an. palmos.  
Folia petiolata ovata, semiconjugalana, obtusa, ut eximma  
Racemi terminalis. Flores remoti nuntantes

bicornis A foliis oppositis ovato-oblongis serratis, caule erecto, floribus raris  
sive capsulis bicornibus Lin. Am. ac. 6. p. 80. n. 17. 4

Andanthinum foliis oppositis oblongis dentatis, capsula corniculata  
Burm. afr. 211. t. 75. fig. 3.

Habitat in Cap. b. p. 0

Caulis sesquipedalis teris tetragonus. Folium inferum ovato  
oblongo superum lanceolatum, glabra, sessilia profunde  
remote serrata pollicaria. Racemi terminales inferne  
utroque ramo, flores bipartiti remoti corollae fauce lutea  
calicem flore brevior. Capsula ovata compressa, bifida  
lobis divaricatis

inferioribus  
oblongis dentatis

superioribus lineari lan

macrocarpon Andrikenum foliis oppositis ovatis serratis perfoliatis, pedunculis axillari-  
bus unifloris, capsulis compressis canalicatis truncatis Hort. Kew. 2. pag. 335.

Habitat in <sup>Indi</sup> C. l. per Schumacher

Caulis herbaceus, tetragonus, glaber, uti tota planta.

Folia opposita, pollicaria, obtuse serrata, basi integerrima, quinque  
nervia

Petiolus brevissimus

Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, foliis brevior

Calycis laciniis f. lanceolato paeutis, subaequalibus.

Corolla <sup>in partibus linearis</sup> calicis <sup>dimidio brevior</sup> longitudinalis fere ipsius corollae, rectum, obtusum.

Capsulae oblongae, calycis longioribus; valvulis extorsura mucronatis

<sup>as</sup>  
Chamodrifolia <sup>as</sup> #. foliis petiolatis ovatis dentatis caule erecto villosis  
floribus subsessilibus  
Habitat in C. p. p. l. O

Planta palmans et ultra ramosa caule tetragono. Folia  
petiolata vix unguiculata pilis minutissimis adpressa  
serraturis utraque 2-4. Pedunculis terminalibus aggregatis

ab Antiochiano macrocarpo vix diversa ?

an potius Hemimeris latifolia Theob

pinnatum a foliis oppositis pinnatifidis, caule erecto, floribus micropis Lin.  
Suppl. p. 200      N. pag. 556.

Habitat in Cap. b. p. i.

Caulis villosus simpliciter firmus. Folia inferne laciniis utrinque 3-4  
aiuta superne nulla. Capsula siliqua bicornis



pyrenaeum A.

Habitat in Pyrenaeis dedit Desfont  
Caulis plures & simplicis, spithamei

*Pallasia* 3 P. frutibus alatis, ali membranaceis crispis dentatis. L'Herit  
in Act. sci. lin. t. pag. 100.

*Revolucius aphyllus* Pall. N. 2. 730. t. 5 et 3. pag. 356

*Pallasia capitata* Lin. suppl. 252.

Habitat ad mare caspicum 5

Stem semicyathis ramisque diffusis, totus floribus. Rami alter  
ni teretes recti flexuosi, articulati, subnodosi: ophelli  
Ternones ad singula quaevis membris 6-10. confertissimi  
fasciculati, juncti simpliciter vel raris. Folia alterna  
tubulata ad singulos articulos Ternorum, solitaria, teretia  
carnosa Ternones conformia, pennatibilia. Stipulae vaginae  
membranaceae obsolete trifidae, marida articulum ambiens  
Flores laterales et axillares papaveris Terni ad singulum  
articulum, pedunculati L'Herit