

Antirrhinum

xxv Folius alteris

38. Dalmaticum A. foliis cordatis amplexicaulis
39. hirtum A. foliis lanceolatis hirtis, floribus spicatis, foliolo calycino supremo
maximo
40. Daunium A. foliis lanceolatis trinerviis glabris, bracteis subulatis pedicello
longioribus, corollis palato villosis
41. genistifolium foliis lanceolatis attenuatis, panicula virgata flexuosa, bracteis
pedicello brevioribus corollis palato villosis
42. pinicum A. foliis linearibus, caule paniculato virgato, floribus racemosis
43. linearia A. foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, racemis terminis
natis, floribus racematis
44. linifolium A. foliis lanceolatis trinerviis, floribus racemosis: pedunculis
diffantibus bracteis brevioribus
45. penifolium A. foliis filiformibus sparsis, floribus spicatis, pedunculis calycis
vibrisque villosis-viscosis, caule ramoso virgato
46. Chalepense A. foliis linearilanceolatis, floribus racemosis, calycibus corolla
longioribus, caule er

47. *pedunculatum* A. foliis linearibus remotis, floribus pedunculatis: peduncu-
latis foliis longioribus ^{fructibus} lanceolatis - linearibus
48. *Lagopodium* es A. foliis parvis mollibus apice recurvis, specie ovatis villosis
x x x x foliis nullis
49. *aphyllum* A. caule caputari aphylo.
x x x x corollis hinc tribus aut quadratis
50. *maius* A. corollis ~~ecadentibus~~, floribus fructibus, calycibus rotundatis foliis oppo-
sitis lanceolatis, superioribus alternis, bracteis ovatis, calycibus
rotundatis brevibus.
51. *orbium* A. foliis lanceolatis inferioribus oppositis, floralibus alternis
calycibus lanceolatis corolla longioribus
52. *populionaceum* A. foliis ovalibus carnosissimis, floribus axillaribus, calycibus
populionaceis
53. *asarina* A. foliis oppositis cordatis ^{oblique dentatis} ~~crenatis~~, caulibus procumbentibus
^{subangulatis}
54. *molle* A. foliis tomentosis ovatis oppositis, floralibus alternis, caulibus
procumbentibus
^{integerrimis}
55. *glutinifolium* A. villosis ^{viscosa} foliis oblongis inferioribus oppositis superiori-
bus alternis, caule erecto
56. *unitrattum* A. corollis callosis duobus, foliis alternis pennatis, caule
paniculato.

xx. xx + corollis leantibus

57. bellidifolium A. foliis radicalibus singulatis dentatis venatis; caulibus par-
tibus integerrimis

58. canadense A. foliis linearibus alternis: lacinis inferioribus explanatis

Dubie generis

^{prope montes} Anallax A. villosis-rufis, foliis linearibus lanceolatis pedunculatis acutis

34-35. Chamosyfolium A. foliis pedicelatis ovatis dentatis, floribus subsessilibus

34-35. Scabrida A. foliis radicalibus pedicelatis oblongis caulibus sessilibus

34-35. rostrata A. foliis oppositis pennatifidis, pedunculatis terminalibus subumbellatis

34-35. fasciculata A. foliis pedicelatis oppositis oblongis subsessilibus pedunculatis terminalibus subumbellatis lateralibus oppositis

anther cordata
 reniformis
 5-6 foliolos
 calyciformis
 lobatum
 lobatum } Baaty

a. equisetum

foliis om. sub. oppos. - verticill.
infer. 5-7 prof. super. alternis
 verticill. sup. alternis

Saxifragulatum A. Folis petiolatis oppositis oblongis subserratis, pedunculis
caeteris terminalibus sub umbellatis lateralibus oppositis

Habitat in Cap. b. p. i. o

Caulis erectus, spithameus a basi ramosus, rami tetragoni
simpliciter altitudine fere caulis folia unguis dulciana
obtusis remotissima, trinerviis. Peduncululi filiformes
pollicares. Corolla flava

an Hemimera

integrifolia H. foliis oblongis integerrimis ~~puberatis~~ que caule erecto

Habitata in Cap. b. sp. 0.

~~Caulis ex palmari ramosis tetragonis vix villosis. Foliorum
petiola unguiculata obtusissima saepe utraque dentata uno
vel altero. Pedunculi terminales aggregati.~~

an *macrophylla* Thunb.

umbrosum Andinh. foliis ternis ovatis villosis subtineris.

Cinchonum triphyllum Cavan. Fi. 2. p. 61. Tab. 174

Habitat in umbrosis montosis Hispanie

Caulis pedalis erectus, uti tota planta villosi superne ramosi. Solu-
terna vel quaterna internodii longiora simplicia integerrima,
molliora. Florales opposita vel alterni. Racemus terminalis
lacinus calycis subpatulato Corolla calice adnata luteo
fauces saturatior. Galea lacinus albo lineis fuscis. Fructus
globosus apice bilobus.

~~Hemimena~~ an.

Scabida A. foliis radicalibus petiolatis oblongis caulinis ^{ovato} sessilibus lanceolatis
serratis nervosis.

Habitat in Cap. b. p. p. p.

Planta palmari ^{dentato} Caule tetragono glabro ^{erecto} strato. Folia unguicula
na serrata. Pedunculi terminalis subaggregati

an Spec. hemimena

~~rostratum a~~
~~rostratum~~ ^a ~~Hemimenes~~

rostratum A. Pedunculis terminalibus subumbellatis, foliis pennatifidis, caule
erecto.

Habitat in cap. b. frei O

Caulis herbaceus fruticoseus ramosus. Rami oppositi striati glabri
articulati. Colea subpetiolata glabra unguiculata, saepe ter
na inferora obtusissima superiora acutiora dentibus utraque
tribus profundis. pedunculi filiformes aggregati

an Hemimenes unilobata

an Antiochenam rostratum Benthii

Triphyllum A. foliis ternis ovatis.

Linana sicula latifolia triphylla Boiss. pi. 44 t. 22.

Linana hispanica Clus. hist. 1. p. 320.

Linana triphylla minor Lutea Bauh. pin. 212.

13. *Linana triphylla comulca* 312.

Habitat in montibus valentini et Hyblaei circa Syracusas: unguicula
Siciliana

Siciliana

Caulis erectus, teres, & laevis, simplicis spinosus, erectus semipedalis
terres

Folia sessilia, ternis, oblonga, integerrima, avenia, obscurè trinervi
vra à stantia unguiculana vel ultra. Spica terminalis

foliicola duo calycis inferiora latiora breviora ovata.

Yriornithophorum A. foliis quaternis lanceolatis, caule erecto ramoso, flori-
bus pedunculatis. Lin. spec. pl. pag. 853. +

Linaria americana maxima, purpureo flore Herm. huydb. 376. t. 377.

Habitat in Lusitania, America. a ^{altitudine sex hominis} ^{inferiora quater} ternata

na Caules erectus herbaceus ^{sesquipedalis} glaber ternis. Folia ^{superiora quater} ternata integerrima bipolliciana glaberrima, trinervia. Peduncu-
li ternati verticillati alteris remoti pollicares, uniflori ^{stadium}
lineares ad basin proculi. Calycii foliola aequalia lanceolata alterna
ata. Corolla maxima hujus generis ^{sepe} bipolliciana

qu ^{qu} lanceolatis quaternis
foliis superioribus ternatis, floribus pedunculatis verticillato
ternatis

15-16
16-17
Thymus folium Antirrhinum foliis ternatis oppositisque ovalibus glabris, floribus
capitatis, caulibus procumbentibus

Habitat in arenosis maritimis Bayonnae Copose

Caulis plures, filiformes, palmares, glabri, uti tota planta, procum-
bentes, sub simplicibus, et linea decurrente ^{utrinque} angulati.

Folia sessilia, ^{basi ad} apicem usque fere ternata, summa opposita, oblonga,
crassiuscula, roseo glauca, inferiora rotundiora, parva, obtusiuscula, basi acutiora; ~~crassi-~~
siacula, roseo glauca

Flores terminales, pauci, pedicellati in capitulo. Bractea bina, ad
oblonga ad basin pedicellorum.

Calycis foliola oblonga glabri uti bractea

Corolla lutea. Calicis parum recurvum

(affinis supino.

origanifolium foliis plerisque oppositis oblongis, ^{floribus} floribus alternis Lin. Spec. pl. pag.

9524

Antirrhinum saxatile, foliis serrulatis Bauh. pinod. 106. pin. 212.

Barrel 40 Antirrhinum saxatile villosum, organifolio glutinoso Barr. u. 590.
590 non videtur esse ead. em. planta Antirrhinum saxatile alpinis folio uncinato et villoso Barr. u. 1102.
1103.

Antirrhinum saxatile thymifolio, flore rubello Barr. u. 1313.

Habitat in Pyrenaei monte auro, Masfils O

Caulis plures erecti vel ascendentes ramosi pubescentes. Rami inferiores oppositi supremi fl. alterni. Folia petiolata

pubi glandulosa inferiora caulina et inferiora ramorum opposita superiora floralia alterna, semunquiculata, inferiora glabra

scula superiora villosa. floralia linearia ^{tenis racemosa} pediculi alterni uniflori folio florali longior uti calycis villosi

foliis distinctis. foliola calycis linearia corolla breviora
Corolla parva pubescenti superne violata. Capsula globosa villosa calycis brevior. Calycis brevis rectum

obtusum
Habitat in Tunetis legi cauli tenerior caulibus minus ramosis
diffuso glaberrimis

ai altern foliis
minibus. Sole
petiolata pmi
folia anti opposita
caules capescentes
pui herb
manch

minus A. foliis plerisque alternis lanceolatis obtusis, caule ramoso ramo diffu-

so Tru: pl. pag. 852. fl. Dan. T. 502.

Antirrhinum Vestrum Cam. epul. 922.

Antirrhinum arvense minus Bauh. pin. 212.

Habitat in Europa cultis ruderatis, glareosis &

caulis palmari pubescens subviscosus. Folia sessilia basi
panum attenuata, margine vellis aliquot, polliciana vel minorum
peduncululi axillares solitarii filiformes villosi vixi ^{inopuella} uni flori
foles breviores. foliola calycina longitudine capsulae. Cap-
sula oblonga glabra

Infr. a foliis linearibus parvis inferioribus oppositis, nectariis subulatis, flori-
bus ^{sub} sessilibus - P. V. p. 555

Linaria hispanica procumbens Mart. Dec. 35. fig. 2.

Linaria vestita hispanica Dill. Clth. 201. t. 164. fig. 199

Habitat Gibraltaro

Caulis radicales plures glabri semper decumbentes. Folia linearia
subarista, cum vixta rose glauca superiora parva frequentia. Pedun-
culi terminales bis tripollicares superne ut bractea et calycis

Florae approximatae ^{sub} pubescentes. Corolla colore loti sacrobori calicem striato. varietas
colore cinereo albo s. purpureo Capsula cranulata.

reflexum Centurhium? ^{oblongis glabris} foliis inferioribus ternis ^{superioribus alternis} ^{obovatis} ^{inferioribus ternis} ^{pedunculis}
axillaribus, caule decumbente. ascendente

Centurhium reflexum: foliis ovatis alternis glabris, pedunculis axilla-
ribus: fructu feris elongatis recurvatis, caule procumbente Lin.

^{l. t. p. 557.} Cornifolium in cultis Tuneti ubi florit fine mensis februarii in cultis
Caules plures; ascendentes, saepe pedales, glaberrimi, toti planta
folia ^{in summa} ^{petiolator} inferiora ternis, reliqua alterna, subsessile, oblonga, basi an-
gustiora, unguiculata,

Pedunculi sesquipedales, cum axillaribus, uniflori, foliis longiores
per erectis peracta florescentia reflexis sed vix longiora

Calycis

calicula duo superiora. calycis lanceolata, reliqui angustiora

Calycis Corolla calycis longitudine pedunculi. labium superius
trifidum; laciniis erectis ^{linearibus} lanceolatis, obtusis, cum complicatis, rubillo
uti calycis; inferioris trifidum: laciniis rotundatis, pallidioribus,

Palatum roscis inter linea duplici velloso ^{color} crucis ad tubum interum
tubi extensus, inter linea duplici vellosum.

Centurhium alleon corf. 205. fig. 1

Linaria pusilla procumbens latifolia, flore pallido. veta luteo
Raj. bot. 755.

*Antirrhinum procumbens racemosum, foliis alternis ovatis acumi-
natis integerrimis floribus caeruleis All. bot. 209. fig. 1.*

flavum . A. ^{hipenonibus} foliis inferonibus Vernis subrotatis ~~fractis~~ linearibus Poir. d. 2. p. 191
Habitat in Barbora

non vid.

~~difficilis~~
~~asper~~ ~~to~~ ~~lam~~ P

virgatum A. foliis ovato-lanceolatis basi inferioribus ternis caule simplicis pino

Pow. J. 7. p. 192.

Habitat in Bastonia

non vid.

fascium P. panicula simpliciter ramis erectis, floretulis secundis geminis, altero brevius
pedicellato, culmo erecto subdorso; foliis lato lanceolatis, in prodr
pag. 23.

Habitat in Jamaica

non vidi nisi brevenum meum

respicolor A. foliis lineari-lanceolatis, inferioribus ternis, caule erecto spicato
L. V. pag 555. Faïqu. m. p. 2. p. 356. Gc. rar. Tab. 31.

Androsaceum linanoides foliis lineari-lanceolatis ternis, caule erecto-rariemo
fo. ten. Spec. pl. pag 853 x

Habitat in Europa australi © Ved. Desfont

Folii glabra. Caules fistulosi superne villosi. Bractea et calycis villosi
glandulosi. Pedunculi longitudine bractearum. Corollae magnitudine et figura
ant. linanoides. Labrum superius orbiculato-peltatum uti inferius. Pala-
tum luteum calycis violaceum. Stylus apice violaceus. Faïqu.

~~Androsace~~
Ant. linanoides spec. ed. 1.

Mastrum A. foliis subulatis canaliculatis Carnosi: inferioribus ternis, caule
paniculato corollisque glaberrimis Lin. Spec. pl. pag. 854x

Habitat in Hispania ♂

Caules semipedales erecti glaberrimi ramosissimi ^{ramis vixatis} paniculati ramu-
lis filiformibus. Folia tenuia superiora alterna antequam caulen-
tis ternis oblonga, reliqua alterna tenuia canaliculata glabra
carnosa. Stem racemosi racemus flexuosus. bractea angustissima
nerviis brevioribus: Calycis glabri. Corolla flava cum unctura
rubicunda in retuso gibbo palati. Alimentis differt floribus
pedunculatis, triplo majoribus et tota planta multo maiore

pelespanum A. foliis caulibus linearibus alternis: radicalibus lanceolatis ternis,
floribus corymbose Lin. I. V. Mart 416

Linaria coerulea minor Lob. illustr. 103.

Linaria coerulea calicibus longis Bauh. hist. 3. p. 461.

Linaria annua purpureo violacea, calicibus longis, foliis ovatis rotundioribus. Barret. ii: 116r.

Habitat in Gallia, Italia &

Caulis plures erecti, semipedales simpliciter glabri teretes
foliis inferioribus oblongis ^{interdum una} superioribus ^{subcarnosis} unguiculatis remotis. ^{est} flori-
primum racemosi corymbosi racemosi. demum capsula demum
in racemo tripollicari subflexuoso bractea subulata lon-
gitudine pedicellorum. Calycis subulati longitudine capsula
calicis corolla tenue, pedicello longius. Corolla violacea
palato albo venis violaceis obsoletis labro superiore longiore

demum racemosi

Chalepense A. foliis linearibus canaliculatis, floribus racemosis, calycibus corolla
longioribus, caule erecto Lin. S. V. ^{gouan}
Linana Chalepensis minor erecta, flore albo Lineis violaceis Morf. hist.
S. p. 502. f. 5. v. 35. fig. 9.

Linana annua angustifolia, foliis albis longis caudatis Trimum. f. 1.
obf. 17. f. 17. fig. 2.

Habitat in Italia

Caule erecto glaucis viridis uti folia, glaber. Folia angusta
peltata attenuata inferiora terna interdum in culta
quaterna superiora alterna subternata. rudimenta ramu-
lorum ex axillis. floris primam conferti demum remotiores
in racemo, albi. bractea linearis pedicello parum longiori
foliolo calycis linearis longitudine corollae calicis corolla
^{duplex} longior ^{seleformi} corolla alba
antitheseum Chalepense foliis inferioribus quaternis, ceteris
alternis, floribus racemosis, calycibus corolla duplo longior
ibus ^{gouan} ill. pag. 384 quaternis
inferioribus ternis

Jupineum A. foliis subquaternis linearibus, caule diffuso, floribus racemosis
si, calicari recto. Lin. Sp. pl. pag. 256. *

Linaria hispanica S. Pluf. hist. 1. p. 321.

Linaria pumila *Jupineo* lutea Bauh. pin. 213.

Habitat in Gallia, Hispania arenosis

Caules ^{simplices} via palmari ^{inquinatissimi} decumbentes glabri folia angusta
crassiuscula glabra. pedunculi uti calyci et bracteo pubescentes
flori in apice conferti subcapitati. corolla calicari recurvata. folium
superius calyci reliquis longius.

Calicari recurvatum audit in speciebus in Systemate rectum uti *Jupineo*
in meo

Linaria Seydium flore luteo maculato Guss. v. d. L. herb. Guss.

capitati

subcapitato

15-16 Holava Arid interior foliis linearis lanceolatis inferioribus subquaternis, ^{glabris} floribus capitatis,
calycibus pelosis, caulibus simplicibus

Anterionum holava. foliis linearibus, alternis inferioribus ternis; floribus racemosis capitatis; calice bifido, labio tridentato Coffm. deph. p. 111.

Habitat in gypto.

Caulis plures, digitales vel palmares, ascendentes, glaberrimi.

Folia sessilia, unguicularia, glabra, ^{stipitata} crassiuscula, inferiora ^{us} ternis ^{us} quaternis, superiora alterna ^{subsessile}.

Flores in capitulo collectae, bracteae et calycis peloso-ciliato.

Corolla calicis rectum, corolla longior.

219

Colpant. multicaule, glabra, superum Holava.

glauum A. foliis quaternis subulatis carnosis, caulibus erectis, floribus spicatis

Lin. Am. 4. p. 2774

Linaria foliis carnosis cinereis Bauh. pin. 213?

Linaria maritima foliis succulentis Barb. cent. 4 p. 23. 7. 37. p. 37. p. 37.

Habitat in Europa australi, Oriente &

et in Lin.

Caulis fere pedalis, erectus uti tota planta glauca - vides textu
foliis subulata subtriplicata, succulenta, erecto patula
superiora alterna ramea. Spica raris terminalis. Calyx
patulus apicibus reflexis uti bractea. Calycis foliolum superum
duplo longius. Corollo flava ad faucem fere fulva, glabra
tabis inferiore divaricata. Calicis longum arcutum
cinereis compositibus stratum. Similis A. arvensi sed
calyx glaber et corolla quadruplo minor

an mea Lin. Caulis plures vix pithamou parte rami.
Specimen herbarii foliis copiosa pedicelli bractea et calycis marginem
Dulcor pelosi conspexit cum Linaria s^{ta} Clusii an potius
et ni fallor superum superum quod res floribus potatis q. In quod res floribus

Ononis ^{leucanthe} *A.* foliis in senonibus quaternis lvs, floribus racemosis, supremo
calycis lobis duplo longior. *Joan. Illustr. pag. 30.*

leucanthe *hispanica* ^{caudex} *Bluff. hist. 320.*

leucanthe tenuifolia *onizinei* coloris. *Boeck. pen. 222*

Habitat in Europa australi ^{loca supra ramis} ~~et~~

Facies *Ant. siphoni*. Caule plures glauci ^{et} ~~erectissimi~~ ^{palmas}
folia, ima quaternis, glaucis, brevibus, cetera congesta ^{et} ~~alter~~

bracteae *renqueulana* ^{tenuia} ~~loca supra ramis~~. *Reisnerus*

terminalis *crispis*. *pedunculus* *longus* *aphyllus*. *Pedicelli*

brevissimi *hepidi*. *Calycis* *obtusis* *relloso* *viridi*. *ut* *in* *ant.*
supremo. *lobis* *erectis* *conspicuis* *albis* *stibus* *concoloris*

palato *sub* *levari* *joan*
ant. in *supremo* *differt* *calycibus* *aequalibus*; *collis* *luteis*

duplo *minoribus* *luteis* *capulis* *duplo* *majoribus*
Pelorum *in* *hanc* *vidit* *joan*

arvense Q. foliis sublineariis: superioribus quaternis, calycibus pilosis rufidis, floribus purpatis, caule erecto Lin. S-V.

Linaria arvensis coerulea Baub. prodr. 107. pin. 213. Dill. Elth. 199. 7
163. fig. 190.

β. Linaria pumila foliis carnosis flosculis minimis flavis Baub. pin.
213. Dill. 200.

γ. Linaria quadrifolia lutea Baub. pin. 213.

Linaria tetraphylla lutea Col. Euphr. 1. p. 299. T. 300 fig. 1.

Habitat in Angliis, Gallis, Italia arvis O

Caulis ramosus glaber, rami alterni simplicisissimi, folia opposita
nervata alterna pollicaria rudimenta ramulorum et axillis
flores in spica terminali, capsula ^{glabra} breviter pedunculata remoti.
calyce longiores calycis et bractea lineares.

Saxatilis a foliis lanceolatis-linearibus sparsis villosis: inferioribus quaternis, cau-
le decumbente, floribus spicatis Mont. 416. Am. acad. 4. p. 277
Linaria maritima villosa, foliis hirsutis, floribus luteis Mont. hist. 2. p. 499

blof. 200
Habitat in Hispania 4

Caulis palmari villosus villosus, uti tota planta subramosa. Folia
supra in quicquidana, inferiora minora, crassiuscula, app-
requeantia. Flores paucissimi conferti in picea demum racemosa
racemo bipollicari. Corolla lutea. Bracteae uti foliola caly-
cis linearia longitudine calycis. Calycis villosus subvillosus

lineariibus sparsis - villosis - villosis

viscosum A. foliis radicalibus quaternis lanceolatis, caulinis linearibus alter-
nis, calycibus villosis cauli approximatis Lin. Am. ac: 4. p. 3194

Habitat in Hispania O

Caulis pedalis erectus teris: rami remoti raris. Caules frutici diffusi
foliis quaternis lanceolatis. Folia caulina vix decem remota
linearia / subulata. Rami vix flores nudi. Racemus simplex
longus, erectus, piloso-villosus: pedicelli cauli approximati. Calyx
5 foliola lanceolata, membranacea, cornea viridi piloso-villosa.
Corolla fulva, magnitudine linariae Lin.

non vidi

alpinum ^{flores albis} a foliis quaternis linearibus lanceolatis glabris glaucis, caule diffuso
florebus racemosis calcaris recto. Lin. Spec. pl. p. 856. Thunb. fl. austr. 1. 4. 50
Linnaea 3. Fincaia. Clus. hist. 1. p. 322.

Linnaea quadrifolia sapena Bauh. pin. 213.

β Linnaea caulea repens Bauh. pin. 213.

γ Linnaea foliis carnosissimis Bauh. pin. 213

Habitat in alpinis Europa australi

Caules filiformes plures simplices glabri uti tota planta, palmariter
flexuosi teretes. folia omnia, floralia excepta, quaterna
rarius suprema terna, subcarnosa, lora semivivipara.

exteriorum parva
oblongata

flores ad apicem approximati: bracteae longitudine pedicelli
calycis foliola lineari. Corolla violacea palato croceo

purpureum G. foliis quaternis linearibus, caule erecto spicato L.V.

Mant

pag. 416.

Linaria alba purpurea Dod. pempt. 183.

Linaria purpurea major odorata Bauh. pin. 213.

Linaria purpurea magna Bauh. hist. 3. p. 460

Habitat purpurea in regno Neapolitano

inferiora saepe
5
Caulis erectus ^{et ultra} ~~fusca~~ pedalis ramifera rami alterni glabri uti tota ^{subtus} ~~superiora~~
plantae. Folia basi attenuata pollicaria loria avena ^{et nervia}
superiora sparsa. Racemus terminalis elongatus. bractea
lineari pedicello brevioribus. Calycis foliola linearia. Corolla
violacea. Palmar longitudine corollae extrorsum curvatum

superioribus sparsis, floribus racemosis

reperit a foliis linearibus confertis: inferne quaternis, calycibus capsulam
aquantibus Lin. l. V

Linaria angustifolia, flore cinereo striato Dill. Clth. 19 p. 7. 163. 7. 197.

Habitat in Anglia, Gallia, Italia &

Caulei laxi, debiles, diffusi, glabri, uti tota planta, rudimenta
ramulorum ex axillis. folia suprema aeterna inferiora
pollicaria sespita. Praetermi terminales. flores remoti
bractea et calycis linearis pedicelli bractea longioribus calta
longitudine fere pedicelli labium inferius supra parum villosa
capsula globosa corolla pallida striata

~~anthemum~~ striatum aconon

bracteis pedicello brevioribus

caulibus diffusis.

bipunctatum A foliis linearibus glabris: inferioribus quaternis caule erecto panicula
to, floribus punctato-caputatis Lin. Spec. pl. p. 853.

Linaria lutea parva annua Bauh. hist. 3. p. 457

Habitat in Italia et Hispania anni O

folia vix unguia Caulis pithamocis ramis fructi ad angulum rectum extantibus
folia lanceolata, sessilia, plana, patentia, vix carnosia, fere
tertia vix flores subpunctati parvi sessiles. Corolla flava
punctis duobus ^{superioribus} in palato glabris versus labium superius
labium superius bipartitum, replicatum lanceolatum, erectum
lin.

bellide flavo

Caulis decumbens villosuli. Folia infima pro, linear-lanceo-
lata, vix unguiculata, villosula herb. v. prosa. Flores superius
remoti, brevissime pedunculati. Folia floralia calycis longiora
Calycis lacina lanceolata, villosa. Flores parvi herb. 4us

hidum A. foliis lanceolatis hirsutis alternis, floribus spicatis, foliolo calycis
supremo maximo latiori. Gaique. mese. 2. p. 334. Gouan illustr. pag. 38

Habitat in Hispania

ramis simplicissimis floriferis

Caulis erectus hirsutus, cætera superne ramifera, semipedalis, pulis glandulo
sis. Folia sessilia lanceolata oblonga integerrima pollicitana, crassius
cula avenia enervia hirta præsertim marginibus. Flores antiorbiculari
lineari inferiori & motiori superioribus confertiores. bractea lanceolata
hirta folium superius calycis oblongum latius et longius quam reli
quis, 4 reliquis linearibus obtusis. Capsula subpubescenti longitudo
ne calycis æquali

Folia cætera præsertim in propagantibus 4na

multicaule a foliis quinque lineari carnosis, floribus corymbatis Lin. Spec. pl. p.
8564

Linaria sicula multicaulis, molluginis folio Boerh. fr. 30. t. 19. fig. 1.
Habitat in Sicilia, Oenota O

Caulis junceus laxus. Folia linearia obtusa. Lin.
Caulis plures, simpliciter, erecti, pedales, glabri. Folia linearia
angustissima, inferiora quatuor, superiora parva, pollicaria, spica
brevis. Flores parvi. Calicis rectum herb. 4 usq

reticulatum Andréth. foliis linearibus canaliculatis prostratis: periclymenum radi-
calium quinis, calycibus hispitis, pedunculis bracteis brevioribus Smith. G. part
2. tab. 2.

Habitat Algiris 4 in annis ad Potam flammam Lexi
Caules erecti, glauci, glabri. ^{terrestris} periclymi radicales plures decumbentes
Folia caulina sparsa obtusifolia nuda, glauca. periclymenum brevius
ve obtusiora 5:4 vel 6:4. Racemi terminales. Pedunculi
breves hispiti et subsimplici. Bractea solitaria longitudine pediculi
li uti calycis foliola lanceolata hispita margine membranacea
ceo. Calycis subsimplici. Labium superius purpureum inferius
aureum.

cauli inferiore ramis uno alterove

pinifolium La Mart. et Pavet
varietas. Folia inferiora 4na linearia bipolliciana, superiora
alternata. Racemus 4 pollicianus. Calycis foliola linearia, inaequa
lia

caule subsimplici.

~~marginatum An. Durkinium foliis glaucis linear lanceolatis
imbricatis verticillatis. superioribus parvis, floribus aggregatis
terminalibus, pediculis marginatis Desfontaine in Act. Soc. Sc.
Refectuariae n. Par. 1. pag. 36. Tab. 7.
in Indis Habitat in montibus Nempu barbaris J
Folia inferiora verticillata 6. Corolla lutea~~

marginatum Cl. foliis linearibus lanceolatis imbricatis superioribus
parvis floribus aggregatis terminalibus.

reedit Desfont

aqueaticum Ant. foliis verticillatis, floribus solitariis rotunde inflatis
Lour. fl. Coch. pag 384.

Habitat in paludibus cochinchinae

Caulis herbaevis, bipedalis erectus, teres glaber. folia lanceolata
lineari subquadrata integerrima, glabra sessilia. flores
axillares. Corolla hians. Capsula oblonga

brunelloides f.

~~*Asplenium brunelloides* procumbens, foliis lanceolatis pubescentibus,
specie densis villosis terminalibus, bracteis lanceolato-ovatis, caly-
cia majoribus La Mart. Tabl. Enc. pag 41.
Habitat in Java.~~

herbaria mea

canadense A. foliis linearibus alternis, corollis bicinctis: Calice inferiore
explanato. Lin. Spec. pl. pag. 8614

Anthurinum caule simplicissimo longissimo, foliis caulinis linearibus;
Stolonum procumbentium lanceolatis minimis Gron. voy. 67.

Habitat in Virginia, Canada &c

Caulis erectus filiformis pedalis vix ramosus. Folia remota
glabra. Racemus terminalis raris. Flores alterni. Calyx
acutus. Corolla labrum superius breve reflexum. Labrum in-
ferius magnum patens dependens; calicem subulatum hu-
redit hinc.

an meo hinc corolla calicatum facie ant. arvensi

flexuosum A

Habitat in fopere ripium montis Hamamelis. ubi legitur
Taceo. Dat minus organum.

flexuosum A

~~pallens P. panicula compressa ovata, ramis confertis erectis, spiculis ovatis
subulatis, culmo subdiviso geniculato, foliis ovato-lanceolatis, vaginis
collo marginibus ciliatis. Syn. prodr. p. 23.~~

~~Apleuda Zengiter Aub. fl. guian.~~

~~Habitat in America meridionali~~

michi ignotum nisi nunc erectum

maius A. corollis caudatis, floribus spicatis, calycibus rotundatis L. R. V

a. antirrhinum majus rotundior foliis Bauh. pin. 211.

Antirrhinum luteo flore Bauh. pin. 211.

Antirrhinum latifolium, pallido amplo flore Boiss. mus. 2. p. 49. 741.

β. Antirrhinum majus athenum folio longiore Bauh. pin. 212.

Antirrhinum Dod. pempt. 102. Lob. ic. 404.

Habitat in Europa australi maribus sepibus ^{suprema inter flores villosi} Rami oppositi. Folia

caulis erectus ramosus teris glaber. Caulis simpliciter obscure

furcatus ad breviter petiolata lanceolata, glabra simpliciter obscure

per huc aut venosa, bipollicaria flores terminales inferiores pedunculati

superiores alterni prope deum bene pedun-

culati. folia floralia ovata vix longitudine calycis villosi

secula. foliola calycina oblonga rotundata breviter

varietas foliis angustioribus linear lanceolatis

foliis oppositis lanceolatis floribus inferioribus oppositis
bracteis ovatis alternis superioribus inferioribus alternis
calycibus longis calycibus rotundatis breviter

ovatum a corollis ciliatis, floribus subsessilibus, calycibus corolla longioribus
Lin. Spec. pl. pag. 460 L. Jan.

Antimonium sylvestre, phytoma. Dod. pempt. 212.

Antimonium arvense majus Bauh. pin. 212.

Habitat in Europa agris et arvis ☉

Caulis erectus, ramo uno altero ve opposito. folia ^{superne pubescent} inferna glabra ~~vellosa~~ pedata. folia
inferna breve petiolata, glabra, opposita, bipollicaria,
superiora s. floralia alberrima, sessilia, villosissima,
sensim minor. Flores subsessiles. Toleola calycina
lanicollata superior fere polliciare. Capsula villosa

foliis lanicollatis inferioribus oppositis
superioribus floralibus alternis, calycibus ^{lanicollatis} corolla longioribus

axillare a. villosa ^{viscosa} foliis linearibus - canaliculatis pedunculis
axillaribus unifloris
antheris linearibus 5-6-7

Habitat in Egypto

Tota planta villosa viscosa. Caulis teris pedalis erectus subra-
mosus folia alterna utraque attenuata, sesquipedalana
pedunculis axillaribus solitariis unifloris unguiculatis superne
bracteis binis approximatis petalis. Calycis foliolarum
ovatae aequalis linearis capsula breviora. Capsula ovata
attenuata quadri-valvis

ramuli ex omnibus axillis

in hujus generis

papilionaceum a corollis elaudati, floribus axillaribus, calycibus papilionaceis, foliis carnosif Lin. Mont. Pl. & L. V. pag. 557.

Habitat in Persia

Caulis sempedales ramosi glabri ~~supra~~ ^{terti}. Ramis alternis apice pubescentis. Folia petiolata ovalia vel obovata unguiculata, ^{alterna} crassifolia ovata, glabra. Floribus axillaribus solitariis, breviter pedunculatis, longitudine foliorum. Calycis foliolum superius, majus, corollam, longitudine fere floris, reliqua sublaevi colorata corolla dimidio brevior. Corollae labrum superius bifidum inferius trifido latiori.

~~an folia opposita?~~

Afanna A. corollis exsertatis, foliis oppositis cordatis, serratis, caulebus
procumbentibus Lin. Spec. pl. pag. 8604

Afanna I. Hedera saxatilis Lob. ic. 601.

Hedera saxatilis magno flore Bauh. pin. 306.

Habitat in rupibus Vexano conterminis, Geneve &

Planta pilosa viscosa. Folia petiolata, polliciana ^{obtusule} dentato
~~obtusule~~ subangulata villosa. Pedunculi ^{duplo} axillares solitarii alter
ni, calyce longiores. Corolla minor est quam in Afanna

molle A. corollis eicardatis, foliis ovatis oppositis tomentosis, caulibus pro
cumbentibus Lin. Sp. Pl. pl. pag. 860*

Antirrhinum hispanicum villosum, organo folio glutinoso Tournef. F.R.H.
pag. 160.

Habitat in Hispania 4

mollissimi

Caulis teretes, uti folia et calyces, tomentosi. Folia petiolata,
unguiculata ^{moll} obtusa. Flores superne ~~alterni~~, alterni,
magni. Tolum florale petiolatum struictura cauli
novum. pedunculi calycis longiores. Corolla alba palato
flavo, labio superioris nitro struato, calicis nullum

floralibus alternis

glutinosum A. villosa ^{var.} villosa foliis oblongis inferioribus oppositis superioribus
alternis

Habitat

ex horto panjense

Caulis erectus uti folia tota planta villosa villosa. Folium
subpeltata integerrima non tomentosa unguiculata obtu-
sa. Flores superne alterni infimi breves pedunculati
bractea longitudine calycis foliola calycina ovata
flores antehumani purpurei minor
refert satis A. molle at folia non tomentosa angustiora
an modo varietas?

humilis Tournefortia foliis lanceolatis sessilibus, spicis simplicibus recurvis lateralibus

Len. S. V. p. 191.

Pittonia humilis Anethus folio Plum gen. 5. T. 227. fig. 2.

Tournefortia reticulata, S. effusa et hirsuta, foliis ovatis, ramulis rectis validis

Brown. Jam. 169?

Habitat in America calida

croceum A. foliis linearibus oppositi dentatis seplibus caule simplicia
floribus racemosis

Habitat in C. b. sp. C

Caules plures laterales ascendentes, erecti. Solia plurima
radicalia, duum parum in caule, remote dentata, subcar
no sa, glaberrima. Pedunculi superne alterni sesquiped
licari bracte l remoti, bractea lineares - fol femungui
culari. foliola calycis lineana. Corolla magna
eicalarata

ponimum Cl. floribus ei caudatis verticillatis, foliis lanceolatis oppositi
globis caulebus erectis Lour. fl. Cochin. pag. 3 P4.

Habitat in Cochinchina.

Caule herbarum sesqui pedalis, diffusus. Folia subperpetua usitata sesplen
lacinis calycis subulato pilosa. Corolla nitens patens, 5 fida.

non vid.

Japonica ~~*Justicia*~~ foliis ovatis serratis, fructis terminalibus, bracteis setaceis, caule patu
lo S. V. p. 63. 30. Fl. Lap.