

Aprios

25 frutescens - 9. foliis impari pinnatis, caule perenni. Len. L. V

Phaceloides frutescens caroliniana, foliis pinnatis, floribus coeruleis con-
glomeratis Hort. angl. 55: 7. 15.

Habitat in Carolina 5

Rami glabri. Folium plerumque bipinnatum: foliola petiolata
opposita, ovata, acuta ^{nonnihil glabra} tenerrima quam in apicibus, pollicia
in interiora ^{subtus calycis, raris} minor. Pedunculus ex apice ramorum
pubescens superne canescens. pars caulis floris copiosi
imbriati. Calycis lobis villoso-pubescentibus

frutescens 9. foliis impari pinnatis, caule perenni, calycibus fereis

24 apoc. g. foliis impari-pinnatis ovato-lanceolatis: folioli septenis

Lin. l. v

apoc. americana Corn. canad. 2007. 201.

Astragalus perennis speciosus americanus scandens caulis, radice tuberosa

Monf. hist. 2. p. 105. f. 2. v. 9. fig. 1.

Habitat in Virginia 4

Cauli scandens volubilis striatus glaber. folia trijuga: foliis

caulis ~~ovata~~ opposita petiolata, utroque ^{sub} ~~glabra~~ ^{internodiis} ~~extrosum~~ ^{pollidina}

petioli pariter
petioli stipuli

minor, venis subreticulata. Racemi stipulo setosis
Racemi longitudine foliorum, glabri. Flores distantes 2-3 ex
eodem puncto ^{minoribus quam in frutescente} legumina

apoc. g. foliis impari pinnatis ovato lanceolatis septenis, calycibus
glabri