

apocynum Sloan tab 131.
fig. herb 4us.

Apocynum

1. *hypericifolium* A. caule rectiusculo herbaceo, foliis oblongis cordatis glabris, cymis foliobrevioribus
2. *venetum* A. caule rectiusculo herbaceo, foliis lanceolatis margine scabris
3. *cannabinum* A. caule rectiusculo herbaceo, foliis oblongis cymis lateralibus folio longioribus
4. *androsymphoricum* A. caule rectiusculo herbaceo, foliis ovatis, cymis terminalibus oblongis
5. *frutescens* A. caule frutescente, foliis lanceolatis - ovalibus, corollis acinis: faucibus vellosis umbellis racemosis cymis axillaribus
6. *scandens* A. caute fruticoso, ramis subscaudentibus, foliis lanceolatis pedunculo dichotomi
7. *love* A. foliis cordato-ovatis umbellis lateralibus pedunculatis.
8. *triflorum* A. caule solidibili herbaceo, foliis lanceolatis, umbellis axillaribus bi- trifloris
9. *villosum* A. foliis cordatis acutis ramisque vellosis, pedunculatis folio longioribus floribus umbellatis

10. reticulatum A. caule volubili perenni, foliis ovatis venosis.
11. minutum A. caule prostrato, foliis lineariibus hastatis.
12. lineare A. caule volubili herbaceo, foliis lineariibus planis, umbellis axilla-
riis compositis.
13. filiforme A. caule prostrato herbaceo, foliis filiformibus, floribus umbellatis.

barbatum Apocynum

Habitat in India orientali herb frus.

Caulis teres, purpurascens, glaber, ramosus. Sola petiolata, bipollicaria, oblonga,
obtusiuscula, venosa, costa subtus pilosa. Corymbi axillares et terminales, racemosi.

Apocynum

Habitat in Madagascar Composita Lib. Thourie 5

Rami Vertices, glabri. Folia petiolata, ovata, subnervosa, supra nitida. Pedun-
culi axillares, solitarii, terminalis terni. Flores extrorsilobi

Corydalis Apocynum

Habitat in Tava herb. Rich-5
Rami teretes, punctis elevatis subnerviati. Folia petiolata, elliptico lanceolata,
2-3 pollicaria, simpliciter venosa, acuminata, cavia, glaberrima, nitida. Panicula
terminalis. Peduncululi plures: peduncululi ultimi umbellati. Calycis vellophi

cotunifolium Apocynum

Habitat herb. La Martini

Rami glabri, teretes. Folia subcordato-subrotunda, vix pellucida, obtusa, mucronata, basi subrotunda, duo in apice ramulorum, obsolete venosa, glabra. Pediculi terminales, canescentes, terni, apice duplylli, parthales terni. Pedicelli alterni subtriflori. Flores parvi. Velli in axillis nervorum subtus

umbellatum Cl. caule volubili, foliis ovato-acuminatis subtus tomentosis
corymbis terminalibus Aubl. fl. gu. pag. 275. Tab. 100
Habitat in Guana

non red.

africanum Apocyn. caule fruticoso pubescente, foliis ovato oblongis, pedunculatis subtrifloris Lour. fl. Cochinch. pag. 168.

Habitat in arenosis Zanguelano -

et pedalis ramis scandentibus. folia obtusa integerrima crassa glabra parva. flores pallidi. Nestanum coruscule sique subula
4a, glandus sique alterni

alternifolium Apocyn. caule fruticoso scandente, foliis ovatis acuminatis glabris
axillis alternis um bellifera Lour-fl. Cochinch. pag. 168

Habitat prope Cantonem

Caulis longus ramosus foliis petiolato, opposit., plana integerrima.
Flores pallidi inodori. Sepala calycis lanceolata. Cor. campanulata.

Nectarium lobi 10. erecti oblongo tubo corollae infidentis
an hujus generis? quoniam auctor

non vidi

juventas Apocynum caule fruticoso volubili, foliis ovatis pilosis racemis duto
tomi Lour-fl. Coch. pag 167.

Habitat Cochinchina

Caules tenuis pilosis nuber lactiferi. Radix carnosus magna indi
cip: flores minuti lutes virides. Racemi axillari. Nectarium lobi
5que

aiufi A. caule volubili, foliis oblongo ovatis acuminatis Aubl. fl. Gu. pag

274. tab. 107.

Habitat in Guiana

non vidi

Libericum A. caule erecto herbaceo, foliis oblongis umbellis terminalibus len
L.V. p. 250 Jacq. Hort. 3. t. 66.

Habitat in Sibiria &

Hypericifolium A. caule reticulato herbaceo, foliis oblongis cordatis glabris, cymis
foliis brevioribus Hort. Kew. 1. p. 304.

androsomifolium. A caule rectiusculo herbaceo, foliis ovatis utraque glabris
Cymis terminalibus Lin. l. v. p.

Apocynum canadense, foliis androsomifolij majoris Mart. fig. 35. t. 16. fig. 3.
Monf. hist. 3. p. 607. f. 15. t. 3. fig. 16.

Habitat in Virginia, Canada &

Rami patenter folia latiora quam in Cannabino petioli vixit.

Cymae terminales et ex axillis supremis.

varietas foliis ellipticis in herb. Deiford

venetum a caule rectiusculo herbaceo, foliis ovato lanceolatis Lin. S. V

Epula rara e lido venetorum infula Lobel. hist. 201.

Thymalus maritimus, purpurascentibus floribus Bauh. pin. 291.

Habitat in Adriatici maris insulis 4

Caules purpurascentes. Folia brevissimè petiolata ovata oblonga mucronata squamè polliciana glabra. Corymbus ter

Caules glabri rami glabri subsiccantes oppositi. Folia brevissimè petiolata lanceolata glabra polliciana et ultra obtuse mucronata margine ad lendum tuberculis minutis undè scabra. Pedunculus terminalis caum ramulis geminis ulterius excrepantibus. Calycis putvere glauco adspersis

foliis lanceolatis margine

Rabris

~~in 2 filis mibi nota~~

cannabinum A caule recto stipulo herbaceo, foliis oblongis paniculis terminata
libus Lin. t. V.

Apocynum canadense ramosum, flore e viridi albicante, siliqua tenuis
fina Monf. hist. t. 3. p. 607. f. 15. t. 3. fig. 14.

Apocynum canadense maximum, flore minimo herbaceo Plukh. alm
35. t. 13. fig. 1.

Apocynum erectum Virginianum ramosum, caule sububerte, stipulo raro
foliis, siliquis tenuissimis Plukh. alm. 35. t. 260. fig. 4.

Habitat in Canada, Virginia &

cannabinum A. caule recto stipulo herbaceo, foliis oblongis, cymis lateralibus
foliis longioribus Hort. kew. t. 1. p. 303

cauli purpurascens. folia brevissima petiolata basi ovata,
nervata sicut polliciani subtus glauco viridia

frutescens A. Caule erecto frutescente, foliis lanceolato-ovalibus, corollis
acutis; fauce villosis Lin fl. reyl. 119.

Apoecynum floribus fasciculatis fl. reyl. 23. t. 12 p. 1.

Habitat in Seylona,

Rami teres, glabri. Folia petiolata, distantia, bipollicaria
oblonga basi ^{acuta} ~~acuta~~ vel acuta obscure venosa, glaberrima

Pedunculi axillares oppositi, et terminales foliis breviores
natales oppositi pedicellis brevissimis subpedicellatis uti pedun-
culi vili minuti adpressi. Pedicelli filiformes sesqui pollicari
no villi minuti ferrugineo terti.

Siandens A. Caule fruticoso ramis subsistentibus, foliis lanicola
dis cymis axillaribus
Habitat in India Orientali &

Statura ad frutescentem accedit. Glaber. Rami oppositi
filiiformes apice bifidi. Folia opposita petiolata
basi acuta, obtusiuscula, mucrone brevi terminata. glaber
nna arenaria nervosa pollicaria vel parum ultra
Pedunculi axillares duobus ome ramosi alterni, foliis brevior
res: ramuli flexuosi denticulis utraque ad ramificationem
sed lentius villosi. floris minuti calycis rotundati. Petala
oblonga

Cocce Apoc: foliis cordato ovatis umbellis lateralibus pedunculatis

Habitat in Madagascari

Folia pedicelata opposita & habentia subter tenuissime venoso-reticu-
lata. pediculi longitudine vix petiolorum pedicelli usque ad
longioris laciniæ collo lineari

an potius Cynanthi speciei fructificationem hanc satis ex specimine
nescio enim potius

Triflorum Apocynum caule volubili herbaceo, foliis lanceolatis, umbellis axillaribus
bij. trifloris her. Suppl. p. 169. f. N. p. 250
Habitat in C. bono ppe
Folia hujus et alia lanceolata, ut A. lineari ex parte linearia

non vidi

villosum
hirsutum

A. foliis cordatis acutis ramis ^{villoso} ~~hirsutis~~, pedunculis foliis Congronibus
floribus umbellatis

Habitat in monte video Comarson

Rami vertici superne propositi superne. Folia opposita
petiolata pollicaria ^{cordata} superiora minora cordato lun
ceolata utraque villosa subvenosa. Pedunculi laterales
crassitie tamorum foliis triplo longiores. Pedicelli copio
si semunquiculares. Ita inter pedicellos calycis villosi

reticulatum Apocynum caule volubili perenne, foliis ovatis venosis Lin. S. V. p. 250
Aut Endium Rumph. amb. 5. p. 75. t. 40.
Habitat in India Orientali

michi ignota nisi
~~an~~ ~~o~~ Synanthemum reticulatum hinc potest esse qui quantum
ni odor folii simili vel alteri affinis

minutum A caule prostrato, foliis hastatis Len. Suppl. pag. 169 * L.V. p. 250

Habitat ad Cap. b. p. ei

Caulis filiformis prostratus rarius ascendens vix suthamoi, ramosi glabri. Folia opposita vix petiolata fere unguiculata, linearia mucronata inferne utrinque dente laterali, ^{summa} ~~suprema~~ absque dente, glabra. Pedunculi alterni solitarii foliis longior. umbella simplex subsessiflora pedicellis pedunculo brevioribus

Lineare Apocynum caule solubili herbaceo, foliis linearibus planis, umbellis axil-
laribus compositis Lin. Suppl. p. 169 S. V.
Habitat in Cap. bono spec.

non vid.

filiforme Apocynum caule prostrato herbaceo, foliis filiformibus, floribus umbellatis

Lin. Suppl. p. 169. S. V.

Habitat in Cap. b. Jaci

non vidi

Sarmentum e Gova forte scandens no 2
no 1. Dedit Richard

Cl. juventas
alter napolitanum } leucis
africanum