

Aponogeton

1. mono stachyon A. spica simplicis, foliis cordato-ovatis
2. lineare A. spica simplicis, foliis linearibus
3. distachyon A. spica bifida, foliis elliptico-lanceolatis rotantibus; bracteis integris, floribus polyandris
4. angustifolium A. spica bifida, foliis linearilanceolatis erectis, bracteis bipartitis, floribus polyandris

cord. folium Aponogeton folus cordatis 5que nervis, floribus spicati hexandris

*Splithum chinense* Lour fl. Coch. pag 217.

Habitat in paludosis prope Cantonem Sinarum

Caulis erectus tripedalis herbaceus. Rami diffusi sulcati, flaccidi. Folia cordata lanceolata 5 nervis, glabra, parva. Petioli amplectentes. Spica linearis subterminalis. Spatha 1 phylla uniflora. Germen subrotundum 4 cornu Stylis 0. Stigmata 4. Oblonga, reflexa.

non vidi

an Potamogetonis vel Aponogetonis species

Submersum A Solus canaliculatis undulatis spica simplicibus

Habitat in fundo fluminum hominis saepe profundiore & ad co  
orientali Hong

Folia radicalia pro petiolata saepe pedalia pollicem lata  
acuta basi attenuata oblonga quinque nervis transversim  
senis simplicibus confertis undulata. Petiolus rarius longi  
longioris vel brevioris. Scapus erectus foliis altior sursum  
versus crispus confertis simplicibus saepe pennis asper  
nis. Spica pollicari

est authentice Hongi huius refero an potius Aponogon

Tomett Forth

3 Distachyon Apnogeton spica bifida, foliis <sup>elliptico-lanceolatis</sup> ~~linearibus~~ natantibus, bracteis integris  
floribus polyandris Hort. New. II. p. 295.

Apnogeton distachyon spica bipartibili, foliis elliptico-lanceolatis  
Lin. Suppl. p. 215 & S. V. p. 353.

Habitat in cap. bono prope rivulus &

Radix bulbosa. Folio radicalia, pennis sine petiolatis, integerrima levia  
natantia, Potamogetonis natantis. Spica bipartiti in trochum embria  
ta. Flores albi alterni, erecti; Bractea ovata excepti. Flores odore  
fragrantissimo.

2 angustifolium *Apronogeton pica bifida*, foliis linear-lanceolatis erectis, bracteis bipartitis, floribus hexandris Hort. Kew. t. p. 495. \*

Habitat in C. bono pici 2

Differt a precedente quod minor, folia angustiora, utrinque attenuata.

Bractes pallide nigrae. Flores pauci. Bractes albo, basi nigro ad bipartito vel potius bino, lineares, obtusae. Stamina 6, bracteis ter vel quater breviora. styli tres. Hort. Kew. l. c.

Aponozeton

2 Lineare Aponozeton sp. a simplicis, foliis linearibus

Habitat in paludibus Indiae orientalis

~~Similis maxime a palmensis, folia graminea, vel linearia utrinque~~  
~~attenuata, angusta. an modo varietas a. monostachyi~~

Similis A. monostachyi et tantum palmensis vel possum ultra  
folia omnia graminea utrinque attenuata, an modo varietas  
cum specimen Ap. monostach. ex India possideo folio unico ut in  
lineare reliqua vers ut in monostachyo?

1. *monostachyon Cyperogiton spica simplicis, foliis cordato-ovatis* Lin. Suppl. pag.  
214\* . L. V. p. 353

Parva-Kelanga Rheed Mat. II. p. 31. t. 15.

Caumino natans? acaulis, prope monostachyo Lin. Mant. p. 227\*

Habitat in India orientali aquis paludosis frequens inter oryzae  
Radicibus bulbosa. Folia radicalia longissime petiolata, ovato oblonga

basi interdum cordata, pollicana vel ultra, natantia fere  
Potamogetoni natantis. Scapi flaccidi petiolis brevioribus, oblique

Petiolus saepe  
semipedalis

angoni. Spica simplex, sexangularis, spatula adnata tecta. Brac-  
teo collo loco duo infra singulos flosculos, parva, clavata,  
obtusiuscula, carnea, persistentes. Stamina 6. subulata, brac-  
teis longiora. Germena 3. f. 4. oblonga, acuta. Stylus germinibus  
brevior. Stigma obtusiusculum Lin. l. c.