

La Martk
Poryphlofolium descripti sub nomine
marginata fl. herb. La Martk

Arbutus

Confes Duham. nov. 27

1. undec A. caule arboreo, foliis oblongo-lanceolatis, paniculis glabris nudaantibus
2. andrachne A. caule arboreo, foliis ovalibus integerrimis serratisque, paniculis pubescentibus erectis
3. ferruginea A. arborescens, foliis oblongis obtusis glabris integerrimis, racemis terminalibus
4. micronata A. caule fruticoso, foliis ovatis serratis mucronatis pungentibus, pedunculis axillaribus unifloris
5. microphylla A. fruticulosa, foliis ovatis serratis petiolatis mucronatis, floribus lateralibus sessilibus
6. pumila A. caule basi sesepes repente, foliis oblongis integerrimis, pedunculis lateralibus unifloris
7. acadiensis A. caulibus procumbentibus, foliis ovatis subserratis, floribus sparsis baccis polypermis
8. alpina A. caulibus procumbentibus, foliis obovatis venosis basi ciliatis
9. urtica A. caulibus procumbentibus, foliis obovatis integerrimis
10. thymifolia A. caulibus procumbentibus, foliis ovalibus acutis obsolete serratis subtus trigonis, floribus axillaribus octandris

marginatus Aschard

Habitat ad fridum magellanicum Commes- herb Aug/5

Caulis repens: rami hispidi. Folia subpedicelata, magnitudine arbuti pumili
vel parum majora, ovata, acuta, margine parum indurata, avenia, dila-
tata, absque mucrone pungente, extropium serratura una alterave ^{utro} ~~media~~
ne minuto fuscis terminata. Pedunculi axillares, squamis imbricatis, uni-
flori, longitudine foliorum. Calycis foliola ovata. Corolla campanulata,
laciniis ovatis.

^{caule}
^{arbores}
1 unedo *Arbutus* foliis oblongo-lanceolatis, paniculis glabris nudantibus Hort. Kew. 2.
p. 71.

Arbutus Loe. Cam. epit. 160.

Arbutus foliis serratis Bauh. Pin. 460. Mill. Diet. t. 40. f. 12.

Arbutus unedo caule arbores, foliis glabris obtuse serratis, panicula
terminali bacis polyspermis Lin. S. V. p. 407. suppl. p. 230.

Habitat in Europa australi, Hibernia occidentalis, orientis, sylvis &

Rami teretes, purpurascens, pilis purpureis adpressis. ^{tuberculis, insipientibus, scabri} Folia breve petio
lata, coriacea, glaberrima, oblonga vel lanceolata, serrata ex
his basi integerrima acuta. ^{in nollitano} Panicula terminalis, pedunculis, pedi
celloque glabris. pedicelli basi bractea ovata, acuta, parva. Calyx
parvus laciniis ovatis
Bacca polysperma, tuberculis seminum ^{ex}asperata Lin

Arbutus cananensis habes. v. d. Duk. nov. d.

2 Andrachne Arbutus caule arboreo, foliis ovalibus integerrimis serratisque,
paniulis pubescentibus erectis. Hort. Kew. 2. p. 72.

Andrachne Theophrasti Clus. hist. 1. p. 48.

Arbutus folio non serrato Bauh. Pin. 460.

2 Arbutus Andrachne, caule arboreo, foliis ovatis integerrimis serratisque,
baccis polyspermis Lin. l. v. p. 407*

1 Andrachne frutescens, spica erecta foliis ovatis integerrimis et serratis
Ehret Act. Anz. 1767. vol. 57. pag. 14. t. 6.

Habitat in Oriente

Arboreus. Ramiteretes, glabri tenuissimi. Folia petiolata, elliptica
coriacea, integerrima vel obscure remote serrata, ac uti uscula
glabra, subtus parum pallidiora venis subtilissimis reticulata. Panicu-
la terminalis pedunculata pedicellis ~~callosis~~ ^{acutis} pubescenti viscosi
baccis ovatis ^{crassis} ^{perispermis} ad basin pedicellorum. Siliola calycina
ovata, acuta.

3 *Serneginea* *Arbutus arborescens*, foliis oblongis obtusis glabris integerrimis, racemi termi-
nabulis Lin. Suppl. p. 230* S.V. 400.

Habitat in America

Rami angulati, simplices, glabri. Folia alterna, petiolata. Racemi in axillis
foliorum, ramum terminantes, solitarii. Pedicelli raciosi, patentes, in medio
fractis binis, oppositis, ovatis, glabris. Flores remoti, nutantes. Calyx quin-
quedentatus, radentiis fimbriatus. Corolla magis quam in reliquis speciebus
elongata, sive ut in *Andromeda*. Postillum corolla longius. Flores succati
magis reflectes Lin. Fructus bacca nuda.

non vidi

differentia haud optima

4 *microphylla* *Arbutus fructiculosa* foliis ovatis serratis, petiolatis, floribus lateralibus
seffilibus

Habitat in Terra del Fuego.

Fruticulus rigidus ramosus, glaber, mucronatus e caespitiosum. Rami ^{angulati} ~~angulati~~ ^{acutis} ~~acutis~~ ^{fere} ~~fere~~ ^{angulati} ~~angulati~~ e linea decurrente e basi petioli. Folia petiolata
^{menuta, crassa} ~~menuta, crassa~~ ^{venia} ~~venia~~ ^{acuta} ~~acuta~~, serraturis utrinque tribus patentis.
petioli folio triplo brevior erecta. Flores seffiles solitarii axillares. Calicis
no calycis lanceolato

Arbutus microphylla caule fructuoso, foliis ovatis serratis multatis, pedunculatis
axillaribus unifloris

a mucronato differt foliis duplo minoribus absque mucrone, venis non
angulatis serratis, margine non revolutis. pedunculi bracteae pluribus
sicut in prore

7 acadiensis Arbutus caulis procumbentibus, foliis ovatis subserratis, floribus parvis basiis
polypermis L.S. V. p. 400

Vitis idea acadiensis, foliis alaberni Tournef. F. R. H. 608

Habitat in Acadia. 5 Herb. Mus.

Caules tenues, teretes, ramosi, superne pubescentes. Folia versus apex
ramorum, petiolata, alterna, vix pollicaria, supra nitida arenae,
subtus pallidiora, serrata, glabra. Pedunculi axillares, folitarii, fructiferi
penduli.

♂ alpina Arbutus caulis procumbentibus, foliis obovatis ^{venoso} rugosis basi ciliatis.

Myrtillus grandis Gray

Vitis idsa Clus. pag 61.

Vitis idsa foliis oblongis albicantibus Bauh. Pin. 470.

Arbutus alpina caulis procumbentibus, foliis rugosis serratis Lin S.V. pag
400. Fl. Dan t. 73. Lightf. Fl. Scoticæ Tom. 1. p. 215. t. 11.

Habitat in alpebus Norvegiae, Helvetiae, Sibiriae, Angliae &c.

Caulis prostratus rigidus compressus, rigidis ramosis diffusis. Folia basi in
petiolum attenuata, venoso reticulata rugosa, basi ciliata superne
serrata, approximata. Flores racemi ex apice ramulorum pauci
flori. Baccae nigricantes

descriptio in flor. descriptio

9 uva ufsi *Asbitus* caulibus procumbentibus, foliis integerrimis ~~obovatis~~ *obovatis* *Lin.*
L. V. p. 408. Fl. Dan. t. 33.

Uva ufsi Clus. hist. 1. p. 63.

Radix idosa putata et Uva ufsi Bauh. hist. 1. p. 524

Habitat in Europa Septentrionali, Canada &

*Caulis procumbens glaberrimus tota planta. Rami ~~obovatis~~ angulati.
Folia petiolata Vacciniis ~~obovatis~~ idosa, obovata, conatsea, glaberrima
nitida, unguis ulanae distantia. Racemi terminales erecti, Pedicelli
solitarii. Pedicelli longitudine florum glabri ~~capiti squamosi~~
Laciniae calycis ovatae rubrae incarnatae.*

10 *Thymifolia* *Arbutus* caulebus procumbentibus, foliis ovalibus acutis obsolete serratis
subtus strigosis, floribus axillaribus octonariis Hort. kew. 2. p. 72.

Vaccinium hispidulum foliis integerrimis erectis revolutis ovatis, caulebus
repentibus foliiformibus hispidis Lin. Spec. pl. p. 500* S. V. p. 363.

Habitat in America septentrionali paludosis &

Caulis squamis fetaceis imbricatus. Lin. fauces V. oxycedis sed om-
nia majora Lin.