

Antotis

Antohis

Habitat in Cap. 6-speci herb Musf.  
Caulis villosus. Folia sessilia, sempollivaria, lanceolata, dentata, supra in  
tergerrima, subtus. mucronata, supra villosa. Pedunculus terminalis, uniflo  
rus. Calyx imbricatus, tomentosus. Squama internodii apice membranacea  
peripures. Flores flavi. Pappus pilosus.

viculis Ant. 4.

Thunb.

Habitat in Cap. b. spec. herb. Mus.

Folia radicalia, oblonga, in petiolum attenuata, 6 poll. longa, dentato-sub  
pinnata, etiam petioli; obtusa, subtus incana, pubescentia, supra videntur  
serrata, avenia. Calyx imbricatus. Squamae oblongae, extus pubescentes  
ter  
collocatur prope Ant. 4. item

*bellidifolia* Auctori

Habitat in Cap. p. Herb. Royeni

Planta est fruticosa. Folia inferne copiosa, petiolata, lanceolata, inaequaliter denticulata, supra pallida punctata, subnigra, subtus nivesca, trinervi. Caulis superne nudus, uniflorus. Calycis squama ovata, obtusa.

pubescens. Antheri folus lanceolatis pubescentibus remote serratis, pedunculis elongatis  
unifloris, caule herbaceo

Habitat in Cap. b. spec. herb. Royenii

Caulis herbaceus, erectus, simplex, teris, villosus. Solia alternis, frequentis, ut pol-  
licaria, sessile, patens, acute serrata, apice indentata. Pedunculi in apice, 5-  
6, fere perthamoi, adpressi folioli, parvi, remoti, linearibus, pubescentibus. Squa-  
ma calycis oblonga, nitida, toto lanosa, luteo ferruginea. Receptaculum palea-  
cum

imbriata Crotchi

Habitat in Cap. b. spec. herb. Royeni

Caules fruticosi, ramosi. Rami inferne a basi foliorum persistente squarrosi, superne foliis vestiti, villosi cinerei. Folia oblonga, unguiculata et ultra, frequentissime, imbricata, remote acute serrata, serraturis utrinque 3-4, apice obtuso, videntur, oculo armato punctata, villosa, sessilia. Pedunculi terminales, terni, sesqui pollicares, adpressi squamis nonnullis subulatis. Calycis squama oblonga, <sup>ant</sup>structura aut pubescenti, una quam maxime affinis. Receptaculum palcatum

parviflora Aristoteli

Habitat in Cap. b. praeci herb. Proyenii ?

Stem. Rami approximati, elongati, superne ramulosi. Folia 3-4-5-fida. Pedunculati.

Suberale.

habes

*Infuscata* Antoti foliis trifido pinnatisque lineari-bus, pedunculis unifloris  
Antoti *Infuscata* glauculis nigrantibus floribus, foliis pinnatis lineari-bus, apice  
*Infuscata* Burm. prodr. fl. Cap. pag 24 Rozen  
Habitat in Cap. b. pra. herb Rozen 5  
Caulis fruticosus. Ramis teretes, ut tota planta, glabris. Folia angusta, trifida vel  
quinq. pinnata. Pedunculus elongatus. Corolla magna. Squama calycis subrotunda,  
do, margine lato-membranacea. Corolla crocea. Receptaculum paleaceum

Tomentosa Antoti

Habitat in Cap. b. p. i. herb. Thouruni.

In arvo tomentosa. Caulis fruticosus. Folia frequentissima, subtripinnata, linearia. Pedunculus terminalis, elongatus, uniflorus. Calyx imbricatus, in acri foliola interna scarosa prope Ant. antherode.

*Coronopifolia Antotis*

Habitat in Cap. b. spici Leb. la manhu  
velloso. Caulis erectus, herbaceus. Denticulae frequentes

Labes

plantaginea Antotis flosculis radiantibus fistilibus, foliis lanceolato-ovatis nervosis denticulatis  
amplexicaulis L.S.V.

Anemoneperrinos agra, folio plantagineo, florum radius intus aureis extus fuscis.

Boehm. Lugd. 1. p. 100

Habitat in C. Spei

Folia subtus tomentosa hinc

Folia radii alia oblonga, basi in petiolum attenuata, supra obsolete  
triplicinervis, scabra, juniora tomentosa, etate glabra, subtus nuda tomentosa  
suberosa, integerrima, vel subdentata, basi interdum denticata sinuata.  
Scapus spithameus, simplicissimus, uniflorus tomentosus: radius fuscus  
purpureus habet L. Martin

angustifolia Aristotis flosculis radiantibus fertilibus, caulibus repentibus arachnoideis foliis Lyra-  
tis utrinque bidentatis L. l. V. p. 792.

+ 13 Anemopneumia fra, folio serrato rigido, flore intus sulphureo extus puniceo Boeck. Lugdb.  
p. 100

Habitat in Othiopia ad fossa B. b. spec.

Flosculi disci: stant. Periclytulum valde lanatum L.

+ p. Aristotis angustifolia flosculis radiantibus fertilibus, foliis lanceolatis integris den-  
tatis L. Spec. pl. p. 1306. Mant. 479 \*

Caulis ut tota planta, tomentoso-albus, ramosissimus, prostratus, fragilis, radicans. Folia  
petiolata Lyrate dentibus utrinque 2. obovata, obtusiuscula, trinerviis, alba  
utrinque lana arachnoidea, margine vix denticulato. Pedunculi longissimi,  
pubescentes. Corolla radiis purpureis. Variat (in patria) foliis vix lacinandis latiori-  
bus.

paleacea Aristotis flosculis radiantibus sterilibus, paleis flosculos disti equantibus, foliis pen-  
tato linearibus L. S. V. p. 792. Am. Ac. 6. p. 84 \*

Alter foliis integris angustis, flore magno luteo Burm. afr. 176. t. 68. f. 1.

Habitat ad C. b. per

Caulis ramosus. Folia linearia filiformia pennata: primis interstitio longioribus. Pedun-  
culi axillares longi: foliis paleis linearibus simplicissimis. Calyx et Corolla lutea, fauce  
Chrysanthemii. Radius simplex sterilis. Palea longitudine flosculorum, etiam interius  
ad basin Pappi e receptaculo enato pilosa L. Am. 6. 6.

*paradoxa* Curt. totis flo. ulis radiantibus sterilibus, paleis coloratis disco longioribus, foliis bipinnatis  
lineari-bus L. Am. acad. 4. p. 330 \* J. V. p. 792.

Planta. Pluk. phyt. 312. f. 5.

Habitat in Ethiopia.

Talis multa, multifida, linearia laciniis et lacinulis glabra. Rami inferne alterni,  
foliif. Peduncululi terminales nudi, uniflori. Calycis squama interiores membranaceae  
apice. Radius luteus sterilis. Paleae flavae, <sup>coarctatae</sup> truncatae, radio ipso longioribus. Semina linearia  
basi lanata, apice corona pentaphylla, patente, longitudine seminis, figura calyculi  
statiis L. Am. l. c.

acaulis Ant. Bot. pedunculis radicalibus, foliis lyratis L. S. V. p. 792.

*Anemone perennis africana* foliis plantaginis flore sulphureo Comm. var. 35. t. 35.

Habitat ad Cap. b. p. 4

*Pariosa* Ant. flosculis radiantibus sterilibus; paleis flosculos-disci equantibus  
foliis decompositis Hort. kew. 3. p. 274.

Habitat in Cap. b. frei

Foliola omnia calycina obtusa, *Pariosa* ciliolata squarrosa patentia, in  
paleata vero interna tantum *Pariosa* obtusa, externa subpeltulenta  
Ciliolata. H. kew. l. c.

Tenuifolia A. flosculis radiantibus pentis? foliis lanceolatis indivisis glabris her  
mant. 208. 2 l. v. p. 792

Anthemoides a paleis flosculo brevioribus, foliis supra deic oppositis linearibus

Am. ad b. ~~no~~ 85 \* Meny. cap. 324

Chamomelum <sup>2</sup> pumilum, foliis angustis pennatis Burm. afr. 174. t. 63.

Habitat ad Q. b. pui

Dentata a. flo. sculis radiantibus ferebibus, foliis pennatis: pennis pennatifido  
dentatis. Lx. S. V.

Chrysanthemum Othopium, foliis brevibus rigidiusculis, subhirsutum, flore  
minus Pluk. alm. 107. T. 276. fig. 2.

Artototii pelepera Berg. Cap.

Chrysanthemum foliorum pennis brevissimis dentatis Burm afr. 175:

t. 64

Habitat in Cap. b. spei

aspera A. flosculis radiantibus fere liberis, foliis pinnatis pinnatis villosis. Calicinis  
oblongis dentatis Lin. Mant. 400 Pl. V. Mey Cap 315

Anemone permos africana foliis cardui benedicti, florum radiis intus sulphu-  
reus Com. hort. 2. pag. 43.

β. Anemone permos afro, foliis jacobae tenuiter laciniato, flore aurantio  
pulcherrimo Boerh. Lugdb. 1. p. 100. T. 100.  
Habitat in Cap. b. sp.

Vernicefolia A. flosculis radiantibus pentilibus, foliis lineariibus indivisiis nudis  
Lin. Suppl. p. 305. \* S.V. p. 1792  
Habitat in P. b. per.

Penata A. flosculis radiantibus senilibus, foliis lanceolatis indiviso dentato-venatis  
Linn. Suppl. p. 305 + S. V. p. 791  
Habitat in C. b. frei

calendulae a) flosculis radiantibus sterilibus, foliis uninatis subtomentosis

Lin. Spei. pl. pag. 13064

a) A. flosculis radiantibus sterilibus duodecim subintegris 3.

trifidis media inflexa

hypochrom β)

quadripartitis Lin. Mant. 479 Reg. Cap

tristis γ)

Anemone permos africana, taiboeo mantimo foliis, flore sulphureo  
Pom m. rar. 36. 4. 36

tripartitis. erdenoi inflexa

coraifera δ)

quinque partitis. 1.

superba ε.)

Habitat in Cap b. Spei

argentea Curt. flosculis radiantibus fertilibus, foliis lanceolato-linearibus integerrimis  
Tomentosi Hort. Kew. 3. p. 273.  
Habitat in cap. b. p. 1. 8

grandiflora Aub. glomerulis radiatis fertilibus; foliis pennatifidis denticulatis  
arachnoideis trinerviis Hot. New. 3. p. 272.

Habitat in C. b. frei ♂

Rudus maximus - Petala straminea, fultus rubore tinctoria, supra prope basin  
lutescentia, ore nigro purpureo