

Arenaria

1. peplodes A. foliis ovatis acutis carnosis
2. tetraptera A. foliis ovatis carinatis recurvis quadrifariam imbricatis marginatis pungentibus, floribus capitatis
3. ~~agrypta A. foliis caulinis subulatis patentibus flexilibus vatis, capituli imbricatis~~
4. biflora A. foliis obovatis obtusis, caulebus procurrentibus, pedunculis lateralibus bifloris
5. lateriflora A. caule erecto, foliis ovatis obtusis, pedunculis lateralibus bifloris
6. trinervis A. foliis ovatis acutis petiolatis nervosis
7. ciliata A. foliis lanceolatis-oblongis nervosis ciliatis acutis
8. multicaulis A. foliis ovatis enerviis sessilibus acutis, corollis calyce majoribus
9. norvegica A. foliis oblongis enerviis obtusis nudis, caulebus basi repentibus, pedunculis subulatis
10. balearica A. foliis ovatis lucidis subcarnosis, caule repente, pedunculis unifloris
11. racemosa A. foliis ovatis utraque acutis, floribus racemosis
12. serpyllifolia A. foliis subovatis acutis sessilibus, corollis calyce brevioribus
13. montana A. foliis linearis-lanceolatis margine scabris, caulebus sterilibus procurrentibus, sessilibus erectis, pedunculis fructiferis reflexis

- 111 triflora A. foliis lanceolatis-subulatis ciliatis subtus velosis, ramis subtrifloris, petala
 austraco
 15. grandiflora A. foliis lanceolatis-subulatis fructis, subtus marginatis glabris ciliatis, ramis
 pubescentibus, pedunculis vel trifloris.
16. rubra A. foliis filiformibus, stipulis membranaceis supernantibus, caulibus glabris
 17. media A. foliis linearibus carnosis, stipulis membranaceis, caulibus pubescentibus
 18. procumbens A. foliis linearibus lanceolatis, caulibus prostratis velosis, petalis calyce
 brevioribus
 19. basanica A. foliis semicylindricis carnosis obtusis, petalis lanceolatis, pedunculis termina
 libus subnatis
 20. gypsophiloides A. foliis linearibus: radicalibus fetacis, panicula subpubescente,
 petalis lanceolatis, petalis lanceolatis
 21. cucubaloides A. foliis linearibus margine scabri, panicula dichotoma pubesce
 te, petalis obovatis
 22. nanthoides A. foliis linearibus margine scabri, floribus capitatis, bracteis ventricosi
 pedunculis superantibus
 23. saxatilis A. foliis subulatis; floralibus membranaceis, caulibus simplicibus, folioli
 pedunculis oppositis subunifloris, folioli calycinis obtusis
 24. fructa A. foliis linearibus subciliatis, caule erecto fructo, pedunculis dichotomo
 ramosis, folioli calycinis obtusis
 25. serena A. foliis subulatis, caulibus planis velatis, calycibus acuminatis fructis
 26. hirsuta A. foliis subulatis subtus hispida

27. *Quimperna* A. foliis subulatis spinosi, caulebus erectis, calycibus striatis, capsulis oblongis
28. *tenuifolia* A. foliis subulatis, caule paniculato, capsulis erectis, petalis calycis brevioribus lanceolatis
29. *lanifolia* A. foliis fetaceis, caule superne nudiusculo, calycibus subulatis, foliis linearibus calycibusque lanceolatis acutis glabriusculis, caule superne nudiusculo
30. *felifolia* A. foliis fetaceis, pedunculatis terminalibus simplicibus unifloris, caulebus
31. *recurva* A. foliis subulatis secundis recurvis, calycibus lanceolatis striatis glabris
32. *strigata* A. foliis fetaceis superioribus ramorum expressis, folioli calycinis oblongis obtusis striatis pubescentibus
33. *foeniculata* A. foliis subulatis, caule ramisque erectis striatis, floribus fasciculatis petalis brevioribus, capsulisque calycis brevioribus
34. *gramini* folioli foliis linear-lanceolatis attenuatis rigidis striatis villosis, caulebus caespitoso erectis trifloris, petalis calycis majoribus
35. *lanicolata* A. foliis lanceolatis calycibusque glabris striatis, pedunculis subsolitariis, caulibus caespitoso
37. *obtusifolia* A. foliis linearibus obtusis confertis, caule ramoso lato procumbente calycibus longioribus glabris
38. *austriaca* A. foliis linearibus acutis, pedunculis subternis, calycibus villosis, caulebus prostratis basi perennantibus

39. glaberrima A. foliis linearibus obtusis glabris, caulis prostratis, pedunculis terminalibus
 solitariis unifloris
 40. laxa A. foliis linearibus obtusis sculiglaris, caule laxo
 41. liniflora A. caulis erectis inferne ramosis suffruticosis, foliis subulatis floribus
 geminis

~~Lythrum~~

Polygo. no. de.

glabra major et minor

fenestrata

Squarrosa

lanes, cons.

setacea

lanifolia

versicolor

e Sylvis panicis

Differentia vix ab inflorescentia desumenda cum saepe in eadem specie pedunculi
 vel solitarii, vel gemini vel terni, plerumque simpliciter vel uniflori aut bidui
 ramosi ~~triflori~~ vel dichotomi si pedunculi gemini vel terni adsumat, intermedii
 aphyllis crispis et parvis brevioribus diphylly parum longioribus et tenuioribus

A. capillacea All. tab. P. 67. 2.

Caroliniana Walth.

polygonoides Wulf. Coll. Haenke

calycina Poiret.

Dichotoma Koenig fl. Jap.

Hallen hist. 877
 aristodes Port.

~~Tetragonium C. incanum tomentosum, foliis basi lanceolatis caulibus basi tetragonis~~

~~Habitat in Regno Neapolitano~~

~~similis omnino tomentosa, ut facile eandem plantam credam nisi
capsula obtusa, quod in *trai* Oblenza calyce longior anse quoque
in tomentosa sunt.~~

~~Ornithoides Lychnis reptante radice Colum. Phyt. app. no 3~~

~~115 tab 31~~

tetraquetra Arenaria

polygonoidei foliis linearibus caulis prostratis, pedunculis bifloris
terminalibus erectis, calycibus fimbriatis. Wulfen
Coll. Gaiqu. 1. p. 241. Tab. 15

non vidi

pelosa Arenaria

Habitat

Herb. Desfont.

Caules adscendentes, ramosi

Arenaria

Alpne maritima nummularisfolia Tournef. Inst. r. h.

Habitat herb. mar.

Facies ^{oceanica} ~~magellanica~~ Tetraphyllo. Caulis plures, digitales, diffusi, ramosi, sili per mesoglabri

Folia petiolata, subrotunda, opposita, vel 4^{na} duo minora. Pedunculi. Terminales dichotomi

Arenaria

alpina orientalis fruticosa, ~~complanata~~ foliis Tournef. Cor.

Caules ascendentes, basi ramosi, rami erecti, rigidi, simpliciterispmi, glabri, teretes.
Folia juniperina, patentia. Peduncululi dichotomi

Arenaria

Habitat in Syria herb. Desfont.
Planta pollicaris, ramosa

hispida Arenaria

Habitat herb. Desfont

Caulis ramosi, spithamei

Arenaria

Alpne orientalis canyophylli folio, flore magna frasp. Tournef. Cor. 17.

Habitat in oriente heb. mus.

Similis arenaria ex horto Parf. 1799. tota glabra, superne non vestita

paniculata Arenaria

Habitat in alpebus altis herb. Musf.

Caules filiformes, erecti, digitales, teretes, ope cartis villosi punctati, uti folia utrinque. Folia sessilia, vix unguiculata, oblonga, margine villosi-subciliata, obtusa, arena, obscure trinervi. Pedunculi ex apice et axillis, solitarii uniflori vel bi flori, alter medio bracteis binis minutis. Calyx glaber, foliola oblonga, obtusa, Petala integra, oblonga, calyce duplo longiora.

polygona folia Aenani

Lycini græcia putula umbellifera polygonifolia, flore albo annulo
atro purpurascente Tournef. Cor.

Habitat in Græcia herb. Desfont.

Caulis basi ramosus, digitales: rami foliiformes simpliciter, uti folia villosi
Flores terminales 3 ~~lobis~~

Strata a foliis linearibus erectis appressis, calycibus oblongis striatis.

Lin. Am. acad. 4. p. 3154 Ill. fl. Delph. tab. 47

Auricula maris pulchro flore, folio tenuissimo Bauh. hist. 3. p.

alpine saxatilis 360.

lanceifolio major
et minor flore
Toursi
et bosin vesper
et subserulata.

Platibata in alpebus Cluistro et Valli angusta y

Caulis filiformis glaber teres rami superius conferti alterni ad
centem villosi. Folia frequentia simplicia basi erecta,
Tolia setacea ad centem striata et villosissima unguiculata
inferiora patentia et subsiccunda parva repleta a superiora
ramorum ad presfa articulis longiora et superiora breviora
Pedunculi ad in apice terni laterales longioris fope
iterum divisi peduncululus dichotomis brevior omnes uti
calycis pubescens. Calycis foliola striata obtusa linearia
petala calycis longiora

mea planta cum
Wauhni convenit
optime nec non cum
descript len

Hellana aculeata Scop. fl. carth. tab. 17. Da praemuni ab ipso Scopolio donatum male
cytus et grandifloram ab alle. amandatur
foliis setaceis superiora ramorum ad presfa, calycis foliolis caly
icis oblongis obtusis striatis villosis pubescentibus
a lanceifolia differt foliis longioribus ramis longioribus simplicibus
floribus duplo maioribus, pedunculis brevioribus sette ~~sette~~

of alpine foliis linearibus angus & simplicibus, calycibus tubulosis villosis
Hall. hist. n. Obv. ob synonymum. Bauh. convenit quoque foliis
allioni figura p. tab. 26. fig. 4 potius ad laticifoliam tam cum

† auctor in
rupens ad
Aren. lincifoliam
amarissat

huc quam ad alteram Bauh. syn. ab allonio relata fuit et ipse
Arenaria striata Vill. fl. Delph. tab. 47. quamvis figura male
plantam nostram satis bene sistit Arenaria vero Chelonioides ab
Vill. huc relata pessima et diffusi minusque striata Lin. representat.
figura pessima nec digna ut citetur.

secundum herb. Guss. Synon. Bauh. a Lin. ad lincifoliam huc potius spectat,
ubi synonymum striata ad lincifoliam
plantae herb. Vaillant. lincifolia gaudet calycibus striatis pubescentibus foliis
oblongis obtusis.

Lonicifolia A. foliis setaceis, caule superne nudiusculo, calycibus puberulis
Linn. S.V. *Saiqu fl. austr.* 3. t. 272.

Alpine ~~fast~~ alpina, juncea folio Bauh. prod. 110. p. 251.

Alpine saxatilis, laniata folio, minor et minore flore T. Magn
~~Hot magn.~~ 11. t. 2.

Habitat in montosis Helvetiae, Geneva, Pansponum, monte

Planta ~~degr.~~ ^{caulis} Cui 4

Caules feliformes dichotome ramosi. rami plures lani flexi
glabri. Folia approxinata ex apice ramorum fasciculata semper
cularia vel parum ultra glabra striata inferia arida puber
sistentia superne in ramis floriferis remotiora. Pedunculi tenues
solitarii vel terni. Calycis foliola acuta lanceolata striat
et glabriusculi

Arenaria lanifolia nostra planta cum iore *que quini* et *Magnolioptima*
Vall. fl. Deget. tab. convexit. Synon: *magnolia ad saxatilem* refert *Gouan* in *flora*
47. *precipua alluvionis* *montis leunsi* *vet. jure* *ab. A. saxat.* *sibirica* certe diversa
arenaria lanifolia Scop. fl. Carn. tab. 10.

foliis calycibus que fl. acut. striatis acutis
glabriusculi, petalis oblongis calyce longioribus
linearibus
magn. hort. t. 4

grandiflora a foliis subulatis planis striatis: radicalibus confertis caulibus
unifloris Lin. S. V. p. 425 x

Alpine uniflora et grandiflora, foliis acuminatis, petalis in
Seynii All. pedem. 49. 8. 10. fig 1.

Habitat in alpebus Valdensium, Genesii in Pyrenois 7

Caulis filiformis inferne ^{subulato} ~~subulato~~ ^{ramosus diffusus} ~~in ramis compacta~~. Rami ^{inter} ~~inter~~ ^{pubescenti} ~~pubescenti~~ ^{folia lanceolata} ~~folia lanceolata~~ ^{subulata} ~~subulata~~ ^{ternis} ~~ternis~~ ^{geminis} ~~geminis~~ ^{calicibus} ~~calicibus~~ ^{ovatis} ~~ovatis~~ ^{pubescentibus} ~~pubescentibus ^{sub} ~~sub ^{trifloris} ~~trifloris~~ ^{pedicelli} ~~pedicelli ^{lat} ~~lat ^{longitudine} ~~longitudine ^{pedunculi} ~~pedunculi ^{cum} ~~cum ^{ped} ~~ped ^{uniculo} ~~uniculo ^{ramis} ~~ramis ^{conspicuis} ~~conspicuis~~ ^{bis} ~~bis ^{pollinatis} ~~pollinatis ^{vel} ~~vel ^{paucis} ~~paucis ^{ultra} ~~ultra ^{pubescentibus} ~~pubescentibus~~ ^{axillaribus} ~~axillaribus ^{medio} ~~medio ^{foliis} ~~foliis~~ ^{geminis} ~~geminis~~ ^{subulatis} ~~subulatis. Calycis ^{foliola} ~~foliola ^{ovata} ~~ovata ^{acuta} ~~acuta ^{striata} ~~striata ^{pubescentibus} ~~pubescentibus~~ ^{capsula} ~~capsula~~ ^{ovata} ~~ovata ^{longitudine} ~~longitudine ^{calycis} ~~calycis~~ ^{superioris} ~~superioris~~ ^{foliorum} ~~foliorum ⁱⁿ ~~in ^{axillis} ~~axillis~~

~~lanceolata~~ ^{striata} ~~subulata~~ ^{glabris} ~~subulata~~ ^{subulata} ~~marginatis~~ ^{marginatis}, ramis ^{pubescentibus} ~~pubescentibus~~ ^{pedunculis} ~~pedunculis~~ ^{sub} ~~sub ^{trifloris} ~~trifloris~~ ^{calycibus} ~~calycibus~~ ^{pubescentibus} ~~pubescentibus~~ ^{enerviis} ~~enerviis~~~~

Bellana aculeata Scopoli non huc pertinet
arenaria peninsularis Willd. sic da Lomita

Juniperina. *Arenaria foliis subulatis spinosis, caulebus erectis, calycibus striatis, capsulis ob-*
ovatis Lin-Mém. 72. * L.V. p. 724 Smith. pl. ined. 2. pag. 35 tab 39

Arenaria foliis linearibus erectis subulatis striatis, foliis ^{longis} hastigatis inaequaliter pedunculatis
~~calycibus pinnatis 405 t. 15 fig. 1.~~

Habitat in galloprovincia ~~forte~~ in Sibiria 24

Lac. et Cl. feracilis. Caules semipedales, striati, teres. Folia subulata, rigida, fructu
mucronata spinosa. Calyces oblongi, acuti, quinque nervii. Petala lanceolata,
alba. Capsula oblonga, calyce paulo longior. Panicula dichotoma lin. l. c.

Caules plerumque erecti semipedales teretes pallidi levissime pube
scentes geniculis nodosis, superne nudiusculi. Collea pa
tentia basi connata subulata ternaria fere triquetra, mucro
nato-purpurea lenissime pubescentia: radicalia brevissima obtusa,
mutua cauli adpressiva. Panicula terminalis dichotoma
bractea ovata ^{canaliculata} in nervio margine piano undulata.

~~Folia longitudine internodiorum fasciculati foliorum in a. nullis~~
Calyx oblongus basi obtusus leviss. foliola ovato-lanceolata
tri-vel squenervia. Petala obovato lanceolata calyce us
duplo longiora Smith

michi haud facta nota

non vidi

austriaca A. caulis suffruticosus prostratus, inde herbaceus erectus,
foliis subulatis, floribus geminis, petalis emarginatis Lin. l. V. p. 425.

fl. austr. 3. t. 270

Alpine caule glabro dichotomo foliis linearibus acutis Hall herb
no. 864

Habitat Arenana austriaca All. fl. Ped. no 1708. tab. 64 fig. 2.

Habitat in alpebus helveticis et ~~lanceolis~~ Valdensibus

Caules plures primum decumbentes dein erecti filiformes. Caevis, ad ten
tam pilis raris adspersi. Calici superiore dichotomi. Folia remotis

internodiis breviora lvs unguiculata ^{opae lvs} acuta. Sed unguiculi termina
les gemini vel terni interdum solitarii uniflori intermedium brevior

unifloro Cephallus laterales b. pollicares medio d. phyllis. Calycis folio
la lanceolata acuta striata, pubescentia

~~an triflora ad
austriaca d. v. p.~~

Arenana triflora Vill. fl. Delph. tab. 47. huc pertinet videtur
habitus laxior quam trifloro

caulis prostratus basi perennans foliis linearibus acutis

pedunculis puberulis calycibus villosis trineris

a Gronovio plant. Arenanum sub nomine trifloro ~~trifloro~~
nunc pertinet videtur ad Ar. trifloro, ad. graminifolia
a Villarsio amandatur vix vero jure

serna A. foliis subulatis, caulebus paniculatis calycibus acuminatis
Sinati her. Mant. 72. P.V. p. 424. Gaigu. fl. austr. 5. T. 404
Alpine glabra tenuissimis foliis, floribus albis Herm. parad. 12.

8.12.
Alpine pusilla, pulchre floe tenuissimo Raj. hist. 1033

~~Habitat in~~
~~Arenaria~~ foliis lineari-bus erectis subtus striatis, floribus
sartigatis inaequaliter pedunculatis Ger. prov. 405. T. 15. p. 1.

Habitat in Alpibus Europae australis &
affinis videtur Caricifolia et tenuifolia

~~Caulis basi ramosus foliis filiformes glabri. Folia setacea~~
~~petala oblonga~~
~~caulebus vix palmantibus pilis raris dispersis. Pedunculi~~
~~pelosi. Calyces acuti her~~

~~Caulis basi prostratus ramosus. Folia glabra unguiculata inferiora~~
~~in internodiis cum longitudine inferne conspicua magis congesta~~
Stellaria rupestris et Sartorii ~~caulis filiformis~~ Scop: vix differunt fide

mediorum ab app. communicatis h. v. 1
nonne synonymum Gerardi huius ~~partinet quae ad Sartorium~~

proxime herbarii dubito num huius vel ad juniperinam
et folia in mea rigida ~~flexilia deoque forte potius serna~~ caulis vero
glaber

Saxatilis A. foliis subulatis, caulibus paniculatis, calycis folioli ovatis
obtusis lin. s. v. pag. Gmel. fib. 60. 4. Tab. 63.

~~*Anthylli Lychnidis anam Barreni* 500~~

Habitat in Germania, Helvetia, Gallia, Sibira &
Caulis simplicis semis pedalis erectus glaber articulatus
articuli bipollicares. folia ^{l. 1. typollicana} glabra articuli longiora
pedunculi superne oppositi subuni flori foliis membranaceis
ad basin calycibus latius

caulibus simplicibus, pedunculis oppositis
subuni flori foliis floralibus membranaceis foliolis
calycinis ^{autem} ovatis obtusis
a saxatilis Europa austriaci omnino diversa quo forte nil nisi
serena hennedi

baranica A. foliis semicyliandriis carnosis obtusis, petalis cuneolatis,
pedunculis terminalibus subbinatis Lin. Am acad. 4. p. 315. 7

Saxifraga baranica Raj. hist. 1033.

Alpine alpina, foliis verticibus obtusis, flore albo Segu. Ver. 1. p.

419.

Habitat in Bavaria Baldo 4

Caulis r. dichotome ramosus. Teret articulatus glaber. folia unguiculata
glabra, internodiis longiora. Pedunculi et apice ramulorum
triflori. Flores pedicellati: pedicelli pedunculo longioribus
unguiculatis unifloris intermediis, ramis crassior. Catesales
medio folio duabus parvis

media A. foliis lineariibus carnosis, stipulis membranaceis, caulis pubescentibus
Liber. Linn. p. 424 & Spec. pl. pag. 6064

Spergula annua, semine foliaceo medio circulo membranaceo albo
cincto L. N. C. cent. 5. p. 275. t. 4. Bell. gusf. 46

Habitat in Germania, Gallia &

Simillima villosa sed minus ramosa, caulis magis ascendens
tota pubescenti-viscosa. folia subtus convexa. Flores albi petalis calyce
vix majoribus. Semina margine membranaceo cincta

nibra A foliis filiformibus, ^{glabris} stipulis membranaceis vaginantibus

^{caulis et glabris}

L.V. p. 424 X

Campestris a Alpne spergula ^{Loefl.} minor, f. spergula minor, sulconules flore
Bauh. prod. 119. pin. 257.

Polygonum foliis gramineis, spergula capitulis Loefl. pin. 203. 163.

mannab. fl. Sa. V. 740

Alpne spergula facie media Bauh. pin. 251

Habita a in Europa arenosis collibus, β in littoribus mari
nis. O. basi ramosi

Caulis ^{pluribus} filiformes glabri articulati ^{diffusi} ^{simpliciter} ^{rami}
et ^{pluribus} ^{rami} ^{digitales} ascendente. Sola semina ^{quadrilobata} inter
nodiis longiora. Stipulae hyalinae, ovatae, acuminatae, foliiculi
foliorum ex axillis, pedunculi ^{terminales} uniflori, solitarii
vel terni. Calyx pubescentis ^{foliis lanceolatis} β . major ^{prostrata} apice
dichotoma floris terminales et a dichotomia, folus ^{crispi}

Dianthoides A. foliis linearibus margine scabri, floribus capitatis, bracteis ven-
tricosis pedunculis superantibus Smith. in pl. ined. 1. p. 16. tab. 16.
alpine orientalis, caryophylli folio, flore magno in capitulum congesto
Tournef. corol. 177.

Habitat in armeniâ. 2

Caules numerosi, erecti, pedales, denses, glabri, articulati, articulis
6-7. Folia opposita, basi connata, amplexicaulia, line-
ari, acuta, glabra, margine serrulato-scabra, articulis longiora,
summa bracteis asperulata, breviora. Flores in picea vel capitu-
lo denso terminali petiolis brevibus filiformibus, bracteis ovali-
tatis monaci. Bracteis inferioribus maxima membranacea
carinata mucronato-ventricoso calycis superantis; supe-
rioribus ~~latioribus~~ tenuioribus. calycis foliola ovata, obtu-
sa membranacea glabra. Petala alba obovata, calyce
trifido longiora. Antherae fere in flore foemineo uti germe
in masculo Smith

non vidi

Dianthoides A.

incubaloides A. foliis lineamentis margine scabri, panicula dichotoma
pubescente, petalis obovatis Smith. pl. ined. 1. p. 17. & 17.
alpine orientalis, campophylli folio, viscosa, flore magno albo
Tournef. Cor. 17.

Habitat in Armenia &

Caulis plures, erecti, pedales, tenues, glabri. Folia opposita, basi
connata, amplexicaulia linearia, acuta, glabra, supina
in breviora. Panicula terminalis dichotoma, patula, pube-
scens, viscosa. Flores magnitudine lini usque summi. Bractea
acuta margine scabra, pedunculis quadruplo brevior. Caly-
cis foliola ovata, canaliculata acuta, pubescentia viscosa,
margine scabra, Petalala obovata, venis subpellucida
zonata.

— calyce longioribus

affinis *petalis lancicollata*
non vidi *campophylloide* pro differt *petalis lancicollata*

Sapindulata Ruellia, decumbens, foliis lanceolatis petiolatis dentatis
oppositis: alternis minoribus *Sapindulata*. Retr. obf. 29
n. 90 p. 20.

an Rump. 6-8-13-fig. 3. v. H.

Arctostaphylos
rigida A.

Loasi

foliis lineari-bus pubescentibus, caule erecto fructo, pedunculis trichotomis
ramosis calycibus obtusis

Habitat in oriente Asiae et in Hispania

Caulis perennans teretis ad lentem pubescentem basi ramosis, spithameis
Solia fere pollicaria internodiis duplo breviora. flores parvi
calycibus obtusis

Gypsophylodes Aren-folius linearibus: radicalibus petalis, panicula subpubescente, petalis
lanceolatis Mont. 71 + L. S. V. p. 424

Alpina orientalis, Caryophylli folio, flore parvo albo. Tournef. cool. 17.

Habitat in Oriente & herb. mus.

Natura A. saxatilis. Caulis erectus, semi-pedalis, teris, articulis 7. s. 8. Folia radicalia
copiosa, tenuissima. Caulina majora, linearia, articulis longiora. Panicula
terminalis, brachiata, dichotoma, subfastigiata, pedicellis ultimis subullopt.
Calyx cratus, denticulatus, mucronatus. Petala lanceolata, alba, calyce
triplo longiora. Len. M. l. c.

Caulis plures simpliciter, superne viscosi. Radices perenni

~~non radi~~ sed & fus.

Semicyclendria A. foliis semicyclendriis ^{imbriatis} ~~inferna~~ versus bases ciliatis
Stellaria ciliata foliis imbriatis semicycladriis margine infra
medium ciliato Scop. carn. tab. 17

non vedi

obtus
flaccida

A. foliis linearibus obtusis glabris, caulibus prostratis, pedunculis terminalibus ^{sub} solitariis unifloris

Alpine foliis linearibus obtusis, calycibus viscidis Hall. herb. no 263.

Habitat in alpinis Helvetiis

Caulis tenerior et debilior quam in omnibus reliquis feliformis inferne apylli, glabri palmatis. ^{procumbentes} folia semper unguiculata confertiora vel remotiora saepe internodiis longiora crassiuscula glabra. pedunculi terminalis brevis medio foliis geminis. Calyx glaber striatus folioli ovatis glabris

Arenaria obtusa All. fl. pedemontana

obtus allionii et flaccida Halleri non gramm differunt an eju
dem

laxa A. foliis lineariibus obtusiusculis glabris, caule laxo.

Habitat in Libiria

Caules filiformes glabri, prostrati, subtile sive striati, decumbentes, flacidi.

Di. Folia inferiora bipollicaria flaccida pedunculata terminales
bis vel ter dichotomi. Folia calycis canaliculata. Petala alba
calyce longiora

Ciniflora A. caulis erectis inferne ramosis suffruticosis, foliis subulatis
foliis geminis Lin. Suppl. p. 241 S. V. p. 425 & Gaeyh. coll.
2. p. 107. Tab. 3. fig. 3. fl. Austr. S. V. 425.

Habitat in Europa australi

Caules breves distorti, perennantes. Rami annui simpliciter, erecti
Folia subulata, acuta laevia. pedunculi terminales, saepius 2. uno
post alterum. Calyx foliis lanceolatis. striae 2. petala obovata alba
ab ^a grandiflora foliis non planis calycis foliis non multistratis
Lin

hispida A. foliis subulatis. ^{ta} subtus hispida. Cen Spec: pl. p. 60 D4

Habitat m. pelii in monte Calicani

Caulis basi ramosus. lignosus superne dichotomo paniculatus ^{rami} v. r. i.
Duficulus. Text ^{per} pili canobus subhispida ~~et~~ ^{et} ~~in~~ ⁱⁿ palma et ultra
Textis. folia semurquidulana subcanaliculata inferiora panum
reflexa, superiora remotiora rigidiuscula uti reliqua parte
planta pilis subhispida. pedunculi primum dichotomi dein
alterni flores parvi calycis foliola lanceolata

~~Stylis~~

Caulis ramosus pythomai

inferioribus
in. rigidiusculis calycibus ^{calycibus} ~~calycibus~~ ^{caulis} ~~caulis~~ hispida, calycibus lobatis ho

gramineifolia A. foliis lanceolatis ^{nyctis} attenuatis, caulis striatis villosis, caulebus cespiti
topis ^{erectis} striatis trifloris calycibus lanceolatis attenuatis petalis calycis ~~non~~
Habitat in ^{montibus} ~~alpi~~ striato acuto majoribus
Arenaria gramineifolia foliis lanceolatis rigidis hispidis: caule
erecto trifloro Ard. spec. 2. pag. 25. Tab 10.

Habitat in alpebus Italiae 4

Radix superne curvis, Caules plures cespitosi inferne recti ^{basi} ~~separati~~
foliorum proteritis anni, imbricati, super cordata inferne aggre-
gata sesquipedaliana subtus striata, duo vel triumpanum
in caule erecti remoti, breves, ceteri palmari villosi
flores terminales terni interdum saepe. Calyx floris major
quam in congeneribus calyx acutifloris numerosis villosis.

recurva A. foliis subulatis, facundis recurvis, calycibus lanceolatis, fructis glabris
alpine foliis subulatis recurvis, radicalibus linearibus congestis, caulinis lan-
ceolatis Hall. hist. n. 868.

Arenaria recurva foliis subulatis recurvis, radicalibus lan- foliis radicali-
bus congestis recurvis subulatis, caule simpliciter subtrifloro. All. fl. Ped.
n. 1773. tab. 99. fig. 3.

Habitat in Alpibus Saldenarum ♂

Caulis asperifolius digitalis. folia radicalia congesta, caulina appressi-
mata, subulata ^{fructu} convexa supra planiuscula glabra femurquiculata
frequentia superne pauciora. Peduncululi terminales solitarii gemini
vel terni uniflori laterales difphylli. calyci foliola acuta. corolla
calyce parum longior

Arenaria Caricifolia Villars fl. Delph. tab. 47

recurva Wulfen Coll. Faerq. 1. p. 244. tab. 76. fig. 1. an eadem cum recurva

caroliniana A. foliis subulatis imbricatis, caule paniculato, pedunculis
trifloris Walt. fl. Carol. pag. 141
Habitat in Carolina

non vidi

capillacea foliis setosis nervis glabris, floribus erectis, petalis calycis majoribus Walt. in All. fl. ped. tab. 16 fig. 2

non vid.

tenuifolia A. foliis subulatis caule paniculato, capsulis erectis, petalis
calycis brevioribus lanceolatis Lin. l. V. p. 424 *

Alpino tenuifolia Bauh. hist. 3. p. 364. Vaell. bot. 7. t. 3. fig. 1. Segu.
Ser. 410. t. 6. fig. 2.

Habitat in Helvetia, Gallia, Anglia, Italia &

Caulis filiformis glaber ^{se} dichotome ramosus ^{sepe} digitalis inter
dum palmari et ultra paniculatus. purpurascens glaber
lavis ^{se} pedunculis foliis unguiculatis internodiis brevio
ra subtus serrata glabra. Pedunculis capillaris. femurqui

cularis terminalis et in dichotomis calycibus ^{foliis} ^{valde}
^{interdum pubescentibus} ^{attenuatis} ^{sub} ^{stipulis} ^{duobus} ^{crassis} ^{petalis} ^{dioridicis} ^{longioribus}
^{trimeris} ^{maxime} ^{membranaceis} ^{interdum} ^{glabris}
bus. flores sepe pentandri capsula calycis dimidio longior

calycis
capsulis longioribus

2122. Gilifolia Arenaria ^{Arenaria} caulebus suffruticosis autotomis, foliis fetaceis, pedunculis terminalibus
simplicibus unifloris. Tab. XII.

Litr. I.

Arenaria Gilifolia, foliis gilefor mibus libenis Dorff. desir. pag. 211.

P. 33.

Caules suffruticosi, debiles, teretes, glabri.

Folia fetacea, in ramis ^{li}inferne congesta, patentia, glabra,

Pedunculi ^{tres} ex apice ramulorum, simplicissimi, in medio foliolorum binis, oppositis, sub

calycis ^{latis} foliola lanicolato acuminata, glabra, hirsuta.

fasciculata A. foliis subulatis, caule ^{ramosque} erecto ^{et} striato, floribus fasciculatis, petala
liberissimis Lin. S. V. pag. 424 + Jacq. fl. austr. V. 2. t. 102.

Habitat Montpellier. C

caulis palmaris pubescens. ^{ramosa} folia petalis subulata erecta basi
submembranaceo connata. flores fasciculati dichotome pedicellis
brevibus. Calycis foliola subulata erecta striata subulata
longa petala minutissima, capsula calycis brevior

calycibus ^{et} foliis subulatis
^{retalis} capsulisque calycis brevioribus.

planta a. J. Bellardi misa sub nomine C. dubia vix nisi
Stellaria ^{hujus varietas} rubra Scopoli fl. carn. tab. 17. hinc pertinere ~~id est~~
N. Montpel.

Schizofolia *Arenaria*

Habitat in Hungaria Nitarebel

^{subpedales}
Caules plures, erecti, ^{eximii, uti tota planta} superne in pedunculatos divisi, teretes, glaberrimi
glabri, ad geniculos purpureo-decantes. Folia angustis, quinque-⁶folli-
cariis, versus sensim minima remota, erecta, laeva, ^{super} canaliculata
de gustu coniecta, minima striata ^{non} ^{in margine} ^{est} ⁱⁿ ^{marginem}
Pedunculi more generis divisi. Calycis foliola ovata, striata, dorso viscidia
larina ultra foliolum in mucronem excurrenti margine albida. Petala obli-
quo subuneata raris emarginata

villosa Arenaria

arenaria villosa foliis lineari lanceolatis subultratis, una cum caulibus
pedunculisque calycibusque villosis; petalis calycis longioribus Wulf
in coll. Jacq. 4. p. 319.

Habitat in Carniolis alpinis 4

Caulis plures filiformes demum decumbentes subviscid.: folia subtus
conversiuscula. Pedunculi longi viscid.: fructus maturi reflexi
Corolla rosea. Capsula longitudine calycis Wulf.

Arenaria

Alpine caryophylli folio flore magno in capitulo congestum

Habitat herb. Mus.

Caules pedales, erecti, teretes, glabri, simplicissimi. ^{6-7 nodi} Folia 3-4 pollicaria, linearia,
basiconnata, glabra, finata. Flores in apice collecti in capitulis more Dianthi
caerulescentibus. In aetate calycis membranacei, aridi

canadensis Arenaria

(repens myrtifolia herb. Noell).

Alpne canadensis buxifolia perennis Catal. h. Parf.

Habitat in Canada herb. h. u. s.

Caulis plures, filiformes, teretes, ramosi, villosi. ^{procum bentes} Folia sessilia, unguiculata, ^{magis} ovata, ^{magis} oblonga, obtusa, acuta, enervi, supra glabra, ^{magis} subtus punctata villosa, ^{magis} subtrinervi. ^{magis} Peduncululi terminaliter, ^{magis} filiformes, breves, uniflori: pedicelli laterales intraxillati. Calyx cis oblongo, glabro.

uniflora Arenaria

Habitat in Persia herb. de Lesped.

Planta palmari, basi ramosa: rami erecti pedunculo unifloro elongato digitati
terminati, glabri. Folia frequentia, pollicaria, subulata, glabra, rigida,
mucronata. Pedunculus superne viscosus, in medio foliola duo parva.
Calycis foliola erecta, pubescentia

Cotoneiflora Arenaria

Habitat in Sibiriä herb. La Mantii

Caules herbacei, filiformis, villosus. Folia subpetiolata, unguiculata, oblonga, obtusa, arenaria, enervia, margine costaque subtus ciliata. Pedunculi axillares, folio multo longioris, biflori. Calycis foliicola oblonga, obtusa, parva, laevis. Petala calycis longiora, cuneata, integra

Sida Arenaria

Habitat in Peru herb. Fusf.

Caules dichotomi, ramosi: rami decurrenti. Folia scabra

pedula Arenaria

Habitat in America septentr. herb. Ruck

Caulis fistulosus, apice dichotome ramosi.

rosea Aserana

Habitat in Syria herb. Desfont. 4

Caulis plures, trijolluceres, erecti, subullosi ^{si scilicet} simpliciter. Folia plurima
radicalia, in caulibus junioribus conferta, subulata, sive unguiculata, subim-
bricata, corassu scula, globosa, subtus convexa, duo vel quatuor, superne in caule
subfloribus. Pedunculi laterales, duo ^{vel tres} terminaliter, uti calycis villosi rufi
Calycis sextati. Petala purpurea.

Fruticosa Arenaria

Habitat herb. Aust.

Caules fruticosi, breves, inferne dichotome divisi, glabri: rami teretes, erecti, inferne glabri, superne villosi, pubescenti. Folia juniperina, in ramis sterilibus conferta in flexu ferè distanter, oppositi, semipollicares, glabri, rigidi, filiformes. Pedunculi dichotomi. Calycis foliola striata, obtusa, villosa viscosa.
an arenaria juniperina

minima Arenaria

alpine minima verna lusitanica capsulis echenatis Tournef. F. aff. v. h.

Habitat in algarvia

Caulis erecti, digitales, villosi - viscosi, basi ramosi. Folia venosa vix unguiculata.

Calycis foliola lanceolata.

cerastoides Ar.

Habitat in Pyrenois
Caulis ramosi, erecti.

Pyrenois

Vateria

involuta V.

peploides A. foliis ovatis acutis carnosis Lin. l. V fl. Dan. t. 624.
Gmel. sub. 4. t. 54

Alpine littoralis, foliis portulacae Bauh. pin. 251. Coef. p. 12. t. 2.

Telephium maritimum, portulacae folio. Bauh. in Com. petr. 3.

p. 270

Habitat ad littora maris Europa borealis & ^{retrogradi} in parte duobus

Caules articulati inferne attenuati ^{retrogradi} decumbentes ramosi glaberrimi apice bifidus cum flore brevi pedicellato Rami alter

in se quoque pollicares. Folia semplexia caulibus integerrima ^{superiora} glabra acuta ^{inferiora} ^{subumbonata} ^{superiora} ^{inferiora} ^{longiora} ^{angustiora}. Peduncululi

ca. articulo breviora
angustiora

terminales breves uniflori petala pallide flava calycis
vix longiora

Honkenya peploides Ecklon

Tetragetia G. foliis ovatis carinatis recurvis quadrifariam imbricatis
^{marginatis pungentibus}
Lin. Ment. 306. S.V. p. 4234

Caryophyllus saxatilis erico foliis ramis ~~repens~~ Bauh. prodr.
125. ~~pin. 211.~~

~~Habitat in Hispania~~

~~*Gypsophila aggregata* foliis multinatis recurvatis floribus
aggregatis Lin. Spec. pl. 501.~~

~~*Caryophyllus saxatilis*, erico foliis, umbellatis corymbis Bauh.
prodr. 105. pin. 211.~~

refluantur
omnia
Syring
ma

Habitat Montpelii, Pyrenoi et Hispania &

Caules plures, inferne ^{subpubescentes} subramosi digitales diffusi filiformes
articulati ~~fructu~~ ^{fructu} villosi. Tetraea ovata carinata, canaliculata
acuta, rigida pungente reflexa, internodii breviori basi connata
extus subtilis pime nervoso striata margine ~~in~~ ⁱⁿ ~~raspata~~ ^{raspata} inferne
flores retrosum imbricata. flores in capitulo aggregati
plures quam quinque folia floralia lanceolata.

multa folia
superiora individuum
subulata

^{usus}
descrip. in Syst. veget. ad sequentem partem

biflora A. foliis obovatis obtusis, caulebus procumbentibus pedunculis
bifloris lateralibus Lin. Mant. 714 Paquin coll. 1. p. 250 all.

~~alpe~~ Ped. t. 44. fig. 1 et tab. 64. fig. 3

alpine palustris ferrugli folio Schenck. d. 2. pag. 129

Habitat in Europa australis alpibus

Caules procumbentes filiformes glabri articulati, ^{ferrugli} palmarum et
ultra subramosi raris unguiculaturibus folia parva basi
pubescentia in ramulis conferta. Pedunculus est apice ramulorum
uniflori vel biflori pedunculus alter tenuior medio folio duabus
setis solidis calycis ovato lanceolato acuta vix trifurcata

Ceraftoides A. foliis spatulatis, caule erecto pubescente, floribus subsolita-
ris: petalis calyce duplo longioribus Pers. d. r. p. 166
Habitat in Barbana

non vid.

caulis erecto

Cateniflora Arenaria foliis ovatis obtusis, pedunculis lateralibus bifloris Lin-Spec. 605 * 1.
V. p. 423. Gmel. bot. 4. p. 159.

Habitat in Sibiria

Caulis digitalis, filiformis, simplicissimus. Folia ovata, obtusa, subperfoliata,
glabra. Peduncululus axillaris, unicuique, longus, bifidus. Corolla calycis longior
Lin-Spec. l. c.

Trineura A. foliis ovatis acutis petiolatis nervosis fl. paei: 3974
fl. Dan. tab. 329.

Alpine plantagineis folio Bauh. hist. 3. p. 363

Habitat in Europa sylvis O

Caulis filiformis dichotome ramosus ad centem pubescens arti-
culus subbi pollicibus. Folia fere unguicularia utraque
acuta ad centem punctis elevatis adpressa. Pedunculi ^{et terminales} ~~ext~~ ^{fructiferi} ~~mutantes~~

Dichotomia sesquipollicares uniflori Calycis foliola ovata
lanceolata margine membranacea
Facies alp. medio

margine glabri. — caule dichotomo, pedunculi

uniflori

Ciliata A foliis ovatis nervis ciliatis acutis L. V.

fl. Dan. 7.

³⁴⁶
346. Faerg. coll. 1. p. 245. t. 16. fig. 2.

Alpine serpyllifolius, multicaulis et multiflora Segu. Ver. 1. p. 421.

Tab. 5. fig. 2.

Habitat in Alpibus Rhodii Norvegiae

Caulis ramosus glaber filiformis. Folium vix semunquidulatum
basi angustato glabro ^{inferum geminis et ter tenuior} excepto margine tenuissime ciliato.

Pedunculus terminalis ^{serpyllifolius} ^{calycis} ^{ovato} ^{lan-}
ceolatus duabus margine membranatis. Petala calycis
longiora

— lanceolato oblongis

calycibus acutis

multicaulis A foliis ovatis enerviis sessilibus acutis: corollis Calycis majoribus
ten. 1. V. Jacq. coll. 1. p. 240. T. 17. fig. 1.

Alpini foliis lanceolatis, petalis integri calycis majoribus.
Hall. hist.

Habitat in Alpibus Helvetis, Pyrenaeis, ~~Norman~~

Caulis basi gamophylli rami simplicissimi digitales glabri ascendentes.
folia parva longitudine vix internodiorum
vix ab A. ulcato diversa nisi foliis enerviis absque ciliis

— lanceolato-oblongo basi subulcato et
calycibus acutis

norvegia ^{Caniolato} ^{enerri}
A foliis ^{linearibus} oblongis obtusis glabris pedunculatis sub unifloris
caulibus repentibus calycibus ^{obtusis}
Arenaria norvegia caulibus subterribus procumbentibus; floribus
binis terminalibus; foliis enerriis nudis Gum. fl. norv. 1800. tab
9. fig. 7. 9.

Legum. ⁱⁿ ^{ampula} ^{Wardii}

Caulis fissiformis digitales basi repentes simpliciter glabri.
Sola fissilia basi versus parum angustata. Pedunculus terminalis
interdum gemini vel terni pollicaris glabri, Calycis folio
la oblonga obtusa.

baleanica a foliis ovatis lucidi subcarnosi, caule repente pedunculis unifloris
Lin. S. N. 5. p. 2307 F. V. pag. 423.

Habitat in Insulis Balearibus

caules prostrati repentes subpubescentes pollicares. Folia petiolata confertim
scula, patentia subcarnosa enervia, lucida a pubis raris vix con-
spicuis pagina superioris. Pedunculi, solitarii, e ramificationibus
caulis erecti, caule vix longiores, subpubescentes; inferne instructi par-
foliorum. Calyx coracis rufopurpureo, pubescent. Corolla magni-
tudine et figura sp. nodosa. Petala in sexennia. Insetus cornua
media inter a. ciliatum et multicaulem at pedunculi longi.
Lin. ^{caules} teneros folia minor

triflor. Amerana caulebus diffusis ramis erectis subtrifloris, foliis lanceolatis
subulatis patentibus Caran. H. vol. 3. pag 26 Tab 249. fig 21.

Habitat in Hispania

an eadem cum ha.

racemosa A foliis ovatis acutis glabris, floribus subsessilibus

Habitat in ^{Arabia} oriente ^{secundum} ~~Costa~~ ^{Arabia}

Caulis filiformis teretes, glabris, digitatis, basi ramosi. Folium
pro magnitudine fere A. Jaspallefolium utrinque acuta
glabra. Radiculi axillares vel in racemo terminali. Capsula
oblonga calyce longior

algora A.

Habitat

St. Desfont

Brypetes

Character Essentialis. — B. Calyx tetraphyllus.

Sempyllofolia A. foliis subovatis acutis sessilibus, corollis calycis brevioribus
L. N. V. fl. Dan tab.

Alpine minor Tuck. h. 23.

Alpine minor multicaulis Bauh. pin. 287.

Habitat in Europa sylvis glareosis.

Caulis dichotomis apice lentis pubescens diffusus folia sessilia acuta ad
centem ciliata parva. Pedunculis a dichotomia a apice unifloris calycis
foliola ovato-lanceolata acuta.

caulibus dichotomis ~~fl.~~ pedunculis unifloris

crassifolia. Arenaria villosa subtomentosa foliis oblongis, pedunculis
unifloris fructibus reflexis, caule prostrato dichotomo.
In Aegypto legit L. Forsk.

Saxi Arenaria procumbenti. Caules tenues uti tota planta
e villosa minutis copiosis subnitens tomentosi subviscosi. Folia
opposita minuta patentissima crassa oblonga obtusa. Pedunculi
e dichotomia semiverticillari uniflori fructiferi pendu-
li ^{ut} calycis ^{ut} fere flexi. foliola calycis lanceolata obtusa
margine tenui membraceo. Petala ovata calycis
brevia. Capsula globosa longitudine calycis

~~Pupae~~ Arenaria

Scop. flor. carn

Dichotoma A. foliis inferioribus orbiculatis: superioribus lanceolatis caule
geniculato decumbente geniculisque dichotomis Virel. Her. fl. pl. 2. pag

55.

Habitat in montibus felejo.
offensivis tinnereis

non vidi

Halleri A. foliis ovatis obtusis basi subclavatis; caule prostrato Hall. herb.
Fr. n. 877
alpinae palestinae serpyllifolia Scheuchz. d. 2. pag. 129
Habitat in Alpibus helveticis

non vidi

montana A. foliis linearibus lanceolatis scabris, caulibus sterilibus congestis
procumbentibus. Lin. Elm. acad. 4. p. 272. +

Alpine foliis linearibus acuminatis, petalis florum integris ca-
lyce duplo longioribus Monn. obs. 127.

Habitat in Gallia australi montibus et Ericetis

Caules simplicissimi palmati interdum in ferne ramo uno vel altero
† teretes, scabriusculi articulati debiles filiformes inferne subpuber-
ulentes, palmatis vel pedales. Folia sessile acuta vix nullo-
coni inferiora articuli breviora. Pedunculi ~~et~~ terminales
† axillares ad lentem villosi subantheres uniflori folio duplo
vel triplo longiores. Calycis foliola ovato-lanceolata glab-
rescentia. Petala calycis longiora capsula globosa

margine scabra, caulibus
rudimentis fructiferis reflectis

Calycina. A. foliis linearibus lanceolatis, caule erecto teri, pedunculis
unifloris, calycibus corolla longioribus. Pers. Voyag. 2. pag. 167.
Habitat in Barbaria "

non di

11-12 prostratus Arenaria foliis linear lanceolatis, prostratis villosis, petalis
caulis
triplicis nullo calyce brevioribus Tab.

Cherleria sedoides Dorsh. Catal: pl: Egypt. pag 66. n. 241.
Legi in nideratis Tuneti, Dorsh. in Egypti

Radix perennis

Caules plures, prostrati, diffusi, pedales, basi lignosi, teretes, fili
formes. Rami simplices, apice duchotome ramosi divisi.

est forte secundum
 herb Vaill. alpina
 perennis lusitanica

Folia sespita, opposita, unquiculana, superiora majora, inter
radice crassa hermano statis duplo breviora, pubescent rudimenta foliacea et
omnibus axillis. Angula nulla

et alpine montana
 longa radice, herma
 na folio Boucon
 folia modo rotundiora
 quam in mea

Panicula terminalis, duchotoma. Flores pedunculati, arena
na maximo et minore. Peduncululi capillares, uni flori,
pubescentes, sebrifosi, unquiculares

Calycis foliola ovato lanceolata, marginem membranacea.
Petala nuba, calyce parum breviora.

Alb Arenaria montana differt caulis omnibus floriferis
prostratis, nee floriferis erectis, corolli quaduplo minoribus
petalis calyce brevioribus. Dorsh. non differt nisi foliis par
um brevioribus. Arenaria geniculata Perr. it. 2. pag. 190 forte eadem
cum nostra

Inflorea Arenaria foliis lanceolato-subulatis ciliatis, ^{subtus pilosis} ramis subtrifloris, petalis linearis obtusi
Mant. 1907 L. S. V. p. 423.

Habita in Europa australi & hispania

Caules palmares, copiosi, diffusi, ascendentes, teretes, subpubescentes: ramis alternis, erectis
Folia lanceolato-subulata (sinipenna) patentia acuminata, ciliata, subtus pube
scentia: floralia ovato-lanceolata, subtus pilosa. Pedunculi terminales, plures
teretes, pubescentes, articulis caulinis longioribus: Bracteis 2. ^{marginis} ^{pubescentibus} ovatis, ciliatis,
erectis pubescentibus. Calyx ^{foliolor} ovato, acuta, erecta, pubescent. Petala obovata, oblonga,
calycis duplo longiora, patentia, obtusa, alba, linearia. Stamina alba. Pistillum sine
filamentis brevius h. M. L. C.

Lobata rugulosa

In hispania
lecta

~~ante ab A. austriaca sutorum diversa. Jam eadem cum graminifolia
adduci est mente Villarsii in illa ex horto ^{graminifolia} ~~graminifolia~~ ^{graminifolia} ~~graminifolia~~ ^{graminifolia}
reflora ~~h. t. flora~~ est quod mihi quam maxime probabile videtur~~

Denique

maxime affinis grandiflora

immerita

calycibus laevibus