

Arcthuja

1. bulbosa A. radice globosa, scapo vaginato, patha diphylla
2. ophioGLOSSOIDES A. radice fibrosa, scapi foliis ovali, Coleolo pithaceo canaliculato
3. DISSEMINATA A. radice subpalmata, scapi foliis Coleologue pithaceo lanceo
lato, petalis ex venis adpendentibus
4. capensis A. bulbo subrotundo, caule diphylo simplici unifloro
5. ciliata A. bulbo rotundo, foliis ovatis ciliatis, pubescenti
- ~~6. ciliata A. radice carnosa, foliis oviformi orbiculato latius ciliati~~
7. bipLUMATA A. scapo vaginato, patha cucullata, petalis duobus inferioribus elongatis, superioribus ciliatis

Dissectata Aretz

Habitat ^p Herb Desfont.

Caulis erectus, pedalis et ultra, teres, striatus, caespitibus pennis anfractu. Folium
2-3., remotissimo, sessile, lanceolatum. Flores terminalis solitarii, sessile. Germe
les qui pollicare. Petala 3 linearia, bipollucana, duo lanceolata, breviora
Lobum nectarii oblongum

parviflora *Arctostaphylos*

Habitat in Carolina. Herb. Rich.

Caules spithamei. Folia cordata, ut unguis alani, remota. Flores 2-3.

Radix bulbosa

OphioGLOSSIDES A. radice fibrosa, scapi folio ovali, foliolo pinnatifido lanceolato
Lin S. V. p. 816.

Helleborus virginiana, *ophioglossifolius* Pluk. alm. 102. t. 93. fig. 2.

Helleborus virginiana *diphyllus* Monf. herb. 3. p. 400. f. 12. t. 11. fig. 15.

^{misa}
Helleborus ^{malus} *virginicus* et *canadensis* aquosus y herb. ^{Richard.} ~~Reichb.~~ ^{quae}

specime n. communiant

undulata Onhis

Ha filat in Cantu bono spei

^{Pauli in d. p. p.}
Pauli pithamou

Nectus vagus foliorum. Folia lineari lanceola
Sa attenuata angusta undulata ensipa bipollicaria. Spica
bipollicaria multiflora. Labium oblongum bifidum laciniis lacinis
latis. Petala duo exteriora subrotunda magna concava. Dis alia
lanceolata breviora. Nectarium in flore aut trilobum laciniis duabus
linearibus horizontalibus tertia ha pedicellata dilatata sub lunari
pubescens. Calcar vel cornu nullum

Onhis coracina foliis serratis in capreolum abeuntibus Burt. cent
3. p. 7. tab. 11

Ophrys forte

an arethusa ensipa

petala duo lateralia oblonga fere usque ad unguiculam interiora parva fere sum calcar

bulbosa A. radice globosa, scapo vaginato, spatha diphylla Lin. l. V. p. 876

Helleborine mariana monanthos, flore longo purpurascente Liliaceo
Plukh. mant. 100. t. 340. fig. 7.

Habitat in Virginia et Canada aquis 2

Folia Caulis fr. tener semipedalis erectus superne nudus inferne folia
duo vel tres pibulata. Flor terminalis erectus

divaricata A radice subpalmata, caepi folio foliisque spatulato canaliculato,
petalis exterioribus appendentibus Lch. t. V. p. 217.

Helleborie lili folio caulem ambeente, flore unico hexapetalo:
tribus petalis longis angustis obscure purpureis, ceteris brevioribus
rosaceis Catess. Car. t. p. 50. Tab. 50.

Habitat in America boreali paludosis 4

capensis A bulbo subrotundo, caule diphylo simpliciter unifloro Lin. Suppl. p. 405

J.V. p. 017.

Habitat in Cap. bono specie 2

Folia tera, alterna vaginaria, subulata

non vid.

Circumflexa O bulbis indivisi, floribus tripetalis: galea alis emarginatis
tabis trifido, lateralibus circumflexis Lin. l. V. p. 214. Am. Acad
b. p. III n. 9. 5 *

Onthi barba carens, flore luteo viridi Barb. cent. 3. p. 8. Tab. 13

Habitat ad Cap. b. spei v

Bulbus subrotundus. Tolia canaliculata, spica subquaque flora,
bracteis ventricosis. Corolla galea valde fornicata, hemisphaerica
vedice mucronata. Ala duo patenti biloba, lobo superiore ma
jore. Nectarii labellum erectum: laciniis intermedia acuta. Latera
les membranacei, lineares, revoluti circumflexo lris.

Secunda Anth. caule diphylla, foliis lineariibus, spica
secunda Herb. prodr. pag. 3.

allofa L. bulbo rotundo, foliis ovatis ciliatis, pubescenti Lin. Stept. p. 405

S. V. pag. 017.

Habitat in Cap. b. pra. 4
refert Commelinam.

non vid.

alaris Ar. caule dichyllo, foliis oblongis acuminatis, spica secunda

Thunb. prodr. pag. 3.

~~Habitat in cap. b. spec.~~

Cyprus alaris Kun Suppl. pag. 3.

non vidi

alata Oph. latello $\frac{1}{2}$ p. *Lucania medea* benigna, caute polyphylla

biplumata A scapo vaginato, spatula cucullata, petalis duobus inferioribus
elongatis superioribus latere barbatis Lin. Suppl. pag. 405 & P.V. p. 17.

^{mitte} *Bipinnula* Fus. Gen. pag. 65

Habitat in Bononia. ^{voss}

Caulis simplicissimus. Teelus vaginis ^{latis} foliorum. ^{6 vel septem ultimis} Eolia radiiglia
linearis lanceolata. caulina membranacea nervosa venosa

totum caulem verticillata bipollicaria lamina brevis ovata
lanceolata. & costis terminalis foliolarum brevis sive pedunculata

Corolla pentapetala. inaequalis duplici ordine superioribus ovato
lanceolatum acuminatum galeiformis interioribus parum

longior. duo interiora ovata acuta lata duo exteriora
subulata basi dilatata reliquis sesquialongiora patentia
a medio fere ad apicem pilis clavatis barbata.

racemosa A. radice tuberosa bipartita, foliis radicalibus ovatis nervo
scapo subnudo, floribus racemosis alternis pedicellatis Walt
fl. Car. p. 222.
Habitat in Carolina.

non vid.

Spicata A. radice tuberosa, scapo a phyllo, floribus sessilibus
alternis Walt. fl. Car. pag. 222.
Habitat in Carolina

non vid.

foliosa A. radice bulbosa, caule folios unifloro, foliis alter
nis nervosis, capsula hexagona - Wall. fl. Car. pag. 223
Habitat in Carolina

non vidi

crispa A. caule polyphylo, foliis crispis, spica multiflora densa. Thunb.
prodr. pag. 3
Habitat in cap. b. spec.

Num specimen herb. huius est vel Satyrium cernuum nescio