

Aristea

100 Aristea. Pistola 6. Styl. declinatus. Stigma in fundibulo for me
hiano. Caps ~~infera~~ polysperma.

Cyanea 1. Aristea capitulis terminalibus, spathis lacinis, scapo ^{unipiti}
Gramen tomentosum pumilum promontori bono spei Plukn. alm.
179. t. 299. f. 5.

Perfoliato angustifolis montano Columna similis planta umbellifera
nova, fructu triplici membraceo, C. b. spei. Breyn. Beauv. fossi:
in cart. pl. 25

Gramen tomentosum pumilum promontori bono spei Plukn. alm. 179.
t. 299. f. 5.

Dupleuri ~~et~~ angustioribus ~~et~~ ^{gramineis} foliis, planta umbellata flore rubro
~~mon~~ petaloide, calyce triangulari ex involucri tomentosum pro
pro parte innata, cauliculis ~~et~~ nodos villosis Plukn. Mant

34
Gramen eriophorum africanum gladiolo vel Sisyrinchio affinis,
flore flocculoso lanugine fimbriato Plukn. mant. 98.
7ia Hort. Cliff. 496.

7ia ^{foliis} ad radice nervosis, ^{gramineis}, floribus ac fructu ^{pappo} convolutis
Burm. afr. 191. t. 70. f. 2.

Cyanea 1. Anistea floribus capitatis terminalibus, spathis lacinis,

scapo antheri

gladiolo vel symmetris foliis affinis
floribus glaucis longe conuoluitur

~~Gramen eripitum africanum flore laeui Pluk. mant. 98.~~

~~Gramen tomentosum humilium promontorii bono spei Pluk.~~

Alm. 179. t. 299. f. 5.

Aspidium
Asplenium
Cereopitium
Hologordium
Ephedra
Lambertia
Pennis.
Wittania
Blechnum
Woodwardia
Lindsea

Cyanea 1.

Anistea capitulo terminali, spathis laevis, scapo anicipiti.

Perfoliato angustifolio montano Columna similis planta non-
bellifera nova, fructu triplici membranaceo, C. b. Spec. Boeyn.
Lasc. in Cent. pl. 25.

~~Anistea cyanea~~
Hort. New. 1. p. 67.

~~Anistea cyanea;~~
foliis ensiformi-
bus radi alibus;
floribus capitatis cy-
neis Andr. raport. t. 10.

Gramen tomentosum pumilum promontori bono spec. Plukh.
alm. 174. t. 299. f. 5

Flia. Hort. cliff. 490

Flia foliis ad radicem nervosis, gramineis, floribus ac fructu
pappo consolutis. Burm. afr. 191. t. 70. f. 2.

^{Morosa}
~~Flia~~ africana; floribus capitatis, spathis laevis Lin. 848. Veg.
45.

Morosa africana; scapo anicipiti, foliis distichis, floribus capita-
tis, spathis membranaceis laevis Thunb. Diss. de Moros. n. 3.

Habitat in Cap. l. spec. 7

scapo nonim breviora

~~Anistea cyanea~~
Hort. New. 1. p. 67

Planta digitalis. Scopi plures. folia radicalia ~~distichis~~, unicum
vel duo in scapo, ~~lineari angustissima~~, ~~stis scapo parvis~~ ~~triacina~~
vete

Chamaeleon Encorum Lin. 1. V

Chamaelea Cam. ex. 1773.

Chamaelea Nicolleos 977 *Wauh. jun. 462.*

Habitat in Hispania, Marbona glareosis & subsericis.

Chamaelea ramis flexuosis. Solca albena lanceolata
basi acuta, apice obtusa mucronata interdu
panum amarginata glabra integerrima averia forma semipollin
na. flori axillari, sessili brevis pedunculati solitari
panum ultra

Chamaelea. Juxta duo, opposita, longitudine florum, lanceolata, sessili, apice et
marginem membranaceo, pallido, laevigato, punctato. *Chamaelea* *Chamaelea* *Chamaelea*
lati, interdum capitulum prolixo terminali et axilla vaginis duplens.

Spiralis 2. Aristea floribus alternis subsaeundis, ^{antheris.} scapo ~~compresso~~
Mora spiralis; caule compresso articulato multifloro.
Folius ensiformibus erectis, floribus axillaribus Lin. Pupp. 99.
Mora spiralis; scapo compresso articulato, foliis erectis,
floribus alternis, subsaeundis Thunb. Dios. Mor. n. 2.
Habitat ad Cap. b. spei 2

Scapus ~~antheris~~, pedalis, erectus, ~~articulatus~~, striatus, glaber.
Folia radicalia scapo ~~via breviora~~, linearia, erecta, striata,
acuta: scapi spatha formia. Flores laterales. Spatha
brua longitudine corollae, concava, subbiflora, concava,
acuminata, brunnea. Corolla alba & coerulea: laciniis
aequales, pollicares, ovatae, obtusae, extus albae, vivaces, intus
albae, inferne crassae, basi intus macula cordata purpurea.
Stigma pimplex, tunicatum, villosum, violaceum.

Cochinchina si *Atropa* Lour. fl. Coch. pag. 36.

Habitat in Cochinchina. 5

Rubra bipedali ramis prostratis procumbens. Folia ovato-lanceolata
subrenata, serrata, nervis inaequalibus, oppositis. Racemi sub
terminales. Cal. 3 phyllis foliolis acutis divisis. Cor. 1 petalo. Anthera
2 dymo. Germen inferum ovatum filiatum. Stylus filiformis. Stigma
crassiusculum. Pericarp. 0. Semen ovatum filiatum, hirsutum.

Cocculca 3 Arisea floribus capitatis ^{erimis} racemosis, spathis integris, scapo
tereti.

Gladiolus capitatus; caule ramoso, capitulis pedunculatis, radice
tuberosa. Lin. Spei. pl. 53.

Morea Cocculca; scapo tereti, foliis distichis, florum capitulis
alternis, spathis membranaceis integris Thunb. Diss. N. 15.

t. 2.
Habitat in Cap. b. Spei 4.

Scapus ^{tripedalis} simplex, erectus, ~~striatus, glaber.~~ Folia radicalia
plurima, disticha, scapo breviora, ~~erecta, linearia, striata, gla-~~
~~bra~~: scapi similia, vaginatis, internodiis longiora. ~~capitulis~~
~~in capitulis collectis~~; Capitula pedunculata: pedunculi
alterni, unguiculares, teretes. Spatha universalis, longitu-
dine capituli, lanciolata, attenuata, concava: partales ora-
to, margine membranaceo. Corolla subhexapetala, cocculca:
laciniis ovato, obtuso, concava, erecto-patentes, venis,
alterno paulo angustiores. Stigma simplex, obtusum, trig-
num

florum capitula
superne pedun-
culata.

Habitus ^{lineari-ensiformis,} folia radicalia distincta, erecta, striata, uti reliqua planta
glabra. Scapus erectus, in pedunculos divinus, articu-
latus, fo. subtilissime striatus, fusco-purpureo