

Antida

vestita Anfrida panicula trichotoma patenti, anfris aequalibus glabris, calyce  
inæquali. Thunb. Prodr. fl. Cap. 1, pag. 49.  
Habitat in Cap. b. frei

non vidi

*fasciculata* *Arctostida*

Habitat in monte video Commerfon Herb. Thauri

Culmi plures, semipedales, geniculo inferiore in fracti, teretes, glabri. Sola involuta, subulata. Pedunculi superne, approximati in panicula contracta: 8 lobuli plures contigui, breviter pedicellati. Calycis valvula lineares, fusca, corolla longioris, altero parum brevior. Antha longa, 3 pollicares, nuda, aequales, fusciflorae ter flavo-centes.



*Anstida*

Habitat in Illionois Michaux herb. Inj.

Caeni filiformes, glabri, ramis erectis fructi. Folia setacei. Strobili 4-  
5que remotissimi, solitarii, breviter pedunculati.

habes no 2.



*oleantha Aristida*

Habitat in Carolina herb. Richard

Varia aristis lateralibus subnullis et aristis vixibus & lobis intermedio panem  
longiore.

habes

*Dichotoma Anstida*

Habitat in Carolina Herb. Mich.

*habes*

Setosa Anstida

Habitat in Pantanoney Muehaus herb. Anst.

Culmi plures, semi pedales, inflexi, ramosi, filiformes. Folia sabauca, viri  
di glauca. Elenior racemas simplici, distantes, 4-5. semipollicares, lineares.  
Antha dua laterales brevissimo, <sup>textu</sup> altera elongata, basi contorta

habeo



Antea

Habitat Allonau Michaux herb. Musf.

habes no 3

ternipes A. panicula coarctata longissima, ramulis ternis capillanibus, anthesis  
lateralibus brevioribus Pavan. u. pag. 46.

Habitat in Panama

Folia convoluta, subulata, sessipedalis. Panicula sesquipedalis: rami semi-  
pedales, erecti, apice em sessis floriferi. Spicula pedicellata, circiter decem  
alterni. Calycis vides, carnato, exteriorum parum brevior. Corolla caly-  
ce longior, basi villosa. Antha intermedia semipollicaris Pavan

interrupta A. panicula simplicia, pedicellis fasciculatis distantibus; calycibus  
corolla brevioribus, anthesis subbarbatis lateralibus brevioribus.

Aristida interrupta: panicula ramis virgatis: florum fasciculis interruptis.  
corolla calycibus longiora

Habitat in Regno Mexicano

Culmus tripedalis, geniculi ~~in~~ rufati rubentes. Vagina longitudine internodorum  
num. folia subulata, bipedalia. Panicula rami erecti, pedicelli 3. breves 13  
flori. Calycis valvula interior longior. Corolla basi villosa.



vagans A. panicula ramis patentissimis, <sup>calycibus corollae brevioribus</sup> corolla calyce longiore antheris nudis  
lateralibus brevioribus

Anfrida vagans: panicula ramis <sup>ulsi</sup> divaricatis paucifloris: corolla calycibus  
longiore, antheris brevibus, media productione *Cavendish: 5. pag 45. tab 471.*  
fig. 1.

Habitat prope portum Jackson in Nova Hollandia.

Quilmi 1/2 pedales, glabri, teretes, articuli rubentes, elongati. Solum pubulati  
semi-pedales. Panicula parva ramosa, simplex, pedicellis 1-2 floris. Corolla  
calyce et antheris longior, basi villosa.

luconienus A. panicula contracta, aristis subaequalibus glabris

Aristida luconienis: culmo ramoso: panicula contracta: spiculis alternatim  
pluribus: aristis subaequalibus.

Habitat in insula Luzon.

Culmi tripedales ramosi, glabri. Solia convoluta, pubulata: radice numerata pe-  
dalis. Sagine striato, arista. Panicula 4 pollicaris multiflora. Calycis valvula  
lutescentes, carinata interior paulo longior Corolla calycis longitudine, basi villosa  
fructifero punctis fuscis variegata



Latxa. A. panicula laxa, anthesis <sup>inferne</sup> contortis nudis lateralibus brevioribus.  
anthesis laxa: panicula laxa: pedicellis nudis, elongatis, bifidis: spiculis terminali-  
bus: anthesis inferne contortis. Cassan. ii: 5. pag. 44. Tab 470. Fig. 1.

Habitat prope montes viduo et in Philippinis

Calami fasciculati, simpliciter, bipedales. Eodem convoluta, subulata, radicalium pedales  
duo vel tria in culmo. Vagina striata, glabra. Panicula pedalis: pedunculi di-  
stantes, compressi, tenues, nudis, bifidis, spicula superne, alterna, breviter pedi-  
cellata, pollicares. Calycis valvula subulata, subaequalis, fusca. Perolla  
calyce parum brevior, basi villosa. Semina teretia, nuda, nitida



rigida A. panicula contracta, foliis subulatis rigidis erectis, ansta intermedia lateralibus  
longior. Bavan. H. S. pag. 44. tab. 469. fig. 2.

Habitat in Philippinis

Calmus <sup>vaginae vestis</sup> tripedalis, glaber, usque ad paniculam foliosus. Folia disticha, canaliculata,  
acumine subpinnis, tri vel 4 polliciana. Vaginae striatae. Paniculae saepe semi-  
pedales. Pedunculi plures ex eodem centro, inaequales. Calycis valvulae violaceae  
subaequales, sequi lineam longae. Corolla calyce brevior.

<sup>Lasarevula</sup>  
murra Q. panicula ~~subspicata~~, calycibus coloratis, antheris nudis aequalibus

antheris murina: panicula subspicata: ramulis alternatim binis, subsequenter floris:  
calycibus violaceis. Pavan. Ic. 5. pag. 44. T. 46y. fig. 1

Habitat in insula Mindanao

Culmi palmares, glabri, vaginis texti. Folia linearia, angusta, attenuata, <sup>apice convoluta</sup> tri-pollicaria  
superiore altitudine fere culmi, <sup>vagina striata</sup> ~~apice convoluta~~. Panicula contracta, bi-pollicaris  
rami alternatim binis, versus apicem sensim breviores; Spiculae squae terminales subun-  
bellati brevissime pedicellati. Calycis valvula glaberrima, violacea, interior polli-  
cari est denore duplo longiora. Antherae tri-pollicares

*pallens* A. paniculis simplicibus paucifloris, pedunculis subbifloris antheris aequalibus  
elongatis nudis

*Aristida pallens*: panicula pauciflora: pedicelli alternis brevibus bifloris: an-  
theris elongatis Cavan. Ic 5, pag. 43. Tab. 468. fig. 2.

Habitat Chili

Caules plures, vix vaginis foliorum, teretes, pedales ad ultra. Folia radicalia numerosa  
caulinea, 1.2. culmo breviora, filiformia, minime rigida. Pedunculi pariales 5-6  
alterni biflori. Galyxi valvula carinata, glabra, interior pollicaris exterior  
dimidio brevior. Valvula corollae basi hispita. Antherae tri-pollicares Cavan



pungens. Anisid. panicula laevis, anthesis subaequalibus plumosis, foliis  
subulatis rigidis pungentibus Desfont. flor. Atl. pag 109

Tab 35.

Habitat in arenosis Barbano

non vid.

coerulescens A. panicula coarctata elongata arivata subscium  
da in ver rugata, aristo subaequalibus glabris foliis que glabris  
De fontan. fl. Atl. pag 109. Tab. 21. fig. 2.  
Habitat in Barbana 7

non vid.



Aristida

Aristida capillacea, panicula contracta elongata capillacea, aristis equalibus divaricatis nudis

Aristida capillacea humilis panicula composita capillacea, aristis  
longibus divaricatis La Mark Tableau Encyclop. Botan. pag. 156.

Habitat in America meridionali von Rohr.

Cauli plures, fasciculati, erecti, sicut spithamosi vel semi pedales, inferne subramosi, uncinodosi, geniculis interdum infractis, tenuissimis filiformes, glabri.

Folia setacea, glabra, bipollicaria vel breviora

Panicula contracta, Pedunculi infra medium culmi incipientes, uti pedicelli capillares, inferiores quatuor ex eodem puncto, parum divisi.

Spicula parva, angustissimis. Arista setacea, unguiculata, glabra, aequalis, flore triplo vel quadruplo longioris, superne divaricata.

(Aristida setacea Cal. Petz. differt Calmo et omnibus partibus multo majoribus et robustioribus

Cavan. 4c. 5. p. 43. tab. 460. fig. 1. e Philippinis

Spec: nonnulla Bayanell.  
conferenda cum mea





racemosa d. Spiculis subracemosis patentissimis pedunculis rigidis basi villosis  
anthesis aequalibus necis

Habita in amenome

Culmi plures filiformes paucis ramis erectis spithameis folia  
subata bipolliciana uti vagina plerumque pilosa  
pedunculi horizontales remoti brevissimi basi villosi flori-  
tres in hazulo sespiti subulati valvula 1 floris inaequalis  
ore lenti inferne subvillosi



ornata Mel. ~~Folia~~ integris rigidis supra hirsutis setis adpressis subtus unia-  
nis: umbellis quadrifidis terminalibus paucifloris, capsulis hirsutis  
Schw. prodr. p. 69.  
Habitat in Jamaica &  
Flores de Cardon. Folia trinervia

aliam in herbario ~~Batavia~~ sub hoc nomine vidi ad diversa Folia cordata  
trinervia supra glandulis oblongis apicibus setosis adpressis or-  
natis, subtus hirsuta. Flores terminalibus racemosis  
Habitat in Guadaloupe India occid. &  
descript. quare inter americanas



americana Cristida panicula ramis simplicibus, spicis alternis Lin Am. acad  
5. p. 393 + S. V. p. 123

Habitat in Jamaica

Græmen festucæam referens. Culmus ramosus. ab A. asperis  
differt quod radii paniculae sunt indivisi. Spiculis alternis et flo-

ribus sessilibus, quorum valvula calycina purpurascens est.  
Lin.

Culmi plures ~~et~~ ramosi pedales geniculis imbricatis. Folia angusta  
glauca vixida pilis raris ciliata spiculis sessilibus

Adscensionis Anstida panicula <sup>Anstida</sup> ramosa, spicis sparsis <sup>Sney. pl. naz. 121\*</sup> Len. l. V. pag. 123  
Anstida paniculata; panicula ramosa spiculis linearibus, oblon-  
gus; arista cuiusvis glouculi triplici, glabra <sup>Booth. desir. pag</sup>  
25. gramin avenaceum, panicula minus sparsa, caryis singula gra-  
na tres aristas longissimas habent <sup>Loan. hist. 1. p. 16. t. 2. fig. 56</sup>  
Habitat in Impila adscensionis & aromenia arabici <sup>arabici ramosi</sup>  
Habitat Testu Duloni plures erecti, sedales filiformes glabri. Solia convolu-  
ta subulata. Panicula ante fabra

— patula



Setacea

A. panicula contracta, spiculis subulatis anthesis aequalibus  
glabri. <sup>Dwarfed</sup> <sup>erect</sup>  
anthesis setacea culmo erecto, anthesis spiculis <sup>Retzi</sup> off.  
4. pag. 22. <sup>Hooker</sup>

Habitat in Arabia Indica Orientali Kenia;  
Culmi saepe prostrati, plures. spiculis infra nodos  
rigidi vaginati. <sup>teretes</sup> glabri. folia convoluta glauca.  
Vendia subulata longa glabra. Panicula <sup>spitham</sup>  
Calyx, floris valvulis inaequalibus glabri. Corolla <sup>top</sup>  
barbata

pedunculi  
inferiores  
aggregati

affinis adspersionis



Hyssop A panicula divaricata patentissima, flocculis simplicibus semis glabris,  
antheris rectis divaricatis Lin. suppl. p. 113. & h. v. p. 124

Habitat in Malabarā Tenacis semi-  
gamen ramifera repens, Veretes rami ad gemmula sope plerumque foliis va-  
cinnati. Solia convoluta ~~et~~ <sup>et</sup> ~~sa~~ <sup>sa</sup> ~~pericula~~ <sup>pericula</sup> ~~vayna~~ <sup>vayna</sup> ~~se~~ <sup>se</sup> ~~pelosa~~ <sup>pelosa</sup>  
Panicula terminalis magna, sed uniculis pedicellisque gemmatis  
divaricatis. Rachis angulata. Flocculi filiformes angustulores.  
Calycis 1 floris valvulis 2. inaequalibus longiori subulato terminali  
antheris 3 bus aequalibus rectis <sup>angulo</sup> ~~spicula~~ <sup>spicula</sup> longioribus patentibus retro  
habris <sup>intendun</sup>  
rayno foliorum radicalium Albedo tomentosa

Antida depressa Retzii

\_\_\_\_\_ pedunculis pedicellisque gemmatis  
valvulis calycinis inaequalibus ramis in gemmulis fasciculatis

Depressa Anthera culmū trifido ramosi decumbentibus; antheris breviusculis

Retz. obs. 4. p. 22.

Habitat in peninsulis Indis orientalis

anthera hystera Lin



capillaica Anff. humilis parvula composita capillaica, anski carbu-  
divariatis La Mark J. Enc. pag. 156.  
Habitat in America meridionali.

non vidi.

Stipoides Antherida panicula composita affusa capillacea, calycibus unifloris  
anthera prolonga Lamiaceae Mart. - T. Enc. pag. 157  
Habitat in Senegal

non vidi



gigantea *Antifida* panicula elongata effusa secunda, calycibus unifloris, anthesis  
collinis subequalibus rectis Len. Suppl. p. 113\*

Habitat in Teneriffa

Gramen altissimum ramosum, glaberrimum. Paniculae terminales Dodran-  
tales, effusae, (non corymbatae ut in *Antifida* sicenponis) secunda. Calycis glaberrimi,  
iniquales, conulescentes. Corolla glabra, anthesis 3 lobi, 2 aequales  
brevioribus, nudis infundis Len. l. c.

flavescenti Anstida Panicula patentissima pedunculis pedicellis que  
geminatis calyci anstis longis pennis - squalebus nudis basi contortis  
Habitat in Cap. b. p. ei

Panicula ramis remotis geminatis uti pedicelli basi fusis. pedicelli  
capillares. valvula calycino inaequali uniflori flavescentis  
basi fusis anstis inferne contortis Panicula longior

~~colle. Oculi. Anstis. ramis. remotis. geminatis. uti. pedicelli. basi. fusis. pedicelli. capillares. valvula. calycino. inaequali. uniflori. flavescentis. basi. fusis. anstis. inferne. contortis. Panicula. longior.~~



Zeylanicus Allophyllus foliis petiolatis ovatis serratis subtus pubescentibus  
Rami tomentosi

Allophyllus Zeylanicus Lin. Flor. zeyl. 140\* L.V. p. 360

Rhiz. Cobbe. foliis ternatis: foliis ovatis acuminatis serratis, pedun-  
culis tomentosis Lin. L.V. 293.

Habitat in Zeylona

Rami teretes inferne glabri punctis minutis elevatis, superne  
tomentosa canescentia. Folia petiolata. Coleola vix bipollia

petiolus longitudo  
foliolorum

na venosa subtus pallida, mollia intermedio utraque acuto  
Racemi axillares foliis brevioribus solitarii erecti h. f. tripollia  
res. Flores magni copiosi glabri.

amandinaea A. paniculata, anfra intermedia Longior Lavi Lun Mont

186. 4 S. V. p. 124.

Habitat in India orientali

Culmi quadripedales teretes glabri crassitie feli empositi <sup>2</sup> gemulas  
nodosi. Folia involuta glabra angusta <sup>glabris</sup> striata. Panicula erecta  
multiflora pedalis pedicellis capillanibus <sup>marginis</sup> calyx 5-7 florus. Spicula parva  
lineari. Corolla salivula exterior anfra <sup>marginis</sup> longitudinalis illius recurva  
utroque anfra minuta ad basin,

calycibus multifloris

salivulis corollae exterioris marginis anfractis

foliis recurvatis



plumosa Antifida <sup>Antifida</sup> paniculata, arista intermedia longiore lanata  
Edm. villosi Lef. V. Spec. plant. pag. 1666. Tab. no. III.

Antifida lanata, panicula ramosa, Corolla arista media  
lanata Dorff. Descrip. pag. 25. no. 87.

Culmus ~~superne~~ <sup>in 4-5 locis</sup> in quatuor vel quinque raris divi  
suri: ad ~~divisuras~~ <sup>divisuras</sup> lanatus Inter nodos inferioribus ~~superne~~

Glauca involuta, filiformia, bipollicaria, rigida apice, apice  
flavescentia. <sup>ad dimidium</sup>  
Vagina articulos inferiores tantummodo tegunt, ~~relegia~~  
pars valde lanata est.

Arista laterales intermediis triplo breviores, capillares.  
Patriam hujus Graminis Americam esse asserit Alph. Cuv.  
Spec. Plant. pag. 1666. ed. 2. sed error absque dubio est. Incho-  
lam Orientis etiam indicat Synonymum Tournefortii ibid.  
allatum. ~~Figura Tab. III. ad l.~~

(Tab. III. a ramulis paniculae magnitudine naturali. b. flos  
calyce instructus auctus)

bicolor <sup>gabri</sup> A. panicula simplicis, sepalis basi coloratis antheris  
medea longissima plumosa valvulis calycinis sequalibus

Habitat in Cop. b. p. r.

Calme erecti geniculis barbati. folia <sup>puberula</sup> pedunculati. Pedunculi  
remoti patentes capillares infirmi 3. <sup>pro</sup> reliquis gemini  
1 flori valvula calycis unguis per <sup>pro</sup> promineo basi violaceo  
nervis parvis aorta 3 <sup>dua</sup> patentes pro <sup>dua</sup> laterales  
breviores intermedia duplo longior superne plumosa



<sup>21</sup>  
~~Trichotoma Rhexia~~ ~~per~~ pedunculis oppositis dichotomis.

~~Rhexia Trichotoma.~~

~~Habitat in Surinamo~~

~~Caulis et folia et Pedunculi hispidi. Calycis <sup>peris</sup> ~~peris~~ apice bellatis tectis  
<sup>obtusis</sup> latius ciliatis nervis, ~~per~~ pedunculati. ceterum semel ~~per~~ glomerata.~~

capitulata. spiculis villosi fasciculato paniculati anthera intermedio  
longiorae plumbosa

Habitat in agris

Culmi plures prostrati erecti simpliciter articulis infimis

longis <sup>superne</sup> spiculis <sup>vagina</sup> <sup>toti</sup> <sup>seck</sup> <sup>vagina</sup> <sup>brevi</sup> <sup>vel</sup> <sup>longiorae</sup>  
ferrata margine orque tomentosa. folia vagina parum <sup>longiorae</sup>

longiora con voluta ferrata pubulata. spiculi <sup>longiorae</sup> <sup>brevi</sup>

3-5 flori in panicula contracta pollicari <sup>valvula</sup> <sup>calycina</sup>  
valde villosa inaequali purpurascens anthera laterales

brevi <sup>nudo</sup> <sup>intermedio</sup> <sup>parum</sup> <sup>la</sup> <sup>spicula</sup> <sup>parum</sup>

longior <sup>villosa</sup> <sup>pilosa</sup>.



glomerata *Rhexia* foliis lanceolatis hirsutis floribus lateralibus solitariis terminalibus

~~glomeratis~~

~~*Rhexia glomerata*~~

~~Habitat Surinami~~

~~Caulis ramosus ramis purpurascens et strigis ambriatis confertis <sup>tetragonis</sup>  
alio strigo vago per totam plantam sparso. Folia <sup>per filia pollicaria</sup> lanceolata acuta  
imbricata integerrima remotissima. Flores axillares oppositi <sup>sterre</sup>  
pedunculati terminalis 3-5 conferti. Calycis adpressi fatis plurimis apice  
stellati~~

capensis A. panicula trichotoma patenti; antheris omnibus villosis. Thalamo pedic.  
pag. 14

Habitat in Cap. b. sp.

Culmi sesquipedales teres teretes glabri. Folia convoluta longa. vagina  
ore tomentosa. pedunculi capillares antheris glabris subulatis  
antheris longa divaricatae. glomeruli basi tomentosi.



*Panicum setigerum*

Ruth Stornia