

# Aristolochia

1. bilobata A. foliis bilobis, caule volubili
2. trilobata A. foliis trilobis: lobis sicae aequalibus, stipulis cordatis, floribus pedunculo longioribus
3. pentandra A. foliis cordatis subtilibus intermedio productione, bracteis cordatis, floribus pedunculo brevioribus
4. peltata A. foliis reniformibus subpeltatis, caule volubili
5. maxima A. foliis oblongis acuminatis, caule volubili, pedunculis saepe multifloris
6. bilabrata A. foliis ovato-oblongis trinerviis, caule volubili, corollis bilabratis
7. nuzeni A. foliis cordatis, caule volubili, corollis bilabratis
8. erecta A. foliis lanceolatis sessilibus subhispatis caule erecto, pedunculis solitariis, floribus longissimis
9. arborescens A. foliis cordato-lanceolatis, caule erecto fruticoso
10. caudata A. foliis cordatis acuminatis obtusis trinerviis, caule volubili
11. obtusifolia A. foliis cordatis apice rotundatis trinerviis, subtus reticulato-venosis
12. grandiflora A. fomentosis

13. odoratissima A. foliis cordatis, labio corollae majore cordato
14. Lytho A. foliis cordatis petiolatis, floribus solitariis. limbo trifido aequali, bractea ovata, caule v. labili frutescente.
15. anguicida A. foliis cordatis acuminatis, stipulis cordatis, labio corollae breviori subulato
16. bracteata <sup>to</sup> foliis cordatis obtusis, caule erecto, pedunculis solitariis unifloris, bracteis cordatis petiolatis
17. meunorum A. foliis hastatis integerrimis, caule inferio simplici floribus solitariis  
ovalifolia recurvatis.
18. ~~indica~~ <sup>indica</sup> A. foliis cordato-oblongis subemarginatis, pedunculis multifloris
19. lanceolata A. foliis lanceolatis basi subcordatis, pedunculis confertis
20. boetica A. foliis cordatis obtusis pedunculis subternis
21. semper vivens A. foliis cordato-oblongis acuminatis, caule inferio, floribus solitariis curvis
22. truncata A. foliis cordatis obtusis longis, floribus solitariis rectis oblique truncatis
23. serpentaria <sup>si</sup> A. foliis cordato-oblongis planis cauleque flexuoso hispido, floribus solitariis subradicalibus
24. pistolochia A. foliis cordatis crenulatis subtus reticulatis petiolatis, floribus subplurariis



25. rotunda A. foliis cordatis subsessilibus obtusis, caule infirmo, floribus solitariis  
26. longa A. foliis cordatis petiolatis integerrimis obtusiusculis, caule infirmo, floribus  
solitariis  
27. hispida A. foliis cordatis obtusiusculis hirsutis, floribus solitariis pediculis recurvatis  
subtruncatis  
28. clematidis A. foliis cordatis caulebus erectis, floribus axillaribus congestis

obtusata Aristolochia foliis cordatis apice rotundatis Vineris, subtus reti-  
culato venoso tomentosi; caule volubili pedunculis solitariis Sw.

prodr: pag. 126. cum synonymo  
in Guadeloupe legit Dr. Von Rohr.

Rami filiformes, striati glabri.

Folia petiolata tripolliciana sursum minora, supra glabra  
subtus; tenuissimi vellos-subtomentosa, reticulata.

Petiolus ~~in~~ pollicaris

Pedunculus petiolo parum longior, glaber

Corolla pollicaris, orbe armato subperispermis. Labium oblon-  
gum obtusum longitudine tubi apice supra punctato scabrum

Aristolochia nigosa: foliis cordato-oblongis obtusis rugosis, caule volu-  
bili, fructu oblongo acuminato La Mart. Encycl.



An *Polochia* foliis cordato-oblongis obtusis utraque glabris pedunculis  
solitariis, labello oblongo obtuso

odoratissima Anst. foliis cordatis acutis glabris, pedunculis solitariis lobello  
Cordato-ovato acuto



*Asplenium*

Habitat in Oriente herb. de Lespede

Caulis herbaceus, flexuosus, simplex. Folia subsessile, sagittata lanceolata, bipollicaria, venosa, mucronata, glabra: auricula acuta. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori. Flores nutantes. Labium cordatum, acutum

adest forte in herbario

Anstolocheia

Habitat in Antillis herb. Surinam apud Guispen  
Caulis glaber. Folia basi cordata, trilobo hastata, venosa, glabra palmata  
et ultra. Lobi ovati laterales non horizontales, obtusissimi, intermedius  
elongatus

a trilobo forte Deverna



minor Anisotrichia

Anisotrichia Chia, longa, folio minori, subrotundo, flore venus pro Tournef.  
Corol. par. 0

Habitat in Gupula Chia hist Tournef.

Caulis filiformis, glaber, semipedalis, simplex. Folia breviter petiolata, cordata, oblonga, obtusissima, emarginata, glabra, subtus venosa, vix semipollicaria. Peduncululi axillares, solitarii, uniflori. Corolla unguiculata. Labrum subulatum.

*Aristolochia*

*Aristolochia orientalis*, rotundifolia oblongo cordiformi, flae tubulosa lutes  
Tournes. Cor. pag.

Habitat in oriente herb. Mus.

Caulis latus, ascendens, simplex, glaber, subflexuosus. Folia petiolata, polli-  
cana, cordata, emarginata, glabra. Petioli unguiculares. Pedunculi axil-  
lares, solitarii, longitudine petioli. Corolla tubulosa, recta: labium lineam  
glabrum.



Acuminata Aristolochia

Habitat in insula francia Commes. herb. tus /

glabra. Folia cordata, ovata, quadripollicaria, acuminata, quinque nervia, venosa. Pedun-  
culi axillares, multiflori. Corolla ut pollicari, basi globosa. Labium lineare lancicola  
furn.

*Antipholchia*

Habitat in Syria herb Desfont

Caulis herbaceus, pedalis, debilis, glaber, striatus. Folia cordato-subrotunda, pollicaria, versuta, venis supra glabra, subtus glauca. Pedunculi axillares, folitarii villosi, uti corolla, Cor uniflora. Corolla six pollicaris, labio lanceolato



altissima Aristolochia

Habitat herb. herb. Desfont.

glabra. Folia cordato-ovata, venosa, subquinque nervia, 2-3 pollicaria, obtusa  
superius nitidiuscula. Caulis angulatus. Pediculi axillares solitarii, uniflori,  
pollicares. Corolla pollicaris, apertura obliqua: lobis obtuso-oblongis.

acuminata Aristolochia

Habitat

hib. Thunbergi

Folia cordato-ovata, 3-4 pollicaria, acuminata, venosa. Pedunculi axillares  
multiflori. Corolla vix pollicaris: labium cordato-lanceolatum, tubi brevis  
fimus



*pubulata* Anholochia

Habitat in Antillis herb. Desfont.

Caulis scandens. Rami tenues glabri. Folia petiolata, semipolliciana, cordata, obtusissima, submarginata, laniis, subtus pubescenti. Peduncululi axillares, solitarii, uniflori, longitudine folii velloji. Corolla pollicaris angustissima: Labrum pubulatum elongatum.

W. A. Phillips



glauca Anstolobium

Habitat herb. Desfont.

Caulis scandens, glaber utriusque planta. Folia petiolata, sesqui pollicaria, cordata, obtusa  
juniora mucronata, venosa, glauca. Pedunculi axillares, sesqui pollicares, solitarii uni  
flori. Corolla sesqui pollicaris, apertum obliqua, labio orato.

*Trifida Aristolochia*

Habitat in America herb. Guaf.

Caulis striatus, angulatus, glaber. Folia tripollicaria, tri-loba: lobi oblongi, obtusi interme-  
dio longiore, 5que nervia, supra glabra, obsolete venosa, lœvia, subtus pallida, oculis ar-  
mato villosa, venosa reticulata, basi non cordata. Stylus cordato, semipollicaris. Petal-  
pollicaris. Pedunculi unilini, petiolo longiores. Corolla tripollicaris, basi vesiculosa am-  
pliata, nervosa: labium cordatum in subulam 3 pollicarem attenuatum.



pontica Aristolochia

Aristolochia orientalis, humilis, amplissimo folio Tournef. Cor. 9

Aristolochia pontica, foliis cordato subrotundis; caule herbaceo, flexuoso; floribus incurvis / sal  
ringentibus La Marti Diction: 1. pag. 255

Habitat in oriente herb. Turc.

Caule herbaceo, flexuoso. Folia palmata cordata, ovata, obtusa, venosa.

pellata A. foliis venis fornicibus subpellatis. Caule volubili Lin. l. V. p. 224.

Facq. her. g. Tab. 4. Plant. Am. pag. 300 +

Antipholochia apan folio umbilicato longissimo, radice repente. Plum.  
her. s. 42. 32. fig. 2.

Habitat in America meridionali montis fruticosi herb. Guis.

Caule teres. Petiolus brevis. Pedunculi solitarii uniflori. Flores tri-  
pollidares hexadri basi ventricosa labium longissimum ciliis  
superius extus unicum purpureo variegatum apice dilatatum jilii  
hemisphaerico hirsutum: Capsula vix pollicaris fuscescens facq. l. c.

Caule glaber striatus. Folia pollicaria obtusissima emarginata, obtuse  
ternis fere venoso, subtus glaucescentia, pinn. lato profundo. Longitudine  
Petioli fere folii. Pedunculi axillares, uniflori. Corolla sesquipolli-  
cari purpureo maculatus. Tubus corollae peno cygneo infero annulatus  
apice in lamina oblonga explanata.  
Specimen vidi quoque folio lanceato pedunculo bifloro



amara Abuta foliis cordatis trinerviatis glabris

Abuta amara foliis levi, cordiformi, ligno flavesciente Aubl.

Se. Gu: pag. 620. tab. 251.

Abuta in Guiana  
Rutem volubili

petioli glabri striati. Folia cordata integerrima acuminata  
trinervata, venosa, utrinque glabra, palmata, pubes  
flavescens

Anistolochia foliosissima Richard

Hec abuta Anistolochia species est, Abuta vera autem longe  
diversa planta unde parva brava desumitur minima e  
Cassamp: par. brava ten Rich.

bilobata Aristolochia foliis bilobis caule volubili Lin. L. V. p. 223. Jacq. Mesp. austr. 2. p. 346. +

Aristolochia longa scandens, foliis semi equini facie Plum. Amer. 91. Tab. 106. Raj. suppl. 395.

Habitat in Dominica.

Caulis teres filiformis. Folia per glabris folia petiolata, sesqui pollicari. Profunda lobata lobis oblongo linearibus oblongis obtusis acuminatis glabris subtus glaucis sulcatis vasis petiolis filiformis pollicari. Cuschi axillari. Pedunculi axillares foliis longiores.

~~Handwritten scribble~~



Trilobata A. foliis trilobis <sup>lobis subaequalibus</sup> stipulis cordatis floribus pedunculo longioribus  
~~caule volubili~~

Anstolochia foliis lederates tripidis, maximo flore radice repente

Plum. spec: 5.

Anstolochia scandens, foliis sublobatis obtusis, floribus amplissimis

Brown. Jam. 328.

Anstolochia trilobata: foliis trilobis caule volubili, floribus  
maximo Lin. S. V. p. 223. Jacq. spec: 0.13.

Habitatio amena meridionali.

Tota glabra caulis angulatus purpurascens volubilis. Eolia  
petiolata lobi oblongi vix obtusissimi, intermediis  
reliquis vix longior. Stipulae axillares unguiculatae. Pedun-  
culi solitarii bipollicares flores triplo fere longiores <sup>labii</sup>  
basi ventricosi. Labio lineari tubo corollae fere longior  
caulis aromaticus. Cortex ius serpentum Barrere

Labrum etiam etiam fistulans in figura Jacq. quamvis lineam  
bipollicarem Richard

pentandru. A. foliis cordatis sublobis intermedio productione, bractea cordata  
floribus pedunculis brevioribus +

*Anisotolochia floribus pentandris* Gaeg. Am. 30. V. 147. Plant

*Anisotolochia foliis cordatis hastato-sublobis, caule volubili, bractea  
cordata amplexante* Lin. N. V. p. 323. Plant. amer. p. 301

Habitat in America, subhastata basi sine profundo  
glabra. Caulis volubilis. Folia obtusifolia. Flores solitarii  
bractea cordata ad basin floris in 8 flores pentandri



maxima A. foliis oblongis acuminatis, caule volubili, pedunculis fruticosis  
ni Lin. S. V. p. 224 & Gaigu. Amer. 30. Tab. 146. Plant. Amer. pag. 301 &  
Anisolochea foliis oblongo-ovatis obtusis integerrimis caule scandente,  
floribus terminalibus, fructibus setis angularibus maximis Mill. Dict.

Habitat in nova Hispania

Caulis basi suberosus ceterum teretes. Folia acuminata nitida subtus  
reticulate venosa, saepe pedale. Pedunculi axillares solitarii,  
saepe biflori, rarius 1. sive 4 niflori. bractea lanceolata ad  
sin basin singuli floris. Flores atropurpurei maximi. Labello simplici  
ovato. <sup>maximum referens</sup> Fructus maximus omnium, setis <sup>duplex</sup> valvis cohaerens  
basi dehiscens etiam pedunculo, commode complicandus, totus  
interdextus filis transversis Gaigu. Lin. l. l.

nigra  
grandiflora

Anisotheca

Anisotheca foliis cordatis, caule volubili subherbaceo, pedunculis  
foliatis: Labio corollae maximo, cauda longissima. Sw prod. pag  
pag 126

Speciosissimam plantam in Jamaica legit Dr von Rohr.

Caulis teres volubilis, glaber.

Folia petiolata, tri-pollicaria vel ultra, lato-cordata, glabra  
subtus glauca, venis reticulata, quinque nervia

Petiolus sesqui-pollicaris. Stipula magna, pollicares axillares,  
in aliis structura foliorum caulis, duplicato in aliis flori-  
feris, inferior duplo major.

Corolla maximo hujus generis, frithameo, extus purpureo venis  
reticulata, intus maculata. Venter obovatus, bi-pollicaris  
sesqui-unicam latus. Tubus erectus sesqui-pollicaris, superne  
dilatatatus. Labiū palmare, spatulatum. Cauda dodran-  
talis, lanciolata, obtusa.



obtusifolius Dolichos volubilis leguminibus racemosis coma presis pilosiusculis suffor  
10-11 mibus, foliis ovali-subrotundis glabris

Habitat in ~~India~~ Cambis.

<sup>glaber cynosu</sup>  
Caulis superne angulatus

emarginata <sup>petiolulata, palmata</sup>  
Tolera petiolata, ternata foliola ovalia terminale subrotundum  
latitudine et longi integra venosa utraque glabra  
rudine aequali Petiolus foliolis parum longior glaber vix pilosus: petioluli  
purpurascens pilos.

Racemus axillaris foliis <sup>semipedalis</sup> stans seu remote tuber  
culatus superne purpurascens. tubercula magnitudine fore seminis Comandi

Floris 2-3 singulo tuberculo insidentes brevis sione pedicellati  
bractea duo subrotunda aduerso ad basi floris

Calyx campanulatus <sup>glaber</sup> lacinia superior rotundata reliquis major  
inferior ovati

Corolla magna purpurea

Legumina tri polliciana utraque latitudine unguiculata utraque  
obliqua acuta, pilis minutissimis adpresis.

cum legumina <sup>non</sup> calycis ad ala basi hinc villosa  
ab altero immo videtur differre cupo folia descripta desit

bilabiata<sup>a</sup> foliis ovato-oblongis trinerviis, caule volubili, corollis bilabatis  
lin. S. V. pag. 224 +

*Aristolochia scandens*, foliis oblongis, radice repente Plum. spec. 5.  
42. 32. fig. 1.

Habitat in America

Folia trinervia



Aristolochia

Aristolochia grandiflora Symb. bot: 2. pag. Tab. 47. Specie differt  
ab Aristol. grandiflora Sw: Inveniente ipso vno bel: uti et In vno  
roho deletur igitur nomen et sub sequenti restituetur:

nigens Aristolochia foliis cordatis, pedunculis solitariis; corollis bila  
biatis: Calice inferiore lancolato, superiore spatulato

~~Aristolochia~~  
etc.

Loco caudae in descriptione corollae lege: Calicem inferius Dodran  
tale, lancolatum, obtusum.

Venerum ~~Adiantum~~

~~Species Veridicalis supra linea exaratus fusio neyricani nati  
Duo lavi & lacer infra frondei pedale~~

~~Folia petiolata, alterna cincta 10 cum terminali foliolo  
inferiora bipinnata pennis infimis ternatis 5 que suprema  
pinnata foliolo pinnulo basi acuta superne incisae latius  
subdentatae subtilissime serratis pollicares interiores mi  
nores petioli filiformes ultimi capillares pinnulae  
interdum bipollicares~~

1821<sup>2</sup> foliis minoribus 2 73 foliis majoribus

323. 324



erecta a foliis lanceolatis sessilibus subhispidis caule erecto, pedunculis solita  
ris unifloris, floribus longispermis Mill. Dict. 12. †

Habitat in vera Oruce

Planta glabra versus apicem pilosa. Folia la inferiora angustio  
ra. <sup>folium</sup> lanceolatum glabrum in medio pedunculi. Peduncul  
us <sup>semi</sup> pollicaris pilosus sub corolla <sup>corolla et</sup> incrasata, <sup>extus</sup> pilosa.

maurorum A foliis hastatis integerrimis, caule infero simplic: floribus  
solitariis recurvatis Lin. S. V. pag. 224

*Anistolochia Rhaphis* & *Rumeyi* Rauw. d. 121. t. 23.

*Anistolochia peregrina* Rauwolfii Clus. hist. 2. p. 71.

*Anistolochia maurorum* Bauh. Pin. 307.

*Anistolochia longa*, foliis angustis acuminatis Monf. hist. 3.  
p. 510. f. 12. t. 17. fig. 11.

Habitat circa Halepium 7 herb. Rauwolfii.

Caules inferne tenues, superius superius empositi debiles, flexuosi, glabri  
superne foliosi. Folia inferna petiolata reliqua sessilia, pollicina  
lineari lanceolata, utrinque auriculo oblongo acuta, basi angustate  
obtusae. Pedunculi ex axillis inferis plus longior. Corolla lobis  
cordato reniforme, acuminibus obtusis



arborescens A. foliis cordato-lanceolatis, caule erecto fruticoso Lin. l. V. pag.

824. +

~~Anipholochia polyrhizos, auriculatis foliis virginiana Pluck~~

~~slm. 50 t. 70 fig. 1.?~~

Habitat in America

non vid.

caissata A. foliis cordatis acuminatis <sup>obtusis</sup> triplicinerviis, caule solubili. Lin. Spec.  
pag. 1362. & L.V. p. 824. Jacq. Amer. 30. t. 145. Pl. Am. frag. 300t  
Anisotrochia scandens, florum flabellis maximis variegatis in appen-  
dicem longam tenuem deficientibus Brown. jam. 329. Ubi basos pbi  
Habitat in America t  
Caulis teres glaber. Folia obtusa v. p. emarginata glabra. Pedun-  
culi uniflori solitarii. Labio basi explanato in caudam pto-  
ream superam apice crassiusculam deflexis.



obtusata a. foliis cordatis apice obtundatis trinerviis, subtus reticulato  
venosis tomentosis; caul. pedunculis solitariis Schw. prod. p. 126. +  
Anipholochia foliis cordatis obtusis Plum. Fr. 27. 1733.

Habitat in Canbois 2

forte non diversa a barbata Jacq. Richard

Symbol bot

oblongi

grandiflora A. foliis lato-cordatis, caule solubili sub-herbaceo, pe-  
dunculis solitariis, labio corollae maximo, cauda longissima  
Sw. prodr. pag. 126

non vidi



odoratissima A. foliis cordatis, labio corollae majore cordato  
Anstolochia scandens odoratissima, floris labello purpureo, semi-  
ne cordato Sloan bot. 1. p. 162. tab. 104. fig. 1.

Anstolochia scandens foliis cordatis acuminatis, florum fla-  
bellis amplis purpureis Brown. jam. 329?

Anstolochia foliis cordatis, caule volubili fruticoso, peduncu-  
lis solitariis, labio corollae majore Lin. l. V. pag. 824

Habitat in America

Tota glabra caulis volubilis. Tota parum acuminata acuta  
quingue nervia. Pedunculi solitarii uniflori longitudine  
foliorum. Corolla basi inflata obovata tubo angustas-  
sima. ~~Calyx~~ <sup>maximus</sup> um cordatum acutum tubo quadruplo longior  
stipula vix ulla

Siphon A. foliis cordatis petiolatis, floribus solitariis: limbo trifido aequali,  
bractea ovata, caule volubili fruticoso Hort. kew. 3. p. 311.

Aristolochia siphon: foliis cordatis caule volubili fruticoso, corol-  
li siphoniformibus trifidis

Habitat in America

Rami teretes laeves flexuosi. Folia magna 6 pollicina obtusa  
peltata villosa pallidiora, venosa. Pedunculi penduli, petiolo  
longior. Bractea interdum bina. Tubus siphoni formis, apice an-  
nata cylindrico. limbus pater cordato trifidus, laciniis rotundatis.

cordatis acutis Capsula cylindracea hexagona tripollicaris bractea v. resus basin  
petioli



anguinea A foliis cordatis acuminatis stipulis cordatis, labio corollae <sup>trior</sup> ~~subulato~~ ~~br~~  
Anastolochia mexicana, flore acutior Monf. h. 3 p. 569 f. 12 & 17 fig 7

Anastolochia anguinea foliis cordatis acuminatis, caule volubili  
fructuoso, pedunculis solitariis, stipulis cordatis. Lin. N. pag.  
Pl. 24. Gaer. Amer. 30. t. 144. Plant. Amer. 299.

Habitat in India occidentali  
Caulis <sup>volubilis et</sup> inferne <sup>et</sup> pubescens, superne leviter pubescens ad articulos  
hirsute densa flavescens. folia subius pallidiora, <sup>et anella</sup> ~~non~~ ~~pubescentia~~  
pubescentia. sesquipollicana subius pallidiora. Petiolus villosus  
proferit in versis folium. Stipula axillares cordato-subrotundo  
pubescentis. pedunculi solitarii longitudine fere foliorum  
villosi sicuti uti petioli et germen. Germen linear. basi tubi  
globosus magnitudine pisi. Tubus pollicari nervosus superne  
oblatatus labium longitudine tubi apice vix latior marginibus  
omni ventibus

Succus radicis Salvia mexicana 47 - 48 on serpentis infillatus,  
facit ut tuto tractetur, post aliquot horas ad se redit haecque  
folia interdum inferne obtusa

bracteata a foliis cordatis obtusis, caule erecto, pedunculis solitariis unifloris  
bracteatis bracteis cordatis petiolatis

A. bracteata foliis cordatis ~~obtusis~~, caule infirmo, floribus solita  
nis, bracteis cordatis petiolatis Retz. obs. Bot. <sup>foli.</sup> pag. 5: pag. 29

Habitat in agris et collibus solo argillaceo Madras O

Caulis flexuosus semipedalis glaber uti tota planta folia  
glauc<sup>a</sup> pollicem una supra venis simplicibus subtus subtenuatis. Bractea  
ad basin pedunculi labium corollae lineare obtusum tubulose  
grose

descriptio a viva facta addenda



*ovulifolia*  
*indica*

A. <sup>Reb</sup>foliis cordato-oblongis submarginatis, pedunculis multifloris  
Len. Flor. zeyl. n. 323. \*

Cabela vegon Rheed. Mal. P. p. 48. tab. 25.

*Aristolochia indica* foliis cordatis acutiusculis, caule volubili  
pedunculis multifloris Len. l. V. p. 224.

Habitat in India Orientali

Caulis <sup>volubilis</sup> striatus glaber uti tota planta. Folia interdum b. f. triplici  
cana saepius pollicana In nervia, venosa basi vix cordata

Pedunculi axilla res foliis breviores flores racemosi. Corolla  
pollicana globus basi magnitudine seminis coriandri labium  
lineare tubo latior et longior

~~Synonyma forte ad alteram~~

varietas  $\beta$ . distincta planta hoc est elongata can

<sup>India</sup>  
~~Canicola~~ A. foliis lanceolatis basi subrotundatis pedunculis confertis.

Habitat in India orientali

Affinis A. Indica differre videtur foliis angustis elongatis in acuminis, basi absque sinu sed potius in petiolorum depresso petiolum filiformis  
vix pollicem lata

haec indica est fide herb. hermanni



boetica A. foliis cordatis obtusis pedunculis multifloris subternis

*Anisolocheia Lemaitis boetica* C. Lef. hist. 2. p. 71.

*Anisolocheia Lemaitis propens* Bauh. pin. 307. Monf. h. 3. p. 509.  
f. 12. tab. 17. fig. 6.

*Anisolocheia boetica* foliis cordatis acutiusculis, caule volubili  
pedunculis subternis petiolo longioribus Ser. l. V. p. 824.

Habitat in Hispania, Creta &

Tota glabra, volubili. Cola exquisita cordata subtus reticula.  
ter emarginata polliciana vel ultra. Sepala ovato-  
bea mucronata. Corolla ut polliciana labio cordato lan-  
cato longitudo tubi insertam longitudine labii papinae

sempervivens A. foliis cordato oblongis acuminatis caule infermo, floribus  
solitariis <sup>curvis</sup>. Lin. s. V. p. 224

*Piptolochia altera* Clus. hist. 2. 260

*Piptolochia cretica* Clus. Bauh. Pin. 307. Monf. hist. 3. p. 510  
f. 12 t. 17. fig. 16.

Habitat in Creta f.

Caules angulati glabrius. tota planta. a *Pipt.* differt foliis  
subtus ~~non~~ reticulatis utriusque venosis obscure undulatis  
longius acuminatis labio corollae oblique truncato



Innucata A. foliis cordatis obtusis, <sup>lobatis</sup> pedunculis flombus solitariis rectis oblique  
Innucatis

Habitat 7

Habitat A. Longa ad sempervirens ab A. sempervirente dignoscitur  
foliis duplo longior latioribus exquisite cordatis obtusissimi nec  
in acumine elongatis, acuto tubo corollae recto vel falcato  
Corolla purpurea. cernuntur glabra Tubus superne de  
latus fere absque labio

Serpentaria A. foliis cordato oblongis <sup>planis</sup> cauleque flexuoso herpato floribus solita  
nis subradicalibus

Aristolochia Polytrichos virginiana, fructu parvo pentangulati  
mon. hist. 3. p. 510 f. 12. t. 17. fig. 14

Aristolochia pistolochia f. Serpentaria virginiana caule nodoso  
Pluk. alm 50. t. 148. fig. 5. Catesby carol. 1. p. 29. t. 29.

Aristolochia serpentaria. foliis cordato oblongis planis, cau-  
libus inferius flexuosis heretibus, floribus solitariis. Lin.  
L.V. pag. 824.

Habita in Virginia

Caulis semipedalis adgenicula valde <sup>nodosa</sup> pulchra, simplex herpato  
uti omnia. cœlia petiolata tenera venosa, haud tamen  
reticulata. Germen pedunculati inferius ad basin caulis.  
Germen herpatisimum. venter oblongus. Limbus orbiculi  
latus explanatus

aliam tota glabra ex America ppt. cum diversa



*Asipholochia* A foliis cordatis crenulatis acutis, subtus reticulatis petiolatis, floribus  
subsolitariis (solitar. long) in LV. pag. 224.

*Pistolochia* Clus. hist. 2. p. 72. Dod. pempt. 525.

*Asipholochia pistolochia* dicta Bauh. pin. 307.

Habitat in Hispania. q. Narbonensi &

Caulis angulatus flexuosus glaber. superne vix villosus. <sup>collicaria</sup> ~~folia brevissime~~  
petiolata, rigidiuscula <sup>saeva interdum obtusa</sup> margine undulato crenato supra arena  
lavia, subtus pulchre reticulata. Flores 1. femi interdum 2. 2. in axillis  
pedunculato cum folio cordato ad basin. Corolla pollicaris folio  
longior labio incurvo lanceolato

rotunda  
Caaga A.

Folius cordatis subsessilibus obtusis caule inferno floribus solitariis

Lin. S. V. pag. 825. Spec. pl. p. 1364

Anistolochia Cam. epist. 419

2 Anistolochia rotunda flore ex purpureo nigra Bauh. Pin. 307

1 Anistolochia rotunda. Clus. hist. 2. p. 70.

13. Anistolochia rotunda flore ex albo purpurascante Bauh. Pin. 307.

Habitat in Italia, Hispania, Gallia Narbonensi &

Caules stratus glaber uti reliqua planta. <sup>anysphatui</sup> Folia bipollucaria  
exacte cordata subnervia tenera. Pedunculus brevis. Flores

pollucares labio oblongo incurvo

13. Differt foliis petiolatis an diversa

Planta a Barnadesis data foliis sub nomine



Longa A. foliis cordatis petiolatis integerrimis obtusifiusculis, caule infer-  
mo floribus solitariis Lin. S. V. pag. 825

*Anistolochia longa* L. Clus. hist. 2. p. 70

*Anistolochia longa* vera Bauh. Pin. 307. Mill. Dict.

Habitat in Italia, Gallia &

β. *Anistolochia longa* hispanica H. Clus. hist. 2. p. 71.

Habitat in Hispania, Italia, Gallia &

affinis rotunda folia firmiora labium viride in a folia  
emarginata Corolla foliis longioris labio lanceolato

Folia emarginata. Pedunculi ex longitudine petioli. labium lanceola  
Linn. herb. Mus.

varietatem. hucusque a S. Barnades foliis cordato oblongis obtusifimis  
emarginatis fructu oblongo pollicari

specimen a Desfont. lectum in Barbani vidi Corolla bipollicari

rotunda A.





barbata Aristolochia

Aristolochia barbata Jacq. Coll. 3. p. 221.

Habitat circa Casalus

Caulis plures fruticosi inferne pubescenti volubiles 6 pedales. Rami  
numerosi teretes. Hypanthium nullum. Folia petiolata cordata  
obtusata integerrima subtus pallida venisque reticulata 2-3 ped  
licaria. Peduncululi axillares, solitarii, 1 flori longitudine  
petiolorum. Flores bipollinicos. pars inferior tubi inflata  
subrotunda lobis patentibus, e cuspe ore inferiore appendice  
obovata <sup>densa barbata</sup> corolla paucifloris maculata. tota glabra Jacq.

non vidi



*Clematis A.* foliis cordatis caule erecto, floribus axillaribus confertis linc

S. V. p. 025

*Aristolochia rotunda* Duchf. hist. 40

*Aristolochia clematis vulgaris* Clus. hist. 2. p. 71.

*Aristolochia clematis recta* Bauh. pin. 307.

Habitat in Austria, Gallia, Tartaria &

Caulis sulcatus gl. angulatus flexuosus uti tota planta glabra  
Folia exquisite cordata. Pedunculi b. o. breves. Fructus oblon-  
gus cornuus - subglobosus