

# Artemisia

## + fruticosa erecta

1. sermiculata A. foliis acrophi confectis minimis, panicula racemosa, floribus sesplibus
2. judaica A. foliis obovatis obtusi lobatis parvis, floribus paniculatis pedicellatis
3. mucronata A. glabra, foliis palmatis rigidis minutis mucronatis, floribus racemosi nutan-  
tibus
4. theophrasta A. foliis palmatis linearibus minutis <sup>palmatis</sup> finis, floribus racemosi pedunculatis
5. contra A. foliis linearibus <sup>palmatis</sup> minutis, panicula racemosa, floribus sesplibus
6. rigida A. foliis pinnatis minutis tomentosis, floribus sesplibus
7. abrotanum A. foliis fetideis samosis finis glabris
8. paniculata foliis caulibus pennatis, ramis simplicibus filiformibus glabris, floribus glo-  
bosis nutantibus villosis
9. chamaemeli foliis A. foliis pennatis glabris, floribus globosis nutantibus glabris
10. santonica A. foliis caulibus linearibus pennato-multifidis, ramis indivisis, pinnis se-  
cundis reflexis, calycibus quinquefloris
11. argentea A. foliis bipinnatis pedis seneciis cordatis: foliolis lanceolatis, floribus globosis, ramu-  
lis floriferis rugatis
12. arborescens A. foliis compositis multifidis linearibus cano-tomentosis, floribus subglobosis

xx procumbentes ante florificationem

13. campestris A. foliis multifidis linearibus, caulebus procumbentibus virgatis
- 14 glutinosa A. foliis inferioribus pennatis superioribus tripartitis glabris, floribus sessilibus  
glutinosis
- 15 entheimifolia A. foliis compositis divaricatis linearibus carnosis glabris, caule ascendente,  
racemo composito.
16. composita A. foliis bipinnatis subcarinatis, racemis paniculatis diffusis racemulis aggregatis
17. palustris A. foliis pennatis filiformibus, floribus glomeratis sessilibus
18. maritima A. foliis multipartitis, racemis ternis, flospulis foemineis ternis
19. glacialis A. foliis palmatis multifidis sericeis, caulebus ascendentibus, floribus fastigiatis  
subglomeratis
20. nivalis A. foliis pennatis caulebus ascendentibus, floribus globosis solitariis ternis  
foliis calycinis cinereis
21. norvegica A. foliis radicalibus bipinnatis, pedunculis hispulis semis floribus globosis, solitariis  
calycinis ovatis
22. fenicea A. foliis petiolatis palmatis lenicis, floribus approximatis sessilibus reflexis,  
calycibus tomentosis hispidis
23. valespica A. incana, foliis pennatis multifidis filiformibus, floribus subsessilibus  
cylindricis
24. Boicome A. foliis fenicis: radicalibus petiolatis palmatis: caulinis sessilibus pennatis  
floribus sessilibus confertis
25. spicata A. foliis radicalibus biterminatis, caule ascendente spicato, floribus cretis

144 arbores herbaceo foliis compositis

- 26. pontica A. foliis pennatis subtus tomentosis, floribus subrotundis nutantibus, receptaculo nudo
- 27. austriaca A. incana, foliis pennatis utrinque tomentosis, calycibus oblongis
- 28. annua A. foliis triplicato-pinnatis utrinque glabris, floribus subglobosis nutantibus: receptaculo glabro conico
- 29. lobelia A. foliis glabris inferioribus bipinnatis, superioribus pennatis, floribus globosis nutantibus receptaculi convexi glabris
- 30. millefoliata A. foliis bipinnatis subtus tomentosis nitidis: pinnis transversis, ramis simplicibus
- 31. tanacetifolia A. foliis subbipinnatis utrinque glabris, floribus subglobosis erectis sessilibus
- 32. absinthium A. foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis, receptaculo villosis
- 33. vulgare A. foliis pinnatifidis planis incisus subtus tomentosis, ramis simplicibus recurvatis, floribus radiis quinque floro
- 34. pedinata A. foliis pinnatis glabris, floribus axillaribus sessilibus  
 \* \* \* \* \* foliis simplicibus
- 35. capillaris A. fruticosus, foliis simplicibus capillariis
- 36. integrifolia A. foliis lanceolatis subtus tomentosis integerrimis dentatisque, flospulis foemineis quinque

37. Coenulifera A. foliis caulinis integris: radicalibus multifidis, flosculis perennibus Vernis
38. Draconculus A. foliis in femis trifidis superioribus lanceolatis integerrimis glabris
39. japonica A. foliis glabris: ramis lanceolatis integris caulibus apice unis, caule unigato
40. chinensis A. foliis cuneiformibus integris trilobis ve tomentosis
41. mederapratana A. foliis lyrato sinuatis, caulibus procumbentibus, floribus pedunculatis solitariis globosis oppositifolius
42. tridentata A. foliis cuneiformibus tridentatis, floribus axillaribus solitariis sessilibus
43. minima A. foliis cuneiformibus repandis, caule procumbente floribus axillaribus sessilibus

1. *vermiculata* Artemisia frutescens, foliis aërophi confertis minimis panicula racemosa, floribus  
sessilibus Lin. Mant. 281. \* S.V. pag. 743.

Abinthium africanum arborescens foliis vermiculato incano Tournef. F. R. II. 358.  
Habitat ad C. b. p. 4.

Stem erectus, rigidus, subcinereus, paniculatus. Folia linearia, minutissima,  
supra tomentosa plana, subtus convexiuscula, nuda. Panicula copiosissima e  
racemi. Racemi e spiculis sessilibus, ovatis, imbricatis. & lobis tomentosis  
in quibus squama inferior nuda est. Lin. M. L. C.

2 judaica Artemisia fruticosa foliis obovatis obtusis lobatis parvis, floribus paniculatis pedicellatis  
L. mant. III. 281. Pl. pag. 743

Abinthum pantonicum, Scheba Arabum unde semem Cambriorum colligitur Rauw.

Abinthum pantonicum judaicum Bauh. pin. 139.

Abinthum halajense tenuifolium grati odore, coma delicatesiore Pluk. alm. 4 tab. 73. fig. 2.

Artemisia tota cinerea Gronov. Onent. 259.

+ Habitat in Tridosa, Arabia, Numidia

Caulis suffruticosus, sesquipedalis paniculatus, subtomentosus, cinereus in anu. Folia  
<sup>confertio</sup> obovata 3 f. stoba, obtusa, plana, tomentosa, viciana, menata, laciniis media latior.

Panicula racemosa: racemi ultimis pedunculatis et pedicellatis. Flores subrotundi  
depressi, fulvi, magnitudine seminis Corandri h. l. c.

+ Schiach foliis pinnato-divisis, tomentosis, fragrantibus Eoshr. descr. pag. 198

43 mucronata Artemisia glabra, foliis <sup>palmatis</sup> inferioribus rigidis minutis mucronatis, inferioribus palmatis  
superioribus indivisis, floribus racemosis nutantibus

Habitat in Arabia Tostri. 5

Eructuosa, erecta, ramosa, tota glabra. Folia exsiccatione nigra, inferiora petiolata  
<sup>laciniata</sup> palmata, superiora sessilia acuta tripartita. Lacinio apice reflexo. rudimenta ramu-  
lorum minuta ex omnibus fere axillis hinc folia quasi fasciculata. Radicem in a. Flores  
axillares, globosi

4 *Othropeia* *Artemisia* *Indica* foliis palmatis linearibus minutissimis, floribus racemosis pedan-  
culatis mant 202. \* Pl. V. pag. 743

*Abrotanoides* *africanum*, foliis cinereis muscosis, capitulis florum globosis magnis  
Raii suppl. 232.

*Artemisia* *folia* *Othropeia* foliis <sup>linearibus</sup> confertis minimis divisis, caule fruticoso tomentoso  
Lin spec. pag. 1184 \*

Habitat in Africa

Frutex pedalis ramosus albus, obsolete sive tomentosus, paniculatus. Folia  
minuta lineis, conferta, subtomentosa: laciniis linearibus angustissimis. Flores  
racemosi, pedunculati, neutrius, subglobosi, magnitudine Art. Absint. Recep-  
taculum medium lin. 6 c.



5 contra Artemisia fruticosa foliis palmatis linearibus minutis, panicula racemosa, floribus sessilibus  
Mart. 202. \* S.V. pag. 743

+ ~~Artemisia Herba alba fruticosa, floribus solitariis <sup>pub</sup> sessilibus, bracteatis, flosculis omnibus  
hermaphroditis & Dr. Amoy. 010. Tab. D. f. 1. \*~~

Habitat in Persia, Hispania.

+ ~~Artemisia mai tenuifolia latifolia Hispanica, polypermon Barret. 7. 447.~~

Stem paniculatus erectus tomentosus; albus, ramis magis tomentosis. Folia linearia, saepe conferta  
minutis serris, obtusiuscula tomentosa, ceterum in caule nuda. Panicula e ramis simplicibus  
simplicibus: ramis infidentibus & alternatim fraxo, ovato minimo, e minoribus flori-  
bus umbriato, minutis tomentosa. An. l. c.

Planta Hispanica differt quod flores remotos solitarii tomentosi tamen eodem fere modo habet.  
Linn.

- origida Artemisia foliis fruticosa, foliis pennatis minutis tomentosis, floribus sessilibus  
Abrotanum mai tenuifolium latifolium Hispanicum polyspermum Barrel. Ic: 447  
Artemisia herba alba fruticosa, floribus solitariis subsessilibus, bracteatis flosculis  
omnibus hermaphroditis Flor. Ariz. p. 10. Tab. P. fig. 1. \*
- Artemisia hispanica caulibus suffruticosis incanis, foliis minutis apice palmato divi-  
sis receptaculo flosculorum nudo La Mart. Enc. Art. 11. Plantam La Mart. m. p.  
Artemisia aragonensis suffruticosa, ramoso paniculatus, floribus solitariis  
alternis subsessilibus La Mart. Enc. art. 38.

Habitat in Castilia nova, Aragonia &

Planta ab ~~Art~~ Art. 12 p. Halleri diversa, accedit quam maxime ad eandem cum  
sua videt. quod folia pennata nil impedit, superne enim pinnae ita approximantur, ut folia  
palmata fiant, cum vero in aliis videtur differre <sup>separabili</sup> ~~differe~~ ~~differe~~ ~~differe~~ usque dum  
videt alius docet

7 Abrotanum Artemisia foliis fetacis ramosis semis glabris L.S.V. pag. 743.

Abrotanum mas Brunf. Dodon. pempt. 21.

Abrotanum mas angustifolium majus Bauh. Pin. 136

Habitat in Syria, Galatia, Cappadocia, Italia, Mompelia montibus  
apud 5.

glaber. Caulis fruticosus erectus quadripedalis <sup>caetero, spontaneo pedalis Rari</sup> teres <sup>caetero 46</sup> striatus ramosus vis-  
gatus. Folia bi-3 pollicaria multoties divisi; laciniis linearibus <sup>in supremis</sup>  
capellanibus. Racemuli ex axillis. Flores nutantes parvi.

floribus simplicibus, nutantibus, glabris.

♁ paniculata Artemisia foliis caulinis pennatis: ramis simplicibus filiformibus glabris, floribus globosis  
natis et ibi villosis

Habitat in Sibiria 7

Caulis frutescens erectus paniculatus striatus apice ramis <sup>superne</sup> apice canis. Folia glabra  
caulina pennata, ramorum simplicia filiformia pollicaria. Racemi axillares 3-4 flori natis. Flores globosi. Calyx pubescens subincurvus

4 Chamomelisolia Artemisia foliis pennatis glabris floribus globosis nutantibus glabris

Abrotanum <sup>originale</sup> Chamomelisoliae Tournef. Cor. 34.

Artemisia chamomelisolia suffruticosus erectus; foliis viridibus subsessilibus, tenuissime  
divisis; floribus globosis La Mart. Enc. Bot. 22.

Habitat in Oriente;

Caulis suffruticosus, erectus; sulcatus - angulatus, ramosus. Rami elongati. Folia  
capellaria, pennata foliolis pinnis integerrimis. Racemuli pauci flori  
3-4. floribus remotis, nutantibus globosis glabris.

*Sanctonica artemisa* foliis caulibus linearibus pinnato-multifidis, ramis indivisis, fructibus  
secundis reflexis, floribus quinque floris L. Sp. pl. pag. 1185 \* L. V. p. 743.

β ~~Abinthium plantaginifolium vulgare Lob. Obf.~~  
~~Abinthium Santonicum gallicum Bauh. Pin. 139. Camer. Epit. 457.~~

Semen sanctum Lob. Ic. 756.

*Artemisa fruticososa* incana ramosis spina, corymbis sessilibus fructibus subrotundis,  
foliis superioribus linearibus brevissimis obtusiusculis Gmel. Sib. 2. p. 115. tab.

β <sup>51</sup> *Abinthium Santonicum vulgare* Lob. Obf.

*Abinthium Santonicum gallicum* Bauh. Pin. 139. Camer. Epit. 457

Habitat in Tatania, Persia

Habitus campestris pedunculata. Caulis paniculatus subincurvus. Folia inferiora  
pinnato-multifida, linearia canescentia. Rami virgati: Racemis: fructibus al-  
ternis, secundis recurvatis: Pedicellis adpressis foliis linearibus, obtusiusculis  
recurvis. Flores solitarii, cylindrici; in planta fructificante omnes caules erecti,  
tum amplexu incanum colorum. Folia in ramis minima, linearia indivisa.  
Receptaculum nudum. L. Sp. l. c.

— canescens

argentea A. fruticosa, foliis bipinnatifidis pinnis candidis - folioli lanceolatis, flori-  
bus globosis, ramulis floriferis crispatis Hort. kew. 3. p. 170

Habitat.

Tota tomentosa argentea. Rami angulati. Toler petiolata  
caez pinnatifida lacinus linearis lanceolatis infidii superioribus  
integris superioribus infidii. Stipes distantes pedicellati solitarii  
vel gemini nutantes magnitudine aedem pedicellati.

artorefiens Artemisia foliis compositis multifidis linearibus ~~sericeis~~ <sup>canis</sup> tomentosis, floribus subzelo  
bosis

Abrotanum semina artorefiens Dod.

Abinthium artorefiens Sol. ii: 753.

Abrotanum latifolium artorefiens Bauh. Pin. 136

Habitat in Italia, Barbaria <sup>Orientat</sup> <sup>atque</sup> <sup>superiore</sup> tantummodo caule frutescente. laciniis foliorum <sup>angustioribus</sup>

Faciis omnino ~~Art. vallyana~~. <sup>capite vegetat</sup> Caulis frutescens 3-4 pedalis ramosus, striato angulatus  
foliis multifida laciniis <sup>negatis</sup> <sup>magis</sup> canis tomentosis uti tota planta. Panicula <sup>capite vegetat</sup> ter raris <sup>vermiculata</sup>  
lineamentis obtusis <sup>magis</sup> foliola calycina duplici serie margine <sup>sericea</sup> <sup>opacata</sup> <sup>receptaculum</sup>  
villosum. Flores nitentes.

Artemisia ~~factorefiens~~ <sup>multifida</sup> fruticosa foliis <sup>tripartitis</sup> <sup>pedis</sup> <sup>sericeis</sup> <sup>cineris</sup>. foliolis linearibus, floribus globosis, ramuli floriferi simplicibus Hort. kew. 3. p. 169



12 *Campestris Artemisa foliis multifidis linearibus, caulis procumbentibus virgatis. L.V.*  
pag. 743. Gmel. lib. 2. p. 117.

*Abrotanum sylvestre* vel 4. Tragi

*Ambrosia tenuifolia* Cob.

*Artemisa tenuifolia* Clus.

*Abrotanum campestris* Tabern. Bauh. Pin. 136

Habitat in Europa campis apertis, arvis &

Caules purpurascens, teretes, glabri ramosi virgati. Folia glabra pollicaria  
Racemi termina suprema indivisa. Calycis glaberrimi globosi, folioli margine serrati  
les ramati  
impleti, et flores pubescentes

an flores lesiles

13 <sup>rubro</sup> glutinosa Artemisia foliis inferioribus pinnatis, caulis superioribus tripartitis glabris, floribus  
lespilibus glutinosis

Abinthuma santonicum gallicum Bauh Pin. 139. forte huc pertinet.

Artemisia palmata foliis simpliciter pinnatis, tenuiter discatis laciniis aliquot  
bifidis, subpalmatis floribus erectis

Habitat in Castelia nova et Amazonia.

Cauli procumbenti rugatus, striatus, glaber superne cum floribus glutinosus.

Rami filiformes. Folia inferiora pinnata, superiora tripartita summa sim-  
plicia; laciniis filiformes, glabra, integerrimo. Flores spiculi, in axillares  
erecti, parvi, in ramis remoti usculis in ramulis confertis.

Habitus artem. campestris

14 *Cnitha micifolia* Artemisia foliis compositis, divaricatis linearibus carnosis glabris, caule aspen-  
sente, paniculata racemo composito. (naniculato lra)

*Abrotanum inodorum*, foliis cnithae lucida obscure virentibus Monf. h. 3. p. 11. Rar.  
Suppl. 232.

*Abrotanum Hispanicum maritimum*, foliis crasso splendente et rigido Tour-  
t. h. H. 459.

Habitat in Lusitania littonibus arenosis.

Habitus Art. campestris glaber, Caulis ascendens pedalis, simplex perennans.

Folia pinnata carnosae, pinnis trifidis linearibus obtusis. Racemus terminalis  
caesadem compositus ex racemulis simplicibus 3-4 floris. folia floralia integra  
linearia. Calycis subrotundi majores quam in campestri. Receptaculum nudum



16 palustris Artemisia foliis pennatis filiformibus, floribus glomeratis sessilibus  
Absinthium capulla eius foliis, flexilibus aureis densissime congestis. Amm. rath.

197  
Artemisia herbaica foliis multifidis linearibus, Comybis in picea interrupta glomera-  
to sessilibus Gmel. Libr. 2. p. 119. t. 55.

+ Habitat in Libia. 4

glaber. Caulis <sup>pro</sup> stertatus, semipedalis basi <sup>dein ascendens</sup> decumbens, crassitie pennis columbaris  
<sup>simplicibus</sup> <sup>interdum</sup> <sup>in summo</sup> <sup>ramosis</sup> <sup>ramis</sup>. Pinnis foliis remota alterna pollicares et  
<sup>interdum</sup> <sup>ramis</sup> ultra, latiora in loco <sup>palustris</sup>. Flores in apice ramorum et caulis <sup>sub</sup> sessilibus  
conferti, globosi flavi. Receptaculum nudum Lin.

+ Artemisia palustris foliis linearibus pennatis integerrimis, floribus glomeratis  
sessilibus L. Sp. pl. 1185 \* L. V. p. 743.

17 *Antemissa* foliis <sup>multifidis</sup> <sup>(caulis partibus)</sup> pennatis tomentosis, racemis ternis flosculis feminis ternis. L.S.V.  
pag. 743.

*Abinthium* *Senphium* *Sodon.*

*Abinthium* *Senphium* *Belgicum* *Bauh. Pin. 139*

*Abinthium* ~~marinum~~ *f. Senphium* in *Belgiis* & *Angliis* *maritimes* *Cleff. h.*

+ *Abinthium* *maritimum* *Misnerf.*, *Senphium* *Belgicum* *fenelle* *Cleff. h.*

*Abinthium* *Senphium* *germanicum* *Bauh. Pin. 139.*

+ *Abinthium* *Senphium* *tenerifolium* *f. Bauh. da* *Abinth.*

*Abinthium* *Senphium* *Nationense* *Cleff. h.*

*Abinthium* *Senphium* *gallicum* *Bauh. Pin. 139*

+ *Antemissa* foliis compositis multifidis tomentosis, ramis floriferis natantibus *H. del. 112. \**

*Il. Vei. 734*

*Habitat* in *Europa* *Septentrionalis* *littoribus* *maris* *q.*

*tota* *Europae* *partibus*

*caulis* *decumbens* *pro* *pediculis* *tomentosis*. *colia* *pinnata*; *ramis* *multifidis* *linearibus* *lacinais*

*Racemi* *apice* *natantes*. *Floris* *brevissime* *pedicellati*. *Calycis* *base* *tomentosa* *in* *an-*  
*fuso* *nitido*. *Receptaculum* *nudum*