

Anum

+ acaulia, foliis compositis

1. *Dracontium* A. foliis pedatis: foliolis lanceolatis integerrimis, lamina ovata, spadice longior.
 2. *Dracontium* A. foliis pedatis: foliolis lanceolatis integerrimis, lamina lanceolata, spadice brevior.
 3. *venosum* A. foliis pedatis: foliolis subovatis integerrimis, lamina lanceolata, spadice ^{relativum} longior.
 4. *masi vorum* A. foliis pedatis: laciniis lateralibus involutis, spatula interne pelosa, spadice superne ramulata.
 5. *pentaphyllum* A. foliis quinatis.
 6. *Triphyllum* A. foliis ternatis, lamina lanceolato-acuminata, spadice longior.
 7. *atrorubens* A. foliis ternatis, lamina ovata, spadice dimidio brevior.
 8. *ternatum* A. foliis ternatis, receptaculo spatula longior.
- + acaulia, foliis simplicibus
9. *colocasia* A. foliis peltatis ovatis repandis: basi emarginatis.
 10. *esculentum* A. foliis peltatis ovatis integerrimis: basi emarginatis.

11. bicolor A. foliis peltatis sagittatis discis coloratis, spathe medio cuneata: basi subglobosa.

Camera subrotunda acuminiata erecta subinvoluta

12. macrostema foliis peltatis cordatis repandis: basi bipartitis

13. incrasatum A

14. peregrinum A. foliis cordatis obtusis mucronatis: angulis rotundatis

15. divaricatum A. foliis cordatis hastatis auriculis divariatis, spathe ovato-acuminiata apice revoluta

16. trilobatum A. foliis sagittato-trilobis, flore sepli

17. sagittifolium A. foliis sagittatis triangulis: angulis divariatis acutis

18. striatum A

¹⁸
19. maculatum A. foliis subhastatis, spathe clavata

20. virginicum A. foliis hastatis cordatis acutis: angulis obtusis

21. proboscideum A. foliis hastatis, spathe declinata glaberrima - subulata

22. anserinum A. foliis cordatis oblongis, spathe apertura ovata spathe ~~brevis~~

23. pictum A. foliis cordatis venis coloratis punctis

24. ovatum A. foliis ovato-oblongis, spathe ^{puberula} lobis

25. tenuifolium A. foliis lanceolatis, spathe ^{puberula} longiore

26. bellatum A. foliis lanceolatis petiolatis, spatula lanceolata tubulosa faucibus fornicato, radice ovato fornicato adnato
27. brevifolium A. foliis lanceolatis petiolatis subundulatis, spatula radiceque subulata ^{et aequali}
28. spicata A. foliis linear-lanceolatis, radice spatula brevior
29. ellipticum A. foliis lanceolato-ellipticis acuminatis, spatula ovato-lanceolata
30. ^{sa} canosifolium A. foliis lanceolatis avenis impunctatis

XXV caulepertia

31. arborea A. erectum, foliis sagittatis
32. sequenium A. suberectum, foliis lanceolato-ovatis
33. hederaceum A. radicans, foliis cordatis oblongis acuminatis, petiolis herbis
34. linguatum A. repens, foliis cordato-lanceolatis, petiolis marginato-membraceis
35. auritum A. radicans, foliis ternatis lateralibus unilobatis

^{alatum}
Lingulata Anem foliis cordato-ovatis, petioli ^{membranaceo-}marginatis
Anem scandens maximum, flore florescente Plum. spec. 4. ii: 37.

~~Anem lingulatum, foliis cordato-ovatis~~

Habitat in America meridionali

Folia saepe pedalia, glabra, subtus utroque nervi septem majoribus
extantibus.

Petioli foliis longior, spatii trijollion infra folium nudus, coetaneum utrinque membrana semipollicari auctus.

(a figura Sloanii ad Lingulatum ten: allata plene recedit foliis
cordatis nec oblongis, ala petioli infra petiolum incipiente nec
ad basin, ideoque diversam esse credo.

Dracontium

Habitat in India orientali Herb. Guj.

Petiole striati, crassitie pennae asperius. Folia semipedalia perianthifera, venosa
laciniis lanceolatis, infimo bifido, attenuata. Scapus petiolo parum crassior,
ut petioli et costa foliorum ^{subtus} spathaque inferna, adpressi aculei parvi, recti.
Spatha spathamisa lanceolata attenuata
eadem forte cum palmato Eran.

ternatum Anon

Habitat in Gasa herb. Fusf.

affinis triphylo. Folia ternata, foliola petiolata, elliptica, acuminata, 5-6 pol
licaria, glabra, integerrima, venosa. Scapus pedalis, erectus. Spatha lanice
lata, tri-pollicaris. Spadix subulata, attenuata, spadice brevior, superne ra
menti filamentorum pilosa.

in Ar. triphylo Spatha lata ovata, spadix 7e v. obtusa

^{intermedia, ovata, caes. v. oblongis}
Hexaphyllum foliolis pinnis, pitha lanicellata spadicis Congrose

Habitat in Arabia

Folium unicum 5 partitum

ex herb. T. Waldei qui incertus num Dracontium vel
Dracontium sit

Anum

Schlange oder Natterwurz. Rauwolf. Koepf 1. no. 9. p. 115.

Anum foliis palmatis: foliolis connatis, intermediis majori Gronov. fl. Orent.

pag. 116 no 204

Habitat Halepi herb. Rauwolfii

Radix tuberosa. Folia radicalia, basi in vaginam deflexa, pedata: foliolum centrale 2-3 pollicare, sessile ovato-lanceolatum, sagittatum basi deflexo utriusque in lobo lanceolato, pollicari dwancato: foliola lateralia cuneata, decurrentes, interiores 3 bipollicares, exteriores breviores. Sapus petioli duplo brevior, superne incisus furis. Spatha tubus pollicis duplo ^{2 pollicari} crispior, maculata. Spadix 4 pollicari, pedicelo brevior: calum obor tubo longior.

Anon

Habitat in Gava herb. Anon

Folia basi ovata, petiolata, pedalia, peltata, sagittata, auriculis lanceola-
tis, obtusis. Spatha pedunculata, spatulata et ultra, subtus purpurea
venis crassis, ^{superioribus} ~~venis~~ ^{venis} ~~crassis~~ attenuata. Spadix foliiformis, prodeum duplo
longior.

Tubus ventris, Cyclus purpurea Commerson.

Clunum

Seli de Rheid hort Mal. 11. tab. 2.

Habitat in India orientali herb. Aust.

Folia ovata, cordata, peltata, semipedalis, subtus nervis costata, acuta.

Spadix lanceolata, semipedalis, spathe triplo longior probrua, apice
bifurcata

an sagittata

enacphyllum Anon

Habitatio sylvis Martae et Tangula Zeylono König herb. Royeni

Folia petiolata, solitaria, ternata: foliola 3partita; laciniis oblongis in mucronem attenuato, bipollicaribus, glabra, tertia minore. Petiolus variegatus. Scapus foliis altior. Spatha ovata, attenuata, pollicari. Spadix subulato, spathe 3plo longior, crassitie pennis inferius monoxia. geminae fœtilia

Speciabile Anum

Vidamur Cinghalensem

Dumunculus zeylanicus maximus polyphyllus caule tripido linn. fl. zeyl. 422.

Habitat in Zeylona hincj herb. Royeni 4

Acaulis. Folia ternata petiolata: petiolus crassitie pennae columbinae. Folia bipartita
petiolata: petioli inferne nudi superne e pinnis decurrentibus alati. Pinnae oblongae
bipollicares, indivisa, acuminatae, integerrimae: intercostae minores, alternae, 5-6 in spi-
gulo petiolo partiali: ramulus inferiorum, glabra. Scapus crassitie digiti. Spatha
maxima, fere semipedalis, latitudine et longitudine aequali, basi scabra, margine crispata (basta
in picea) Spadix longitudine spathe. Flores feminei inferiores, spathe bipollicare occu-
pantes, pedicellati, pollice crassiores, fere superior oblongae, crassitie pugni, inferne antherifer

Anem[?]

Anem. aunculis Congisformi Cordue ambis Raurwolf herodorp. pars 1. C. 9. p. 116.
Anem. foliis hastatis, cuspidibus inferioribus lateralibus protensis Gron. fl. Oenid.
pag. 116. no. 203.

Habitat Halepi herb. Raurwolfii

Radix tuberosa. Folia radicalia, cordato-hastata, petiolata, plura, glabra, 3-4
pollicaria: lobus intermedius oblongus, pollicis 2. lato, laterales lanceolati bipolli-
cari. Scapus petiolo brevior. Spatha pollicaria, lanceolata, acuta. Spadix vir-
gatus, perenna columbina, spatha brevior.

indium Arum caule perenni suberectum, foliis ovatis basi bifidi rotundati
spadiceis antheris. Linnæus f. Coct. pag. 538
Arum Indicum futurum Rumph. Amb. pag. 536.

Atalapha Indica orientalis

Caulis 5 pedalis erigitur a basi. Folia maxima sabaei unum
quatuor, transverse parallela nervosa. Petioli longi subulati. Bractea asini
coloris, parva, acuta, pectata, convoluta. Spadix subulatus. Bacca
subrotunda.

ovoidatum. Anum caulepiens erectum, foliis peltatis cordatis auriculatis
ovoidatis. Lous fl. Coch. pag. 536.

Habitat Cantone Sinarum

Caulis 2 pedalis. Folia circumscissata, basi auriculata cordatis
Petioli longi teretes. Spadix brevis totus ^{est} testus flentibus baccis
4 per mē.

Draconculus A. foliis pedatis: foliolis lanceolatis integerrimis, lamina ovata
spadice longiore Hort. Kew. 3. p. 314

Dracontium Dod. pempt. 329.

Draconculus polyphyllus Bauh. Pin. 195: Monf. hist. 3. p. 548 / 13 tab. 5
fig. 46.

Arum *Draconculus* foliis pedatis: foliolis lanceolatis integerrimis
aequantibus spatulam spadice longiorem L. V. pag. 827.

~~Habitat in Europa australi~~

β *Arum flavum*; foliis pedatis; foliolis ovato-acutis, integris; spatula
spadice longiore Bonpl. de fr. pag. 157

Habitat in Europa australi β. in Itabea 4

β. Scapus inferne vestitus vaginis foliorum alternis. Soliola lato
lanceolata 7. 8. acuminata intermedio reliquis major. Spatha
sesquipolliciana acuta spadice duplo longior.
Spatha pedalis palmae lata.

helleborifolium. Annon folius pedatis: folioli lanceolatis - oblongis integerrimis, lamina pollicari pedice aequante.

Annon helleborifolium Jacq. coll. 3. p. 217.

Habitat ad Casacas ?

Radix carnosus pollicem crassus nigra fœbris albis. Foliosa
dicata plura pedata: folioli lanceolato oblongis sessilibus
acutis integerrimis venis glabris altero latere recedentibus.
maximo semipedali obplete expandi interdum. Petiolus pedali
ter. Scapus pedalis erectus subangulatus crassitie calami
spatha 1 phylla 5 pollicari glabra erecta acuta carnosula
infra diametro pollicari labea collo coarctato in labium
flavescens concava longitudinalem semicinctus abscis
pedic longitudine fere spatha basi crassior ter. Germine
obovato. Stigma peltatum sessile vera glandula albis & demum
usque ad apicem densissime obtusis antheris pallide sulphureis
sessilibus Jacq.

venosum Anem. foliis pedatis foliolis subovatis integerrimis, lamina lanceola
ta radice longiore Hort. kew. 3. p. 315.
Habitat 4

non vidi

pentaphyllum A. acule foliis quinatis Lin. l. V. p. 827.

Anum pentaphyllum indicum Monf. hist. 3. p. 540. f. 13. v. s. fig.
27. mala

Rhomphal planta india orientalis Zan. hist. 205. fig. mala

Habitatio India ~~in A. l. T. p. 101~~

~~Tabelle~~ ~~ma~~

Triphyllum A. acule foliis ternatis, receptaculo spathe brevioris Thunb. fl. pag. 293

Dracunculus / *Serpentaria* *Triphylla* *brasiliensis* Dod. men. 01. p. 273.

arbo. homph. Anum *Triphyllum* acule foliis ternatis, floribus dioicis Lin. S. V. 027.

am. ex. Jesc. ^{Spec. pl. pag. 1389*} *Triphyllum* s. *Anisum*, pene vindi virginianum Monf
p. 786 h. 3. p. 547. p. 13. Tab. 5. fig. 43.

V. ^{anum.} *Anisum* *Triphyllum* minus, pene adruibente virginianam
Pluk. alm. 52. t. 77. fig. 5.

Anum s. *Anisum* minus manarum, flore et pene ex pallido
rescente Pluk. amalth. 39. t. 376. fig. 3.

Habitat in Virginia, Brasilia, Japonia

subcaulescenti *brasiliensis* a folia lateralibus extorsum lobata Lin. Prodr. 13. ^{caulescenti} *Pedali*
folia basi vaginatis petiolata, scapo altiora. foliolis ellipticis
acuminatis lateralibus ^{intermydis} ^{nanum} ^{angustioribus} ~~minoribus~~ extorsum gibbas. spathe

intermediis ^{obovatum aciu} ^{minutum} ^{natum dilatata} ^{labium spathe} ^{fomnes inflexum} ^{lin}
mascula basi amplata superne in labium oblongum acuni

Triphyllum A. foliis ternatis lamina lanceolata acuminata spathe
longiore. Hort. kew. 3. p. 315.

Atrorubens Anon. foliis ternatis, lamina ovata spadice dimidio breviora Hort
Trew. 3. p. 315.

Anon. anisatum triphyllum minus, pene atrorubente virginianum

Plat. alm. 52. v. 77. fig. 5.

Anon. triphyllum Linn. Spec. pl. p. 1360
Habitat in Virginia 4

Vernatum a. caule foliis Vernati, receptaculo spatha longiore Thunb. fl. jap. 239
Habitat in Japonia

non vid.

nyeri A. foliis ternatis, spatula galeata receptaculo longiore stant. in aet
per lin.
Habitat in Japonia

non vidi

serotinum . A foliis radicalibus ternato-pinnatis : foliolis serratis, receptaculo
fructu brevior Thunb. in Act. sci. bo. lin.
Habitat in Japonia

non vidi

~~Usum~~
stratum Arum foliis subcordatis attenuatis nervoso substriatis

Habitat in India Orientali

~~Semina sagittata foliis et foliis cum aunculo rotundato folia nervosa~~
aunculo rotundato, folia semperdalia ^{toti} spithamam fere lata

Colocasia a foliis velutatis ^{quibus repandis}: basi emarginatis Lin. LV. p. 227.

Gaertn. capul. 2. p. 49. t. 45.

Colocasia Pluf. hist. 2. p. 75

Arum aegyptiacum Col. ceph. 2. p. 1. tab. 1. Rumph. Amb. 5. p. 313. t. 109

Arum maximum aegyptiacum, quod vulgo Colocasia Bauh. pin. 195.

Habitat in Orto, Cypri, Syria, Aegypti aquis 4

epulentum A. foliis pellatis ovatis integerrimis: basi emarginatis (bifidis) per
lin L.V. p. 227.

Brasilica brasiliensis foliis nymphae Bauh. pin. 111.

Arum minus nymphae folio, epulentum Sloan hist. 1. p. 167.
Tab. 106. fig. 1.

Caladium aquatile Rumph. amb. 5. p. 310. t. 110. fig. 1.

Habitat in America 4

Folia semipedalia oblique nervosa obscure venosa. Spathe
Spatham lanceolata attenuata spatula longior

nam mea (herb.) diversa planta, 4. lobata pariter add. desin. sic herb.

bicolor Ar. foliis pedatis sagittatis diplo coloratis, spatula medio coarctata: basi
subglobosa: lamina subtutuda acuminata erecta subinvoluta Hort. Pen
n. p. 316.

Habitata Madera 4

Macrorhizon A. foliis peltatis cordatis repandis: basi bipartitis Flor. Zeyl. 327. L.V.

p 27.

Habitat in Zeylona 2

~~Folia frequis Petiolus pedalis Venuis. Folia pithamea acuminata
Venuis sm denosa basi sine divaricato angulis rotunda de fere
datis. Scapus per folia tener. Spatha unpollicans basi amplexata
ultra ultimam plerumque lanata pedice parum longior ~~per
ultra ultimam plerumque lanata~~
ultra ultimam plerumque lanata~~

Synonymum Hermin. a Lin. huc allatum ad aliam plantam
pertinet

enervatum a foliis cordatis ^{ovatis} obtusis angulis rotundatis margine enervato

Habitat in India orientali

~~an macrocarum folia ovata subpeltata, auriculis obtusis margine enervato~~
folia pedalia nervosa ut venosa

peregrinum A. foliis cordatis obtusis mucronatis: angulis rotundatis Lin. L.V. p. 274. Hort.

Cliff. 4357

Habitat in America 4

non vidi

putum a foliis cordatis venis coloratis putis Lin. Suppl. pag 410. * L. V. 020.

Habitat

Folia radicalia, tria s. quatuor petiolata, cordata supra pecta venis albis. spatula
foliis radicalis s. exscaposa, basi inflata visens, superne purpurascens, fusi-
formis. Spadix clavatus: clava ovato-oblonga, atro-purpurea Lin.

non vidi