

Arum

unifanum a foliis cordatis oblongis, spatha apertura ovata Lin. S. V. p. 820.

Anfanum latifolium Clus. hist. 2. p. 73. Lob. ic. 598.

Anfanum latifolium alterum Bauh. pin. 196.

Anfanum latifolium majus Bauh. pin. 196.

Habitat in Europa australi, Mauntania 4

folia acuta lobi <sup>subparalleli</sup> ~~appressati~~ <sup>integrum</sup> ~~marginati~~ <sup>integrum</sup> ~~obtusati~~ <sup>obtusati</sup> oblonge longitudine  
fere opposita. Petioli <sup>synstiles</sup> pithamoi. Scapi foliis brevior  
spatha cylindrica crassitie digiti intermedii sequipollentans  
lob ultra medium tubulosa labio oblongo acuto. Spadix  
spatha longior extra tubum curvatus.

Sagittifolium A foliis sagittatis & angulis: angulis divaricatis  
acutis Lin. <sup>spec. pl.</sup> ~~1370.~~ P.V. 220 Jacq. hort. 2. v. 187.

Anum minus sagittano foliis Pluk. phyt. 149. fig. 2.

Anum amplius foliis epulentum Plum. spec. 4. v. 35

Anum minus epulentum, sagittano foliis viridi nigrican  
tibus Sloan hist. 1. p. 167. t. 106. fig. 2.

Habitat in Brasilia jamaica, Barbados &

Subcaulescens folia longe petio lata acuta saturate viridia, subtus glauca  
sesquipedalia, pedem lata. Spatha pedalis, ensiformis  
acuminata, glabra intus albae extus purpurascens  
Spatha coarcta conica <sup>elliptica</sup> semipedalis nitida utrinque  
pallide flava. Spadix spatha brevior basi intrusa  
lobi inferiores foliorum acuti Jacq.

maculatum. A. foliis subhastatis gradibus clavatis Lin. I. V. p. 828. 82.  
Dan. tab. 505

Anum Buchf. Hist. 69. Lob. u. 997.

Anum vulgare non maculatum Bauh. Pin. 195.

Anum veni albis Bauh. Pin. 195.

β. Anum maculatum, maculis candidis / nigri Bauh. Pin. 195.

Habitat in Europa &  
in <sup>inter</sup> Germania

Folii oblonga acuminis divergentibus ovatis foliis dimidiis  
brevisser. Spatha lanceolata attenuata, frithamoa

virginicum A. foliis hastato-cordatis acutis: angulis obtusis Host. Cleff.

p. 434. x S. V. p. 020.

Habitat in Virginia humidis & sub Rusch.

Folia fere pithamora, sagittata, pollices tres lata, acuminata. Spatha  
lanceolata.

protopideum a foliis hastatis gnatha declinata filiformi-subulata Lin.  
S.V. Prag. 1720.

Anisanum flore in Venetiam caudam abeunte Tournes. inf. 161.

~~Anisanum rotandi folium s. potamoget. folio Boerh. fr.~~

Anisanum repens latifolium minus repens asperifolium Barr.  
var. 102. 8. 1150

Habitatae Pyrenenis. 4

non vid.

Trilobatum A. foliis sagittato trilobis, flore sessili Lin. Fl. Zeyl. 326x S.V. p. 020

Anem humile zeylanicum latifolium, pappello collines Com.  
hod. 1. p. 97. t. 51. Mill. Dict. Nat. 52. fig. 2.

Anem trilobato folio, humiliss et minus zeylanicum Herm.  
parad. 79. t. 78.

Anjanum amboinicum Rumph. Amb. 9: p. 320 & 110. fig. 2.

Habitat in zeylona. 4

Stem cordata, lobi acuti laterales <sup>absque</sup> extrosum angulo pro  
menulis. Spatha acuminata <sup>absque</sup> siapo manifesto radice capi

Dens. An varietas dvariat.

Spadix digitalis et ultra inferne filiformis, anthera spatia  
pollicari remota. Spathe <sup>spathe</sup> <sup>longior</sup> <sup>longior</sup> superne sagittato subulata crassior sesqui  
pollicari. Spathe <sup>longior</sup> <sup>longior</sup> basi oblonga superne dilatata ovata  
attenuata. Fol lobus folii intermedius ovatus attenuatus  
laterales fere cordati aunculis subangulatis

divaricatum A. foliis cordatis hastatis aunculis divaricatis, spadiceo ovato  
acuminata apice revoluta

Nieinsphena major Rheid. Mal. II. p. 39. Tab. 20

Arum divaricatum aunculis foliis cordatis hastatis divaricatis  
fl. zeyl. 325\* L. Sp. 828.

Habitat in India Orientali.

Planta spithamea. folia bipollicana vel ultra, angulis  
fo. obovatis inferiortibus obtusis extiorum gibbosis. pedun-  
culis ad basin folii utrinque ad lat. ad apicem petioli oblongo.  
pedunculus folio brevior. Spatha basi oblonga vix inferius  
valde dilatata sequi pollicem lata superne valde atten-  
nuata et spadiceo subulatus longitudine spadiceo

ovatum. A foliis ovato-oblongis, spathe scabri Lin. S. V. p. 828

Kanripola Rheed. Mal. 11. p. 45. Tab. 23.

Anum aquaticum Rumph. Amb. 5. p. 312. Tab. 108.

Habitat in India

Folia petiolata pedalis undulata. Spatha ovata caudata  
Sorta. Spadix basi globosus stylis filiformis apice in spathe

622  
ellepticum Anum foliis lanceolato allepticis acuminatis Scapis brev. spatha  
ovato lanceolata

Habitat in India orientali & hinc

Solia radicalia, petiolata integerrima nervosa Tri vel quadripol  
licaria. Petiolus longitudine foliorum. Scapus sesqui pollicari  
filiiformis. Spatha unguiculari ovata acuta. Spas et longitu  
dine spathae

*Cannofolium* A. ~~caerulea~~, <sup>immutata</sup> folis lanceolatis acutis Lin-Suppl. p. 220. 410x  
L. V. p. 220

Habitat in Sannami a bonis; parasiticum

Folia radicalia, nonnulla, petiolata, bipedalia; Cannosissima  
Scapus brevior. Spatha obtusifolia, extus rubra intus alba  
et eam margine. Spadix absque spatia inter Stamina et pistilla  
Lin. Spec. Spadix crassitie Septi. minimi

partem spadici tantum vidi.

*Tenuifolium* A foliis lanceolatis, spadice spathe longiore  
*Anem angustifolium* Clus. hist. 2. p. 74. Bauh. pin. 196. Monf. hist.  
3. p. 545. f. 13. t. 6. fig. 21.

*Anem tenuifolium* acaule foliis lanceolatis, spadice petalo  
declinato Lin. S. V. p. 820.

Habitat in Dalmatia, Roma, Monpeli, Oriente &

folia linguata lanceolata basi attenuata vix nervosa, palmaria  
spatha lanceolata, attenuata semipedalis. Spadix teris spadice  
fere dimidio longior sub attenuata

*Spurula* A. foliis linearilanceolatis spadice spatula brevis.

Habitat in India Orientali

Folium angusta, spatulosa, vaginatis basi subundulata  
utrinque angustata. S. Spatula ovata valde acuminata  
basi di ovata tripollicaris. Spadix filiformis exserta  
spadice dimidio brevior

Aunium A. caulescens radicans, foliis ternatis lateralibus unilobatis Lin  
S.V. pag 220.  
Aunium hederaceum triphyllum Aunium Plum. Am. 41. Tab. 50, 51.

fil 209.  
Aunium maximum scandens gemiculatum trifoliatum, foliis ad basin  
auntis Sloan. bot. 1. p. 169.  
Aunium scandens triphyllum, foliis exterioribus auntis, petiolis vaginatis  
Seebus Brown. Jam. 331.

Habitat in America 2

Lobi foliorum elliptici obtusiusculi laterales minores  
obscure trinerviis nervis  
duobus obliquis  
horizontales, superiores absque lobo laterali, lobi oblongi  
rotundati

~~misrophi~~  
~~rac v~~  
~~rac vifolium~~  
~~rac vifolium~~

a foliis lanceolatis petiolatis subundulatis, spatha spadicea que  
febulatis. equalibus

Habitat in India orientali.

Folia pollicana enervis angusta mucronata <sup>utroque attenuata</sup> polli. Petiolus  
longitudine foliorum. Pedunculus brevissimus. Spatha quadrata  
pollicana folio duplo longior basi ovata lacina <sup>convoluta</sup>  
elongata. Differs tenuifolia foliis petiolatis brevibus, a  
stellato spatha valde attenuata nec basi tubulosa <sup>spatha basi globosa</sup>

Stellatam A. foliis lanceolatis petiolatis, Spathis lanceolatis tubulosis faucibus  
fornicatis, radice ovato faucibus fornice adnato

Habitat in India Orientali & Siam.

Planta Dodrantalis. Folium angustum vix undulata sub nervica  
bipollicaria, petiolum ~~vix~~ longitudine foliorum. Scapus brevis  
fimus semurquiculus. Spatha <sup>tubus pollicaris</sup> longitudine foliorum inferne  
tubulosa superne ampliata. Lamina lanceolata tubo quadrupol  
licari. Pericarpium capsula in stellam 5. 6. partitam dehiscens

emendatur differentia tenui folio

arborescens & caulescens - rectam foliis sagittatis Linn. L. V. pag. 020  
Anum arborescens, sagittatis foliis Plum Amer. 44. Tab 51. 9 et 60.  
Habitat in America meridionali &

non vidis

Leguminum <sup>a</sup> caulescens suberectam foliis lanceolato ovatis Lin. l. v. p. 820  
Jacqu. amer. tab. 156.

Anum caulescens, Canna indica foliis Plum. Amer. 44. t. 60-51. h.  
fd. 195. h.

Anum caule erecto geniculato, inferne nudo, foliis oblongo-ovatis  
Brown. Jam. 331.

Habitat in America <sup>inferne appressis</sup>  
~~ses~~ pedalis. <sup>inferne appressis</sup> folia acuta integerrima nitida, subtus nervi para-  
leli, interdum sesquipedalia. Petiolus amplexicaulis, cana-  
liculatus, <sup>inferne</sup> basi dilatatus. Spadix axillaris foliis brevior. Succus  
venenatus Jacqu.

*Hederacium* <sup>a</sup> caulescens radicans foliis cordatis oblongis acuminatis, petioli  
teretibus Jacq. Amer. 3. 1. 8. 152. Lin. l. V. p. 820. Jacq. pl. Am  
*Colocasia hederacea* foliis minor, foliis cordatis Plum. Amer. 39 t. 55  
et t. 51. p. 2<sup>o</sup> fil. t. 895. \*\*

Habitat in America &

Caulis teres crassitie pollicaris, glabri per arbores radicans. Folia  
acuminata, nitida subconca, integerrima, <sup>tenuis nervosa</sup> alternis. Petioli  
teres longitudine foliorum Jacq.

lingulatum <sup>a</sup> caulescens repens, foliis cordato lanceolatis, petiolis marginato  
membranaceis ~~ten~~ S. V. p. 220

Arum scandens maximum, flore florescente Plum. pecc. 4. c. 37.

Phyllitidi scandente minor et major graminifolia, folio oblongo  
acuminato, foliorum pediculis alis extantibus acuti Sloan.

Dico  
hoi synonyma <sup>herb.</sup> 1. p. 75. t. 27. fig. 2. 1.

Dubia Arum venue scandens, foliis oblongis, petiolis alatis amplexuan  
libus Brown. jam. 333.

Habitat in America 4

Dracontium <sup>NB</sup> ~~pedis in plerisque sic petiolus inferne in omnibus~~  
Pteridomum ~~ten~~ magnatur de eoque character non valde  
Richard folia per alia nervosa forsetia striata  
herb Surinam

subcordato ovatis petiolis inferne membranaceis  
~~ten~~ ~~pedis in plerisque sic petiolus inferne in omnibus~~