

Asclepias

x folio oppositi plani

1. undulata A. foliis sessilibus lanceolatis undulatis margine scabris umbellis
lateralibus, petalis ciliatis

2. crispa A. foliis cordato-lanceolatis undulatis margine scabris superioribus
sessilibus umbella terminali

3. hispida A. foliis petiolatis ovatis, petalis intus hispidissimis, caule fruticoso
herbo-

4. caniflora A. foliis linearibus lanceolatis, ^{glabris} umbellis lateralibus, corollis intus
hispidissimis, caule fruticoso glabro

x 5. pubescens A. foliis ovatis sessilibus nudis, caule fruticoso, pedunculisque
villosis.

x 6. radicans A. foliis cordatis undulatis subtus canescentibus, umbellis latera-
libus caule herbaeae simplicis

x 7. carnosa A. foliis ovatis carnosissimis glaberrimis.

8. grandiflora A. foliis petiolatis oblongis pilosis, caule simplicis herbaeae crassulatis
to, floribus axillaribus pedunculatis

Thunb

radice
viri
longo

umbellis

caulis

caule

caulis

decidua

loso

caulis

9. gigantea A. foliis obovato-oblongis, petiolis brevissimis, laciniis corollae reflexis intro
 luti.
10. procera A. foliis ovato-oblongis, petiolis brevissimis, corollis subcampanulatis
11. fymosa A. foliis ovalibus subtus tomentosis, caule simplicissimo, umbellis nudantibus
12. amara A. foliis ^{lanceolatis-oblongis} ovatis subtus pilosis, caule simplici, umbellis nectariisque
 erectis.
13. purpurascens A. foliis ovatis subtus villosis, caule simplici, umbellis erectis,
 nectariis resupinatis
14. variegata A. foliis ovatis rugosis nudis, caule simplici, umbellis subproliferis
 pedicellis tomentosis
15. curassavica A. foliis lanceolatis glabris nitidis, caule simplici, umbellis
 erectis solitariis lateralibus
16. parviflora A. foliis lanceolatis acuminatis glabris basi attenuatis, caule
 suffruticoso erecto, umbellis lateralibus.
17. nivea A. foliis ovato-lanceolatis glabris, caule simplici, umbellis
 erectis lateralibus
18. incarnata A. foliis lato lanceolatis glabris, caule superne diviso, umbellis
 erectis geminis
19. deumbers A. foliis ovatis villosis, caule decumbente hirsuto
20. lactifera A. foliis ovatis glabris, caule erecto, umbellis proclivis brevissimis

21. vincetoxicum A. foliis ovatis basi barbatis, caule erecto, umbellis prolixis longitudine
foliorum;
22. nigra A. foliis ovatis basi barbatis, caule superne subvolubili, umbellis breviori
bus
23. glabrata A. foliis subcordatis oblongis mucronatis umbellis prolixis folio longo
ribus caule volubili
24. volubilis A. foliis ovatis integerrimis acuminatis, caule arbores volubili, umbellis
erectis
25. riminalis A. foliis lanceolatis glabris, umbellis lateralibus caule fruticoso
volubili filiformi multifloris
26. aphrasiaca A. foliis petiolatis cordato-ovatis supra glabris integerrimis, caule
fruticoso volubili hirsuto, umbellis paucifloris.
- x x foliis lobatis revolutis
27. arborea A. foliis ovatis subsessilibus, umbellis hirsutis, ^{caule fruticoso,} ramis villosis
28. fruticosa A. foliis linearibus lanceolatis caule fruticoso
29. libanica A. foliis linearibus lanceolatis oppositis ternis que, caule decum
bente glabro herbarico
30. denudifolia A. foliis linearibus margine pilosis pilulis, caule erecto piloso
31. itoja A. foliis linearibus, caule fruticoso ^{herbaceo}
32. filiformis A. foliis filiformibus, umbellis lateralibus elongato-pedunculatis
caule erecto

32. *Salicifolia* A. foliis linearibus lanceolatis, caule fruticoso scandente, racemis
lateralibus

33. *verticillata* A. foliis linearibus verticillatis, caule erecto.
mexicana.

xxx foliis alternis

34. *nebra* A. foliis ovatis, umbellis ex eodem puncto pedunculo communi plu-
ribus

35. *tuberosa* A. foliis alternis lanceolatis, caule divaricato piloso
linaria

xxxx caule aphyllis

36. *stipitata* ex A. caule fruticoso aphyllis.

A. fistulosa
latifolia
glabrata
floridana
elevata } Benth

A. fistulosa
juvencolent
longifolia
volubilis
complanata } Benth

A. hirta
quadriplica } Benth

Alclepias an *parviflora* ?

Asclepias flore albo no 34. von Rohr.

Caulis videtur herbaceus pallide viridis ~~superius~~ ^{superius} vix armato villis adspersis

Folia petiolata opposita lanceolata remota quadripollicea
na glabra vix armato ad marginem villis nonnullis. Petoli unguicula
res. umbella axillares et terminales solitarii. Peduncululi foliis
duplo breviores. Pedicelli plures pubescentes galeiformes. calyces pubescentes
laciniis lanceatis. Petala ovata glabra

canescens. *Alepias* foliis ovatis integerrimis cauleque procumbente
pubescentibus, umbellis axillaribus paucifloris.

Willden. l. c.

Habitat. Cappadocia et Galatia.

Alepis orient. latifolia flore viridi Tournef. cart. 2
Buxb. cent. 3. p. 17. t. 30.

Caulis pedalis et ultra procumbens, apice ascendente
teres, pube tenui lectus.

Folia opposita ovata acuta integerrima venosa
utrinque pubescentia, brevis petiolata, petioli canali
cylindrici. Flores virides in umbellis brevis pedunculatis
paucifloris simpliciter axillaribus. Siliiculi
ovati acuminati lobes pubescentes.

radicans A. foliis cordatis undulatis ^{conrescentibus} subtus villosa, umbellis lateralibus
caule herbaceo.

Af. leycas radicans foliis petiolatis cordatis acutis ^{undulatis} umbe
umbellis terminalibus corolla limbo erecto pinnali Joseph Desj.

^{no. 49. n. 67.}
Habitat in Arabia

Folia Caulis villosi teres simplex. Folia petiolata
pollicina latitudine et longitudine fere equalia
mucronata supra subvillosa venis nervisque villosis
tus incanis, subtus mollia. Petiolus longitudine folio
rum. Umbella simplex multiflora. Folliculi ovati
villosi

alba *Asclepias* foliis oppositis ovatis acutis subtus tomentoso albis, umbellis solitariis multifloris, caule volubili. *Cavan. Ic. 4. pag. 5. Tab. 310.*
Habitat in Peru.

non vid.

mucronata Afil. foliis oblongis mucronati glabri, umbellis axillaribus

Thunb. prodr. pag. 47

Habitat in Cap. b. spec.

michi ignota

pulchra Asi foliis lanceolatis subtus pubescentibus, caule superiore
dorso, umbellis erectis geminis Wild. spec. pag. 1267.
Habitata Armenia boreali 2

non vidi prope in-arnatum

Daunia

Apl. foliis lineari-bus puberulis piloso ciliatis oppositis umbel-
latis pedunculatis axillaribus, calycibus pilosis W. Den
Her: pl. pag 1272.

Habitat in Daunia 7

non vidi

Thunbergii Aflep. caule apophyllo
Aficlemasi apophylla Thunb. proodr. pag 47.
Habitat in Cap. b. spec.

mibi ignoto

foetida *Asclepias* caule tereti volubili, floribus racemosis foliis
oppositis cordatis acuminatis Pav. ii: 2. pag. 45. tab

158.
Habitat in Mexico

Caulis geniculatus ramosis. Folia acuta acuminata
subtus glauca. racemi catesales solitarii. Corolla
herbacea luteo-purpurea laciniis linearibus revolutis Pavon

non vidi.

canadensis A. foliis lanceolatis obtusissimis mucronatis glabris, umbellis terminalibus.

Habitat in Canada. L. Schumacher

Caulis erectus herbaceus, glaber. Folia opposita, petiolata lanceolata,
bipollicaria, venosa, obtusissima, basi alutro. Umbello multiflo
ra. Petala plana glabra, lanceolata, alba, vix unguiculata.

undulata a foliis sessilibus oblongis canaliculatis undulatis glabris, petalis ciliatis
Lin. S. V.

Apoecynum africanum, Capathi folio Lam. rar. 16. v. 16.

Habitat in Africa 7

Caulis teres crassitie penno cyneo pilis parvis pubescentibus
folia 4 in pollicina ^{seno sa subtui pallidiora} transverse nervosa scabra margine
umbello laterales sessiles pedunculati calycis et corollae exterioris
pilis minutis hirsuti petala late interne ad marginem pilis
copiosis albis profunde apice albis hirsuta, ovata acuta
Sollivuli sessis longis crispis pilosis hirsutis penna

undulatis margine scabri
canaliculatis umbelli laterales petalis

Cracca Asclepias foliis cordato-lanceolatis undulatis scabri, umbella terminali lin
Suppl. p. 170 * Lin S. V. p. 250

Apocynum erectum africanum subhirsutum foliis undulatis Herm. Parad.
25. Commel. prot. rar. 17. t. 17.

Asclepias cracca foliis lanceolatis crassis hirsutis, petalis extus villosis
Berg Cap. p. 75 * L. V. Ed. 13. p. 213.

Habitat in Cap. bonae spei

Caulis erectus inferne ramosus, vili minutis herbis.

Folii inferora petiolata, superiora sessilia, repanda nerv
vosa ^{venosa} Umbella terminalis multiflora. pedicelli polli
cani petala ovata

_____ margine scabri, superioribus sessilibus
corollis glabris

Asclepias undulata foliis revolutis repandis villosis Lin
S. V. p. 266 n. 20

hirsuta Af: foliis ovato oblongis pilosis, caulis umbellis terminalibus
cordatis intus hirsutissimis caule hirsuto.

Habita in perni ex horto Taurinensi 5.
Rami superne angulati uti petioli, hirti. Folia opposita
reticulata margine inferiora ^{interdum} fere cordata superora
ovato oblata suprema lacinolata interdum oblique
separata utraque pilosa venosa pollicari obtusa
umbella terminalis pedunculis brevibus. Petala lacinola
ta.

pubescens Aplepis foliis ovatis venosis nudis, caule fruticoso pedunculisque villosis Mant.
215. * L. f. v. p. 250

Apoeyner africanum tuberosum, latiori foliis folio, flore pallide purpureo
Mant. h. 3. p. 610. f. 15. t. 3. fig. 35. Pluk. phyt. ^{Hab} 139. fig. 1.

Habitat ad Cap. b. p. i. 7

Caulis fruticosus, simpliciter usculus, erectus, brevis fere villosus. Folia
opposita, brevissime petiolata, villosa, ovata, mucronata, venosis
ma, confertiuscula. Pedunculi et umbellula villosa. Flores purpurei
siccitas h. Mant. l. c.

omittatur in Thunbergii radromus.

Synon. Pluk. potius ad undulatam spectat
non vidi

11-12 - Caniflora Asclepias foliis planis linear-lanceolatis, caule fruticoso, umbellis laterali-
bus solitariis, corollis hispitis Tab. VII

Asclepias ~~L.~~ caniflora; foliis linear-lanceolatis Torr. de ser. pag. 51.

Caulis erectus, fruticosus, glaber, articulatus, crassitie penna anserina.

Folia opposita, linear-lanceolata, approximata, basi in petiolum attenuata, plana, glaberrima, avenia, supra in medio sulco longitudinali, subtus nervo elevato, tripollicaria. Denticuli plurimi, minuti, setacei, ad articulos verticillatim dispositi.

Pedunculus interfoliaceus, solitarius, folio dimidio brevior, umbelliferus, tandem racemosus.

Umbella erecta, multiflora, involucreta. Involucri folioli subulati, inaequalitibus.

Pedicelli polli cavi, basi denticulis minutis, numerosis, deciduis, inaequalibus.

Calycis foliola lanceolata acuminata.

Corolla quinque fida, plana, ciliis glaberrima, intus profertim versus marginem hispita. Laciniae corollae ovatae, acutae.

Colluculi duo cylindrici, utrinque angustati, incurvi, laeves.

cordata A. foliis cordato-lanceolatis subsessilibus; caule erecto dichotomo
umbellis terminalibus Walt. fl. carol. p. 105
Habitat in Carolina

non vidi

humifruta A. Folus sesquipedibus cordatis oppositis, caule prostrato, umbellis
axillaribus Walt. fl. Car. pag. 105
Habitat in Carolina

non vid.

carnosa *Apleuras* foliis ovatis carnosis glaberrimis Lin-Suppl. p. 170* S.V. p. 260.

Habitat in China

Folia vix palmata, ovata. Petioli carnosus, foliis dimidio brevioribus, umbella simplex, more congenitum *acallaris*, foliata. Calyx minutus. Corolla minus divisa, vix semiquinquiesda plana. Genitalia ut in reliquis speciebus. Valde a reliquis diversa Lin. l. c.

non vid.

vidi A. foliis oblongis obtusis lobis petiolatis oppositis, umbellis
terminalibus, nectariis cernuis Walt. fl. Car. pag. 67.
Habitat in Carolina

non vidi

grandiflora *Aphelias* foliis petiolatis oblongis petioli, caule simpliciter hirsuto erecto,
floribus axillaribus pedunculatis Lin. Suppl. p. 170* Pl. 260.

Habitat in Cap. b. p. i.

umbella nulla. Flor. maximus, colore Tritillano melocagridis vesfellato

Lin. l. c.

non vidi

gigantea *Asterias foliis amplexicaulis oblongo ovalibus basi pilosis* Lin. Sp. p. 312

* L. V. pag. 259 Flor. Leyp. 112. ~~Quinquifida L. G.~~

~~Berdel ofas Alp. Egypt. D. S. t. 26.~~

~~Enic. Rheed. Malab. v. p. 53. t. 31. Seb. Mus. l. p. 41. t. 26. fig. 1.~~

~~Apocynum erectum majus latifolium indicum Planch. atm. 35. t. 175.~~

fig. 3.

Zea. ract. Burm. it. 315. t. 184.

Habitat in Egypto, India Orient. et Occident. 4.

Neclaria promunt non cornicula subulata sed laminae solidas conni-
sentes. Basis petioli supra barbatus lin.

gigantea *A. foliis obovato oblongis, petiolo brevissimis, laciniis corollae
reflexis involutis* Hort. Kew. l. p. 305

*Folia glabra semiamplexicaulia. Peduncululi solitarii aeterni
axillares umbelliferi* Lin. *Crassit. in no. aeterna*

*Caulis erectus, superne nuda, vix graniscente apice tomentoso
incanus. Folia ut petiolata palmata et uter basi subcordata
inferne versus parum angustiora, sessifera obtusiuscula juniorum
subtus tomentosa incana ad utrumque glabra nervosa venosa
fimbriata axillares pedunculata. Petala ovata*

protera Afel. foliis ovato oblongis, petiolis brevissimis, corollis subcampanulatis

Hort. kew. 1. pag. 305

Beudel osjar Alp. Aegypt. 25. 1. 25

Apocynum erectum majus latifolium indicum Pluken. alm. 35. 1. 175

fig. 3

Afelpus gigantea Jacq. Obs. 3. p. 17. 1. 69.

Habitat in Persia

~~Caulis erectus crispis, pennis asperis, squame tomento sic inia
nus. Folia via petiolata basi subcordata inferne versus parum
angustiora, fere spatulata obtusiuscula juniora tomento
tenui cano aductiora utraque glabra. Pedunculi axillares
pedicelli subumbelliferi squam. pollucens. petala lanceolata~~

Nota
descriptio nem
ad

non vid.

Synaea α foliis ovalibus subtus tomentosis, caule simpliciter spinoso, umbellis nectaribus - Lin. l. v. pag. Galen. Musc. l. p. 24. r. 7. fig. 3.

Bei Delfar Vasl. Egypt. ed. 1. p. 20. r. 24. Ed. 2. p. 106. r. 51.

Apoecynum majus *Synaeum* rectum Corn. canad. 40

Apoecynum *Synaeum* Clus. hist. 2. p. 07.

Chaetochloa β - *Aptenar* foliis lanceolato-ellipticis, caule simpliciter glabro, nectaris corniculis conniventibus Lin. Am. acad. 3. p. 404

Habitat in Virginia 4

Caulis erectus tri vel 4 pedalis teres. Folia breviter petiolata elliptica transverse nervosa ^{mit namo} supra glabra subtus ^{vel neri} incana fere spithamea. Peduncululi axillares et ter minales - foliis dimidio brevioribus in umbella multiflora pedicelli bipollicares.

Comona Aplepas foliis ovatis subtus pilosis, caule simpliciter, umbellis nectanisque
erectis L. S. V. pag 259

Apocynum floribus amone purpureis, corniculis faveitis Dill. Elth.
3. t. 27. f. 30.

Habitat in America septentrionali 4

Caulis ~~puberulus~~ ^{puberulus} erectus, teres folia breviter petiolata ~~lanice~~
summa ~~sepiata~~ ^{sepiata}, acuta, utraque ~~lanice~~ ^{lanice} ~~sepiata~~ ^{sepiata}
na. pedunculi superne oppositi, solitarii pubescentes ut pedicelli.
Corolla purpurea.

— lanceolato oblongi

purpurascens *Aptepia* foliis ovatis subtus villosis, caule simpliciter, umbellis erectis, nectariis
resupinatis L. S. V. pag. 259

Apoeynum erectum *Naseboracense*, foliis minus *ancianis*, flore erecto
foliis purpurascens *Herm. parad.* 33.

Aptepia floribus obsolete purpureis, corniculis resupinatis *Dall.*
Eeth. 32. t. 20. f. 31.

Habitat in Carolina 4
valde affinis *A. synaë*

variegata *Apleyria* foliis ovatis rugosis nudis, caule simpliciter umbellis subsistibus: pedicellis

tomentosis Kun. L.V. pag. 259

Apleyria ex Virginia Bauh. Pin. 303

Apocynum americanum erectum, tuberosa radice non inianum, foliis
rigidioribus ceteris subrotundis, floribus albis intus purpureis, summo cau-
te *Corymbum* magnum efformantibus Pluk. alm. 34. t. 77. fig. 1.

Apocynum vetus americanum, W. Jacq. Del. Elth. 32.

Habitat in America boreali. 7

Affinis *Synaca*

Curasavica a foliis lanceolatis glabris nitidis, caule simplici, umbellis erectis
foliatis laterebus Lin. t. V. p. 2594

Apoecynum curasavicum f. *americanum*, fibrosa radice, floribus au-
rantis, chamomoni foliis latioribus Herm. par. 36 t. 36.

Apoecynum radice fibrosa, petalis coccineis, loriculis croceis Dill
Eckh. 34. t. 30. fig. 33.

Habitat in Curasav 4

Caulis erectus glaber superne vix pubescens. Folium petiolata
lanceolata attenuata glaberrima, tri vel 4 pollicaria
Peduncululi laterales foliis parum breviores glabri peduncul.
plures pollicares. Colluculi ad latera denticulati
collis flores aurantii

Loureni Ajil. folus petiolatis lanceolatis nitidis, caule volubili
apilepsi unisporica Lour. fl. Cochinch. pag. 270.

Habitat prope Cantonem Siamum.

flor. pallidi umbello solitariis erectis. Folliculi ventricosi
conici

non vidi

ruvea A. foliis ovato-lanceolatis glabrisculis, caule simplicia, umbellis erectis
lateralibus solitariis *her. V. p. 259*
Apocynum americanum, foliis amygdali longioribus *Plum. spec. 2. c. 30*
Apocynum peruvianum mixto folio, corniculis lacteis *Willd. Bot. 33. t. 29*
fig. 32.

Habitat in Virginia et America Calidioris *B. her. Mus.*

Caulis lignosus, pubescens a folio ad folium curvato flexuosus, villosus. Folia
simplicia, opposita, lanceolata, vel ovato lanceolata, basi in margine revoluta
minus ornata, venosa, medio parum lobata, subtus villosa. Umbellae
axillares, simplicia, solitariae, albescens. Pedunculi plures villosi. *et*
Plum. phyt. 76. fig. 6. radice fibrosa. Germ. pund.

Specimen herb. Fusf.

Caulis teres, erectus, simplex superne pubescens. Folia opposita petiolata
2-3 pollicaria, ovata elongata, acuta, per petiolum parum decurrentem
venosa glabra, juniora subtus sub villosula. Petiolarum pollicaria a margine folii
decurrens alata. Pedunculi incani, sesqui pollicaria. Umbellae erectae
13 radiatae, semipollicariae. Calycis lacinae lanceolatae. Ovaria minus
quam in curvis formis

~~ruvea~~

incarnata a foliis lanceolatis, caule superne divip, umbellis erectis geminis
Lin. f. v. Jacq. hort. 2. 7. 107.

Apocynum minus rectum canadense Poir. canad. 9. 7. 93. Barr. rar. p.
772. ^{herb. mus.}

Habitatio Canada, Virginia & ^{superne} ^{lineis decumbentibus villosis}
caulis bipedali et ultra glaber. ^{folia petiolo brevi lato}
lanceolata glabra. ^{per petiolum} ^{petiunculi in axillis supremis gemi-}
ni villosi ^{que} ^{per} ^{umbella multiflora}
flores purpurei

Apocynum erectum canadense angustifolium Harms. parv. botan.
herb. Vahl.

caulis simplex, ^{erectum opposit.} ^{angusti per no. opposit.} ^{folia inferne quaternis}
superne ternata bis. ^{folia} ^{pollinaria}, acuta, basi obtusa, ^{patentia}
sura, ^{subtus} ^{venosa}, glabra. Umbella ^{terminales} quaternae.
Petiunculi, uti caulis, superne villosi. Flores copiosi. Petiunculi
oblongi, glabri, ^{laevi}, ^{acuminati}, ^{sesqui} ^{pollinaria}

Decumbens *Aptenia* foliis villosis caule decumbente Lin. S. V. p. 259

Apocynum carolinianum aurantiacum pelopum Pet. fid. 90.

Aptenia caule decumbente hirsuto, foliis ovalis obtusis villosis
subsessilibus Gron. Virg. 27.

Habitat in Virginia 4.

non vidi.

Cactifera a foliis ovatis, caule erecto, umbellis proliferis brevissimis Linn.

L. V.

Apilepis caule erecto simpliciter herbaceo, foliis ovatis acuminatis, corym-
bis compositis longitudine petiolorum Linn Fl. Zeyl. 111+

Habitat in Zeylona 4

Caulis glaber volubilis. Folia petiolata ~~basifolia~~
^{oblonga} ^{attenuata} ~~obovata~~ glaberrima, bipollicaria ^{vel ultra} ~~perpetua~~
~~semper minoribus~~ ^{habitu venosa}. Umbellae laterales foliis pedunculatae
~~ti vel raris geminis alteri sessilibus alteri pedunculatis~~
~~proliferis~~ faciei vinctotici ut difficile distinguitur

in herb. Germ. specimen non habeo

gonocarpus A. caule volubili, foliis ovato-cordatis oppositi, nectario f.
stellato, folliculis cornuis Walt. fl. Car. p. 104
Habitat in Carolina

parviflora Asplenias foliis lanceolatis acuminatis glabris oppositis basi attenuatis, caule suffruticoso erecto, umbellis lateralibus solitariis Hort. Kew. p. 307.

Habitat in Carolina et Florida australi et

caulis erectus villosus submentosus. folia petiolata, utrinque attenuata tri-pollicaria. Pedunculi superne, laterales folio dimidio breviores. ~~pedunculi~~ ^{pubescentes} uti pedunculi.

an hic descripta Hort. Kew

Sinicetoxicum A foliis ovatis basi barbatis, caule erecto, umbellis proliferis
Linn. f. C. Fl. Dan. tab. 249 Jacq. Masi. 1. p. 17. t. 1. fig. 3.

Sinicetoxicum Rod. pempt. 407.

Aclepias albo flore Bauh. pin. 303.

Habitat in Europa glaucis ^{lineis} ^{in villosulus}

hyollianus

Caules glabri simplicis. Folia petiolo brevi, attenuata
nervis villosa. Pedunculis lateralibus ^{et terminalibus} folio parum brevioribus
Corolla alba

nigra ^a foliis ovatis basi barbatis, caule superne subvolubili Lin. Speicpl.
pag. 315. x. S. V. p. Guigu. Miscell. t. p. 19. t. 1. fig. 6

Vinicetorium flore nigro Cam epit 560

Astlepus nigro flore Thauh. jun. 303.

Habitat ^{in septem solo puberulis} Montpelii in collibus ^{Frax.}

Caulis ^{in septem solo puberulis} vitis ^{pubescentes} foliis petiolata, attenuata
nervosa venosa bipolliciana ^{nervi} venis pubescentibus. ceterum
glabra. umbella axillares parva brevissime pedunculata
4 in mea simpliciter. floris obscure purpurei

alexica A. caule volubili, foliis inferioribus cordatis superioribus
^{oblongis} ~~ovatis~~ umbellis simplicibus - Gaertn. Coll. 1. pag. 101.

Manjerina - ~~pa~~ potio Alced. Mal. 4 p. 21 tab. 13.

Habitat in India orientali

michi exota seu sub Cynanth. in herb. exstat

glabrata A. foliis ^{sub} cordatis oblongis mucronatis et umbellis prolixis
caule volubili

Habitat in India Orientali

Caulis teris glaber. Folia petiolata glabra coria bipolli-

cana sursum sensim minora obscure venis simplicissimis
obscurois. Pedunculis lateralibus interdum umbellatis
^{superioribus foliis longioribus}

inferioribus parvis
brevioribus

sessilibus ad basin pedunculati. non reliquis pedunculatis
simplicibus vel prolixis. flores glaberrimi. flores parvi
lacinis calycis lanceolata petala lanceolata erecta

affinis latifera

di Anthoxarpos A. caule volubili foliis subulosis, ne sano stellato, folliis
lis cernuis mucronato-spinosis Walt. fl. carol. pag. 104.
Habita in Carolina

non vid.

fusca *Apteria* caule repente foliis cordato-lanceolatis, umbellatis
Causis geminis laev. fl. Cochinch. pag 270.

Habitat in Cochinchina videtur.

Caulis herbaceus, volubili inferne radicans superne ramosis
Folia basi barbata, petiolata, parva. flores fusci purpurei. Corolla
minima. folliculi 2 parvi subulati lobis planis extus ventri
cosi

non vidi.

Piper caudatum foliis cordatis basi sinu profundo attenuatis novem nervis
venosis glabris.

~~Nhandi Piper caudatum seu Nhandu Mang. Hist. rer. nat.~~

~~Brof. pag. 75. de medic. Brof~~

~~Nhandi. Piso hist. nat. Brof. pag. 96 de Antiqua hist. natur. et~~

~~med. pag. 97.~~

~~Secundum specimen herbarii Mangravii descripti~~

volubilis A foliis ovatis integerrimis acuminatis, caule arboresc. volubili, his
umbellis erectis Lin Suppl. pag. 259 170 & L. V. 259

Habitat in Zeylona &

Caules & erecti glabri punctis, raris pallidis adpressis.

Folia petiolata, late ovata nervosa venosa bipollicia

ria et ultra ^{glabra} P. folia ramulorum tenella lanuginosa

Petiolus longior, fo. fo. uti ramuli opus tomento ferrugineo. Pediculi la-
ne folia terales. Pedicelli filiformes. Corolla rotunda umbella plu-
plicis fere multiflori

Watta - Kaka cod. Hort. Mal. 9 p. 25. t. 15

cripa a

Astmathua a foliis petiolatis cordato-ovatis supra glabris integerrimis, caule fr
toso volubili hispido umbellis paucifloris Lin. suppl. p. 170 * L. V.
pag. 254.

Apocynum zeylanicum scandens, foliis laevibus Herm. prodr. 413.

Apilepis zeylanica, vnicetoneo radice prophanthe Burm zeyl. 36.

Lin. fl. Zeyl. n. 490

Habitat in Zeylone Sylvis

Tota herba villosa ex cepta pagina superiore foliorum.

Folia approximata magnitudine et figura Lauri nobilis
basi cordata acuta. Umbella axillares foliis breviores
saepe prolefero. Flores parvi Lin

vi mineralis A. caule suffruticoso volubili filiformi, foliis oppositis lanceolatis gla
bris, umbellis lateralibus multifloris Sw. prodr. p. 53.

Aporinum Sloan herb. 1 p. 131. fig. 1.

Apilepis B. Brown jam. 183.

Habitat in Jamaica

Nota medicæ Cynanchi in herb. Benth.

non proflideo

perennis A. foliis lanceolatis glabris petiolatis oppositis, caule suffruticoso
umbellis lateralibus oppositis Walt. fl. Car. pag. 107
Habitat in Carolina

non vidi

Canecolata A. foliis linearibus caule erecto Covi, umbellis terminalibus.
Walt. fl. Carol. pag. 105.
Habitat in Carolina

non vidi

tenera A. foliis pubescentibus; caule erecto teri, umbella terminali.
Walt. fl. Car. pag. 105
Habitat in Carolina

non vidi