

Asclepias

convolvuloides Asclepias Cynanchum foliis cordatis acuminate, pedunculis elongatis, corollis  
calycis, folliculis paleris exsertis lobar. caule volubili.  
Habitat in Georgia Thonning.  
Pauli volubilis, Veras, pubescens. folia petiolata, triplinervia, subter-  
pubescentia. Petiolis longitudine foliis pubescens. Pedunculus foliis tan-  
gior, Veras, pubescens, laterali, a pedicello ad pedicellum flexuoso. Pedicel-  
los racemoso corybosi. Pedicelli geminati, capillares; basi bractea mi-  
nuta suffulta. Tollenti duo ovata, attenuata, bipinnatae  
Calyx parvus squamifer. Corolla tubus longitudine calyculis: limbus planus  
lacinias lanceolatis vnde albescentes, basi purpureo. Nectarium colum-  
nare, corolla parum brevius, latera quinque foram exserent corporis cor-  
pus oblongum, basi extrosum auratum, apice attenuatum in corniculum  
subulatum, incurvum, superne testum corpusculo piano, squamulos.  
angulis ornatis dentato sphacelato ad latera obvoluto. Squamula  
squa, inferne involutis foreolis duabus pro antheris. Anthers et  
Pistilla ut in congeneribus. Thonning

ad Thonningii Msct. descript. Nectarii

~~floridus Convolvulus~~ Lindii opus prostratus canus; foliis lanceolatis gla  
bris, thyro terminali pyramidali compposito L. Suppl. p. 136. \* S. V. p. 257.

Habitat S. Criniti

similis C. Eneoro.

~~Pante lignosus procumbentes. Rami erecti; fleti, cani. Dolia petiolata lato-lancearia  
basi attenuata, integra, undulata, digitata, venosa, glabra, obtusifrons, emar  
emarginata, glauca. Pedunculus ex axillis foliorum superiorum, ramosis; rami ramosi; sic  
mucronata continuando formatus panicula magna, ovata s. thyrsidea. Flores numerosissimi  
opere cerasi illis brevis & longis  
adspersa  
one minore. Calyx 5 foliis, ovato, acuta, fimbria. Corolla dilata subro, extus his  
fatu. Lin. Suppl. t. c.~~

~~floridus Convolvulus oblongo-lanceolatis basi attenuatis subguloso; rami floriferi  
pedunculis que paniculatis Hort. Kew. 1. p. 214.~~

convolvulaceae Afsl. foliis subrotundo - cordatis acuminate; caule  
solubili, umbellis prolyeni Wild. spec. pl. pag 12 fig.  
Habitat in Guinea 2

non side prone focted

tomentosa Asclepias foliis ovato-oblongis glabriusculis, umbellis pedunculatis  
simplicibus, floribus Tomentosis, caule volabile.

Habitat in Guinea Gest

Pauli suffruticosus? ramosus, Veres; a Tomento Veneris & mo incanus. Folia  
petiolata, bi-f. triplollaria, opposita, brevissime acuminata, obscura  
venosa, subtus oculo armato villosa. Pedunculi longitudine petiolae  
Flores plures; parvi.

an notis Pyramini species? Cantharidina Collet.

Astlepear

Astlepear orientalis, amplissimo folio, scandens, flore cano Tournes. Cor.  
Buz.

Habitat in Oriente herb. Maf.

Pauli glaber, ramosus, Teret, herbaceus; rami superne vellosuli. Solea  
petiolata, subcordata, ovata, acuta, inferiora quadriplicata, basiplana.  
Umbella attillata, trifida. Petala ovata, calyx longior.  
an ranunculiflor. an Cynanch. pieris?

Asclepias foliis oppositis lanceolatis, umbellis lateraliibus terminalibusque pedunculatis

Habitat in Cap. l per herb. Royenii

caulus herbaceus, subdichotome ramosus, glaber. folia petiolata, linearia, glauco-viridia, basi revoluta, acuta, basi obtusa, sesquipollucciana. Pedunculi elongati. Umbella simplici, 6 radicata; radii orato armato villosi. Calyx foliacea lanceolata, pilosula. Petala ovata, margine membranacea. Corolla nebulosa pubulata, perrecta.

confer cum Asclep. - foliiforme Thunb

Longifoliae Asclepias

Habita in Georgia occidentali herb. Richard

Caulis pedalis

ps. virenter caule superne, pedunculis et pedicellis villosis, foliis duplo latioribus  
umbella laterales et terminales solitariae. Pedunculi prolixares.

laurifolia Asclepias

Habitat in Georgia Richard

Caulis herbaceus, erectus, glaber, uti tota planta, superne ramis uno alteriore. Soleri  
opposita, brevissime petiolata, Triplobelia, ovato-lanceolata, attenuata, subtus  
pallidiora, venosa, basi plana, e serotini oculo armata, videndi scabra margi-  
ne. Pedunculi elongati foliarii. Umbella multiflora. Pediellii unguiculata  
res. Petala cunean - lanceolata

Canaliculata Asclepias

Habitat in Carolina herb. Desfont.

Caulis herbaceus; glaber simplicet. folia petiolata, opposita, bipinnata,  
utrinque attenuata, glabra, subrenosa, subtus pallidiora. Petioles angusti  
lato. Umbella superne, folio breviori multiflora, exinde profusa.  
Florae pauci

Cinerea Asclepias

Habitat in Carolina Herb. Desfont

Pauli herbaceis; teret, pubescens, erectus. Solaia subpediolata, tripollia  
na, superiora indumenta alterna, lanceolata, angustis, ut oraya acutis, basi  
plana, glabra, margine costata ad centrum villosa, <sup>supra</sup> umbella laterales  
opposita, solitaria vel geminata, pedunculata, folios breviores, multiflo  
ri. Pedicelli semi-pollucares, inian. Scleror pinni. Sollci ali orato  
oblongi, attenuati, bipollucares et ultra, glabri, laevi.

vindus Aclepias

Habitat in Pavolena herb. De font

Paullo herbaceo, erecta, simplici, fovea pedalis, venis, pubescens. Sola opposita, sessilia, remota, pollicaria lanceolata, acuta, basi plana, rot. vellosa. umbella laterales pedunculata, erecta, folio brevioris, quadiflori. Pedicelli vellosi. Corolla glabra

peruviana Asclepias foliis inferioribus hastatis lanceolatis, superioribus oblongis

Habitat Limo in arsenofis Dombey herb. Theroune 4

Caulis volubilis; Vares; glaber, ramosus: Rami superiores; eti pedunculi bafi tomentosi  
folia petiolata, opposita, inferiora subtus pubescentia, superiora unguiculata mucinosa  
adumbrata, avenia enervia, villosa, subtus tomentosa remotissima. Petiole  
tomentosi. Pedunculi ex articulo ramorum ex parte crassiores, elongati. Pedicelli plures  
semi-patricares; tomentosi. Foliiuli ovato-oblongi, attenuati, patricares, tomen-  
tosii

amplexicaulis Apuleius

Habitat in pascuis andis arenosis circa urbem Savana hieb. Richard  
glabri. Caulis semipedalis, erectus, glaucescens. folia pellucida, cordato-ova-  
ta, bispinosa, opposita, obtusa fima, venosa, subtus glaucescens, basi  
plana. Pedunculus terminalis: umbella 2-3. mult-floro

pauperula Asclepias

Habita in herbis humidis Carolens inferiori Herb Richard  
Caulis versus sequipedalis, glaber uti tota planta, simplex. folio oppositis, petiolata  
moda, sessilia, remota, liraeana, basi plane. Pedunculus terminalis, elongatus  
bifidus. Umbella 8 floræ. Petala oblonga

notis 3 mentis

hybrida Apuleiar

Apuleiar variegata Walth.

Habitat in Carolina herb Richard:

glabra. Caulis herbaceus; simplex. folia petiolata, patentissima, bipinnata, oblonga, obtusa, superma acuta, venosa, obsoleta nervosa, oculo armata marginata villosa. Pedunculus terminalis. umbella gemina, multiflora. Pedunculi et pedicelli pubescentes.

Debris Asperas

Habita in America septentrionali herb. Ach.

Paulispfefferia opus? Vers, uti tota planta glaber. folia petiolata, opposita, bipinnata  
cana, lanceolato-oblonga, acuta, basi plana, tenera, venus pime venata. Um-  
bella laterales et terminalis; folio breviori, multi-flora. Pedicelli pubescentes. Caly-  
cis colorati; reflecti; glabri. Flores parvi

obtusifolia Apuleas

Habitat in Amer. septentr.

glabra, herbacea. Caulis teret. folia pectinata cordato-oblongo, obtusifolia  
3-4 pollicaria, vix venosa, subtrigona, pollicem usque per latitudinem

*Aplospad.*

Habitat in Cordilleras Chilis herb L. perenne

Panicis volubiliis, frutescens. Rami filiformes, canescentes. Sola petiolata, terminalis, superem pinnis minora, frequentia, ovato-oblonga, supra recta, supra oblonga, obtusa cum acumine brevi, glabra, margine costataque subter villosula, margine punctum crassiora, basi plana. Petioles breves, incani. Umbella axillares, alterno, multiflora, villosa, pendulata, folio triplo breviora. Flores minutus. Petala glabra, oblonga. Solleculi sphaerulatae, pallidatae.

Speciem affinem inter Commer.

pecta Aeglepsas.

Habta herb. Gus.

Pauli herbariorum? Veres; glaber, levigatus, glaucescens, subtilissime striatis. Sola oppo-  
sitea, sessilia, bipinnata, cordato-ovata, obtusa, latoe glaberrima, venis nescien-  
tibus pecta. Umbello Verminales; gemino, pedunculata, foliis longiori; multi-  
flora. Pedunculi rotundatae, glabri uti pedunculi. Flores albi?

glauca Apuleius

Patna cynota herb. Aus.

Caules herbae, erecti, subtilissime striatus; glaber, superne villosus abjectus. Sola  
oppofita, petiolata, 2-3 pollicaria, oblonga, utrinque glabra, supra non venosa, subtria-  
glauco-viridia marginem vellofa, subvenosa, acumine brevi terminata. Petoli  
angustulati. Pedunculi attillati, solitarii, terminalis gemini, pollicaria, vello-  
si. Umbella multiflora. Petala alba. Calyx 3 laciniis linearis-lanceolata.

polytaenia A. folia lanceolatae corbis oppositis petiolatis, caule saffnitroso  
umbellis terminalibus lateraleibusque Walt. car. pag. 107

Habitat in Carolina

non vidi

pedicellata. A. caule brevi; umbella paniciflora, neutrae exornatae.  
cellata Walt. fl. carol. pag. 106

Habitat in Carolina.

non vidi.

arbore pecto A foliis revolutis ovatis, l'aula fructicosa puberulosa Linn. Mant 26  
L.V.P. 259  
Apocynum fruticosum Latsi et undulatis foliis, floribus umbellatis, fruo  
ta fuliginea Brunne. Apr. 31. V. 13.  
Habitat in P. b. pree monte sit.  
Caulis ramosus <sup>crustulosus</sup> spicatus penne anserino purpurascens  
vellopi propositi superne. Tollea se filos foliis angustis  
mucronata subtriangulis glaberrimis excepto costa.  
supra folio longitudinali vellopa pubes nervis venosis  
venis extantibus umbello superne pedunculata  
lateraliter hospitissimi incani.

— *les folios gla* — *ramis vellopis*  
*umbellis hospiti*

fruticosa a foliis revoluti lineari lanceolatis, caule fructuoso lato s. V. pag  
Spec. pl. nov 314\*

Apocynum erectum africanum vellop fructu foliis 23  
f. 24. Mill. Det. 1.45.

P. costifolia Lin. f. V. pag 260\*

Apocynum erectum et atius, foliis angustis foliis, foliis viles vellosi Platten  
aln. 36. f. 130. fig. 2.

Habitat in Cap. b. f. 8

Caule superne pubescens. Folia breviter petiolata utraque acuta  
glabra bipinnicoma inter nodis longiora. Umbella latera  
ex folio longiorer 15 ocelluli inflati aculeati sed metu-  
ncta non compressa abque angue, cuius loco auricula dico  
longiores reflexa. Lin.

*Tulicifolia* A. foliis lanceolatis glabris subtiliter nervosis; caule  
fruticoso scandente

Habitat in Insula Borbonia 5

Rami glabri ramulis alternis apice tomentosis alterno  
foliis iunctaque attenuata subsp. breviter petiolata sed  
bipinnata et ultra, supra exalata <sup>borei</sup> nuda avenia enervia  
subtus pallida costa subvillosa nervis plenum subop-  
positi transversi. Pedunculi laterales erat angustula-  
ri uti calycis tomentosi florae racemosi. folliculi alte-  
ratabiles omnes levigati ferrugineos

~~multa~~ foliis lanceolatis scabibus ferrato emarginato.

~~Padentia bona pax~~

~~Habitat in Can. b. pax~~

~~Paulis ramosus teres. q. folia opposita adnque acuta serratus utique  
vibus distans profundi angustis~~

fibinæ a foliis revolutis linear-lanciolatis oppositis vernisque, caule decum  
bente l. v.

Aflepeas fibinæ Marr. in com. Gott 1779. p. 23. t. 7.

et Aflepeas montana humilis, radice longius proferente lini foliis Annem  
H. mth. 10.

Habitat in Siberia

Carlo fuit hamœur glaber superne in ramos aequaliter diversis caule.  
altioris. folia pectinata angusta utriusque attenuata be. s. tri  
pollicana utriusque glabra pedunculi laterales umbelle  
prolificos. flores parvi

caule glabro

— umbelli lateraliibus foliis brevioribus

*teretigloba* A. foliis linearibus <sup>margine pelopusticale</sup> glabris, umbellis lateraliibus <sup>foliis longioribus</sup> caule  
peloso.

*Asclepias* foliis et linearis lanceolatis, floribus umbellatis, umbellis  
alternis erectis, caule erecto Gmel. fl. fib. 4. p. 70. tab. 42.

Habitat en Sibinia

Caules erecti, fructuosa <sup>plures</sup> superne ramoscentia <sup>rami</sup> idem simplices  
<sup>caule actinomorpho</sup> rami simplices. Folia breva petiolata linearia utrinque  
basi reflecta <sup>subcordata</sup> acuta pollucens. Pedunculi foliis duplo longiores  
pedicelli umbella simplicia pedicellis angustiulatis  
fatu corolla purpurea

Facies Asi: sibirica diversa foliis oppositis, floribus majoribus  
foliis brevioribus petaliis linearibus acutis

~~renanda~~ ~~undulata~~ Apleias folia revoluto-expansis pilosis (<sup>sub nomine</sup> ~~undulata~~ fob) Lin. S. pag. 260.  
Habitat in Cup. b. fuci

2122 setosa Aſilepias foliis līneāibus revolutis oppositis, caule fructiſco.

Tab. VIII. a foliiculis

Aſilepias setosa; foliis margini revolutis Foſti Difer. pag 51 n 76.

Pauli Greki, fructiſco, Veles.

Rami croſſi subvelloſi; a capo foliorum minicati, crassiflora penne columbita.

Foliā omnia opposita, foliſſilia, approximata, līneāia, <sup>bati</sup> revoluta  
~~ſt~~, acuta & labecimata, subtus pallidiora p. polliciana.

Pedunculi interfoliaci, foliarii, subvelloſi, longitudini foliorum,  
umbelliferi umbelliferi

umbello erecta, quinque floria

Corolla reflexa, magnitudine Aſl. fructiſco

Velliculi inflatii, orato & cūnmati, hispedi, ſetis proprieatate  
liberis ab Aſl.

Differentia: fibula caule fructiſco erecto, foliis omnibus opperti  
hi, umbellis pauci floris, floribus majoribus vindabis.

feliformis a. foliis feliformibus caule exerto, umbellis latero-lobis elongatis  
pedunculatis. Lin Suppl. p. 169. R. p. 260

Habitat ad Cap. b. p. 1

non vidi

*undulata* a

*vesticillata* *Alepis* foliis revolutis linearibus vesticillatis, caule erecto Lin Spec. p. 3154  
P. V. pag. 260

*Apocynum manianum*, foliis angustispinis stellatis Pet. mag. bog.

*Apocynum manianum* erectum, linearis angustispinis foliis umbellatum  
Platn. mant. 17. t. 336. fig. 4.

*Alepis* foliis vesticillatis linearis etaeis Gronov. Viroy. 26.

Habitat in Virginea & herb. fusi.

Toleà saxe quaterna vesticillata. Pedunculi umbelliferi oppositiflo  
li. Flores albi Lin Spec.

Caule teretis superne lineo villosa decurrentes. Flores quaterna  
scaphia, sequi pollicaria, glabra. Umbella axillaris, ut folia vesticilla  
ta, ternis. Pedunculi foliis brachioribus villosi. Flores pauci.

non vide

Mexicana Afilipesas foliis verticillatis pinnis lanceolatis glomeribus  
umbellatis Cavanilles. at 1. p. 42. tab. 50\*

Habitas prope Mexico 3<sup>1</sup>

non vidi

Citrifolia A

Aple piar & Citrifolia Gaegr. coll. 2 p. 290.

Habitat in America Y

Caules erecti, simplices, teretes, pedales, ad centrum villosuli. Rola oppo  
site, petiolata, ovato-lanceolata acuta, repando-undulata supra  
glabra subtus glandeo ope lenti pilosula, quadripollia ana. Umbel  
la terminalis, sive una vel altera axillari hemisphaerica exita  
rigida, densa. Flores albi magnitudine af. cerasifero Gaegr

non vidi

nubra Asclepias foliis ovaliis, umbellis ex eodem pedunculo communis planibus. L. s. V. p.

260 -

Apocynum canescens simplici annus, foliis ovaliis acuminatis alternis, planibus  
in pedunculo umbellis floribus. Virg 27.

Habitat in Virginia

non vide

Tuberosa a foliis alternis lanceolatis, caule divaricato piloso Lin. s. v.

Apothynum novo anglio hispatum, Tuberosa radice, floribus aurantiis  
Herm. Lugd. 646. t. 647. Tell. elth. 35. v. 30. fig. 34.

Habitat in America boreali <sup>angustifolia</sup> 4

Paulis hirsutis. Solea breviter petiolata, bipinnatae frequentia  
subtriangularia pedunculi superne terminalis, sope gemini  
hirsuti pinnariae, pedicelli congesti peduncularum plures  
corolla aurantia

Linaria Ophryas foliis graris, pubulato canaliculatis: umbellis  
Cateralebris multifloris Cav. cc: 1. pag. 42. Tab. 57x  
Habitat 74.

non vidi

Pipitacea A. caulebus fructuosis articulatis aphyllis; umbellis laterilibus  
terminalibusque fructibus

Oleopiat Pipitacea: caulebus fructuosis, articulatis, aphyllis;  
difflopi; umbellis ramulorum terminalibus Forsk. descr.  
pag. 50.

Habitat in Asabre felici;

Tristis bicubitalis: a morphismo difflopi: caules oblique  
corulei farina tenui albescente adpresi non volu-  
biles. Rami oppositi. Articuli triplicares; genuin-  
es constanti. Pedunculi semiunguisculares. pedunculus  
brevissimus vel potius medianus ramuli adpresi pedi-  
cellos plurimos simplicibus.

aphylla L. caule volubili, corymbi conjugati globoſi Torr.  
fl. Crat.