

Appalathui

Spinosa A. foliis papilionatis lineari-bus nudis spinam gemmateam circum
stantibus L. N. V.

Geniostella spinosa africana Lamiis foliis Breyer. Cent. 7. 26.

Habitat ad P. b. Spei

Rami sparsi tuberculati, superne ope lenti villosi cespitiosi. Folium
5-6-lemnuguioulana glabra incurva. Spina axillarem flavam
si est longitudine foliorum patens. Pedunculi axillares
solitarii uniflori spina brevior. corolla glabra lutea
legumen ope lenti villis adpressis

confer cum Breyer. tab 26
Dedit Thunberg no 7.

unifloris

Pluk. 8. 297. fig. 6

————— pedunculi solitarii brevissimi

rad. ofa.

A. foliis linearibus obtusis glabris petiolisque, spinis stipularibus solitariis
Spinis terminalibus hirsutis

Habitat in Cap. b. p. 5

Inter ramis teretibus cortice rimoso superne villosi
adspersis tuberculis villosi majoribus quam in reliquis
speciebus. Folia linearia teretibus ^{vel} ~~planis~~ ^{per} ~~longis~~ ^{per} ~~longis~~ ^{per} ~~longis~~
petiolis variis adspersa demum glabra. floralia lineari lanceolata
et plana margine ramum reflexa paululum longiora acuta
apice natula hirsutiora. Spina flarescens subfoliis
semunquiculata Inter folia floralia pariter longiora
vel flava patentia. flores defunt in men.

brevifolium a ~~fructis~~ lateralibus solitariis, flosculis alternis remotis angusta
bis; culmo geniculato compresso lvs prodr. pag 26.
Habitat in ~~Gamaica~~

lanicifolia A. f. foliis subulatis glabris, spinis stipularibus ternis, floribus
sist. axillaribus solitariis vellicis villosis stylo exserti
appalathus lanicifolia foliis fasciculatis subulatis, spinis
stipularibus subternis foliis brevioribus, floribus lateralibus bipedis
C. Martii

Habitat in Cap. b. p. 5

Rami vertes cortice rimoso apice superne lenticis tomentosi.
Spina stipularis sub folio patens flavescens basi dilatata axilla
villosa duo ~~ramos~~ et alia breviora ex lupis axilla. Rad
singulum latus. folia plura pollicaria glabra obtusa
Flores axillares solitarii subsessiles Calyx campanulatus
lenticis pubescens villosus reflexus, laciniis subulatis Corolla
major quam in plurimis, vexillum et alia villosa eleganter
ret alia glabra. Carina solide indurata
spine interdum solitaria

muticum *Hibiscum foliis lanceolatis, floribus muticis* Petz. obs. 6. p. 34.

capitata *Apulathus* foliis fasciculatis linearibus acutis, floribus capitatis, bracteis nudis
Lin. Am. Acad. b. pag. 92. n. 36 & d. v. p. 646 * Berg. Cap. 202.

♂ major elatior. Berg. Cap. pag. 202.

Ornith. africanus, genito aculeato foliis recurvis, summo capite copae villosa Plin.
amalth. p. 101. tab. 397. fig. 6.

Genista *Atiquia*, flore flavo, foliis inflexis et araneosa lanugine fimbriatis, sum-
mo ramulo circa flores glomeratis Leb. Thef. 1. p. 30. t. 23. fig. 6.

♂. minor humilior Berg. Cap. pag. 203

Habitata Cap. bono spec. 7

Folia pubescentia. Flores spicati-capitati femine pubescentis. Calyx laciniis
subulatis Lin.

Convenit cum *Chenopoda* foliis fasciculatis; subulosis, caule piloso; capitulo ter-
minati. Differt ab eadem foliis magis incurvis acutis, ad non pungentibus.
Capitulisque nudis, nec hispidis. Florem carina arcuata, longitudine vertice
Lin. Am. l. c.

Folia incurva, pilis raris longiusculis adspersa, coeternum glaberrimum
na brevissimo involucro terminat. Flores in capitulo terminati corolla
glaberrima herb. Royen. edit. Weym.

capitata Berg. ~~secund.~~ herb. Royeni differt in foliis capitulisque his
butis nigricantibus

glomerata A. foliis fasciculatis linearibus acutis villosis incurvatis, floribus
capitatis, calycinis bacinis ovatis, corollis glabris. Gen. Suppl. p. 324. &
L. V. p. 646.

Habitat ad Cap. b. p. 5

Rami ^{subtomentosi teretissimi} conferti villosi plures. Folia frequentia a 9 unguiculata
aequalia. Flores plures terminalis subsessiles majores
Canna arcuata magnitudine vestilli

ene-folia A. foliis fasciculatis lineari-herpeticis, floribus alternis
calycibus lineari-herpeticis L. V. p. 6464

genita aethiopia non spinosa, foliis aeneo-velloso, floribus parvis
luteis: calycibus longioribus in mespi Platin. mont. D. V. 8. 413.

fig. 6

Habitat ad Cap. b. pret

velloso griseo flavescente sericeo. Rami frequentes spinosi.

approximati vellosi. Folia ^{fasciculi} ^{copiosissimi} conferti folia

parva parva incurva ^{calycibus} ^{duplo} longioribus. Soli in ramulis et singulis axillis
solitarii sessiles ^{calycibus} ^{duplo} longiores. Vexillum et carina
eius vellosi

eine onibus herpeticis

calycibus ^{que} axillaribus sessilibus solitariis

uni flora a. foliis fasciculatis linearibus inermibus glabris, stipulis acutis per
sistentibus, floribus solitariis, calycem laciniis cymbiformibus Lin S. V
p. 647* Spei. pl. p. 1001.*

Genista aethiopica glabra, longioribus foliis ex uno juncto plurimis,
flora majore luteo Platan. mont. PP. V. 413. fig. 7.

Habitat ad Cap. b. Spei

Fruit ex ramosis junctis rami et ramuli que frasp ^{tenues pme} ~~subest~~ ^{subest}
Folia parva villosa recta. flores terminalis solitarii ^{brevis pme}
pedunculati. tuberculum barbatus corio stipula
Solia calyces et vexillum villosi hab la manthe

_____ vel cocylibus terminalibus laciniis cym
biformibus villosis - stipulis
Synonymum Plukenetii maxime convenit

muscosa C. folia lineanibus villosis obtusis, floribus lateralibus sessilibus
calycibus laciniosis subulatis, vexillis lineanibus cartis pubescentibus

Habitat. in C. b. p. 5

Rami villosi incani. Folia parva plura. Flores parvi Calyx
campanulatus reflexus. Ala canna brevior apice macula alba

aciculatum A. panicula contracta erecta, pedunculis trifloris, flo-
culis masculinis, pedicellatis acuminatis, semineo sespli arista
to Retz

Pumph amb. C. tab. 5. fig. 1.

Polyantha
multiflora

app: foliis teretibus acutis minimis glabris, floribus lateralibus
calycibus campanulatis vellisque lineis oblongis villosis

Habitat. in Cap. br. p. 5

folia et flores parvis, conspicuis quam in antecedentibus
h. omnes 9. 10. 11. 12. inter se maxime affines
sed certe diversa limites autem aequa inveniantur

Pan

Phalaris semiverticillata panicula ramosa semiverticillatis patentibus

L. W.

acicularis ²
A₃ foliis linearibus obtusiusculis glabris floribus lateralibus
lespibus calycibus ¹ stam⁴inatis laciniis ³subulatis vexillis ⁶pubescentibus
oblongis
Habita in Cap. 6 p. 5

Fruticulus semipedalis ramosissimus diffusus ramuli frequentes
subpubescenti flori folia parva patentia flori parvi
calyx vix villosus campanulatus vexillum angustum
affinis muscosa.

velutina

~~Phalari velutina~~

Fork

vestita A. foliis aceroso villosis acutis floribus lateralibus sessilibus,
bracteis calycinis subulatis vexillis orbiculatis extus pubescentibus
Habitat in Cap. b. spec. 5
Similis muscosa at folia duplo longiora, et Corolla 3 plo
major

incurvatum A. ~~fructu~~ filiformibus subdigitatis: floribus geminatis femineo
pedicellato anfractu, masculo sepli mutico, calycibus univalvibus. Ret. 2.
obj. s. pag. 21.

non vid.

actinocarpa A. foliis acicropis glabris ^{utoulis} acutis floribus lateralibus sessilibus
calycibus urceolatis vexillisque ~~exteri~~ villosis

Habitat in Cap. b. par' 5

Affinis *vestita* at calycis majori villosis urceolatis; dentibus floris
duplo majores acuti per intervalla conf. approximata
nec harpa. Inid. ex erectis

Sub nomine *thymifolia* habui a Burmanno habui at non convenit
cum figura Burmanni nec folia minima

^{Melocoin}
Compressum & spicis subternis, flosculis alternis muticis rachi adpressis
culmo medio articulato compresso, pedunculis longis formis h. prodr
nug. 24.
Habitat in America meridionali &

non vidi

Thymifolia A. foliis oppositis alatis subulatis inermibus glabris brevissimis, floribus
alternis. Lin. t. V.

Genista minima Othiopia, foliis thymi confertis splendens glabris

Pluken. mant. P. 413. fig. 1.

Habitat ad P. b. frei

Rami laxi, tuberculati, uti reliqua partes glabri. Folia opposita
stula. Flores latentes, sepale. Calycis dentes sive mucronat. herb

Royen

~~non satis notum~~

canescenti. foliis fasciculatis subulatis tomentoso sericeis, floribus lateralibus
vexillis pubescentibus Lin. Mant. p. 262. + S. V. p. 647.

Habitat in Cap. b. frei montosis

ramuli ^{utriusque} sparsi canescentes et tomento lanui. folia semirunqui
culana scitiuscula acuti flores axillares solitarii sespales
calyces ^{campionulati} villosi, laciniis subulatis. ^{longitud. ne, calycis} vexillum ex his sericeum
canna glabra

incurvata

A. foliis fasciculatis linearibus glabris ^{incurvis} floribus lat. calycibus lateralibus
pediculis ulatis subquinque dentatis corollis glabris

Habitat in cap. b. p. 1

ramis tuberculatis villosis subtomentosis. Folio ^{uniculis} in ramulis
copiosissima semiunquiculata obtusa. Pedicelli ^{uniculati} parvi breves iniani
Flores longitudine foliorum. Calyx ^{uniculatus} campanulatus dentibus quinque
minutis obtusis, glaber purpurascens. corolla tota glabra rufescens

Nendula

A. foliis lineariibus glabris obtusiusculis, incurvis, floribus terminalibus racemosis pendulis glabris

Habitat in cap. b. p. 5.

Rami cortice rimosis glabris elongati. Ramuli simpliciter sparsi
patentes frangi purpureo-purpureo subpubescentes. folia
copiosa in pagulo fasciulo semina utulani flores
tres plerumque quatuor versus apices ramulorum bractea
duo lineares utriusque dentis subulati calycis in mucronem
flavescentem attenuati Calyx ovulo armato vix villosus
Corolla flava vasillum vili rari lente vixi et alia
glabris

myurus M. spicis lateralibus, vulvulis exterioribus planis ovatis, apice
cadentibusque emarginatis, culmo adscendente Sw. prodr pag. 25

Manisuris myurus Lin. mant. p. 300 s. v. pag 907

Genibus granulari, racemis geminis, fructibus glotopi rugoso seti
culati Lin. Mant. 475. s. v. pag 907

Habitat in India orientali

retroflexa. Cypripedium foliis fasciculatis subulatis glabris minimis, ramis filiformibus patentissi-
mis, floribus solitariis terminalibus Lin. S. V. per. 647

Habitat in Cap. boreo spec. 7

a. galloides L. Mart. herb. h. b.

non vidi

negra a. foliis fasciculatis linearibus obtusiusculis, floribus capitato spicati
pubescentibus Lin. Mant. 2 62. & S. V. p. 646.
Habitat. in C. b. p. montibus 5

Rami teretes ramuli proxi villosi. Solea parva glabra
calycis florum fasciculi foliorum conferti. flores sup. p. in ra
mulis sessiles solitarii alterni conferti spicati. Calycis f. p. d. d.
quasi laciniis ovatis obtusi. Verrillam et carina p. d. d.
villosi.

glabra

f. p. d. d. alternis calycibus alternis
laciniis ovatis obtusi

Vermiculata

A. foliis fasciculatis lineariibus obtusis ^{glabris} laciniis calycinis
ovatis acutis bracteis lineariibus floribus spicatis villosis

Aspalathus vermiculata ~~L. Mark.~~ foliis fasciculatis minutis
obtusis - glabris floribus lateralibus racemosis subhirsutis. La
Mark.

Habitat in Cap. 6. spec. 5. f.

Similis sepe bracteata, exificatione # nigra tubercula et ramuli
villosi folia parva crispifolia calyx gibbosus leneis obscuris
elevatis seculum uti reliqua petala et huius pedis villosi
fodidior tecta

~~Corymbosa ^{ovato-}Tournefortia foliis oblongis glaberrimis, fructu acido~~

Habitat in Insula Francis. Thourty

~~Arboris ^{fruticosa} Ramis superne oppositi cortice nigro teretes ^{et fere oppositi}
Folia ^{ad} vasa apicem ramorum, petiolata, conferta oblonga, integerrima acuta
glaberrima, subtus pallidiora, pollicaria. Petalus folio duplo brevior
Pedunculis axillares, solitarii oppositi foliis breviores bifidi, apice velut
^{vati} Flores minuti calyce pubescente calicinis ~~vatis~~ indentatus~~

an lauzera et folia opposita

bracteatis
sermunculata.

St folus fasciculati lineantibus obtusi glabri ^{laciniis calycis}
~~canis lacini ovatis acutis~~ bracteis ^{concoloris imbricatis} obovatis acutis floribus ^{sermunculatis}

Habitat in cap. b. p. t.

Fruticulus facie app. nigri ex siccatione niger. fr. ramulis
ubi tubercula ^{sub} quibus infident foliis villosi. Folia parva
frequentissima flores spicati capitati bractea st contigua ovata
glabra margine flavescenti villosa calycem ad extus totum
infl. ne v. v. laciniis calycis ovatis acutis villosis. petala
omnia extus villis foetida flavescentibus secta

~~Oxycoeloides lightfootii~~

Spicata

A. foliis fasciculatis tubulatis acutis subt glb pub pilosis
floribus spicatis hispidis calycibus lacinis tubulatis
Appalathus nigra La Mark qui specimen commu
nicavit

Habitat in Q. b. sp. 5

Rami parvi villosi vellis crispis. Folia vix unguiculata
exspicatione nigra inferiora glabiora superiora pubes
centia nervis acuta. Flores superiores in ramulis
sespiles axillares solitarii conferti in speciem subpeltatis
lacina calycis hispidus pubis sordide griseis. vexillum et lani
na sordide griseo fericeis

Jord Da

Al. foliis lineariibus lobis pilosis capitulis terminalibus
hirsutis

Habitat in Cap. b. p. i. 5

Folia unguiculata. Calycis lacinae subulata longitudine
fere corollae. petala extus uti Calyx pilis foveae cineris
hirsuta.

7
Serratim A. *Spica simplicii imbricata* pniebus binis glorum anstatis sepaliū, binis
muticis pedicellatōnū, calycibus univalvibus Retz. off. s. p. 21.
Habitat ad oris fluminis in Bengala

araneosa A. foliis fasciculatis petalis inermibus hispida, floribus capitatis

Lin. S. V. p. 647*

geneta aethiopica, flore flavo, foliis inflexis et araneosa lanugine
limbratis: summo ramulo cincta flore glomeratis Planch. mant.
D. D. 414. fig. 4.

Habitat ad C. b. p. 5

Rami teretes per intervalla approximata caesae glabra
superne villosa villi flavo-rosei. folia subulata
explicatione nigra undique adpressa punctis elevatis piliferis
base ramuli laevia et glabra, unguicularia patentia
calyx hirtus laciniis lanceolatis tuberculatis hispida. Vexillum
extus adpressis pilis parvis adpressis flavis nitentibus. Corina
fere glabra

— subulata — tuberculata hispida

Asp. capitatus major Benz Cass herb Abyssin^{ica}

genis foides Aphel. foliis fasciculatis filiformibus ^{glabris lobatis} lobatis, calycibus subracemosis pendulis
et collis glabris Lin. Mant. 2 67 * S.V. p. 647.

Habitat in C. bonoppei, e fusuris repuum

Caulis frutescens, 9 pedalis, erectus simpliciter ramosus, cortice reticulato; gem-
mis albo villosis. Folia filiformia, glabra subserotina, semipollicaria.

¶ rami in inferne
nisi aliquot raris
pomis ad prespi-

missis emi que len-
tis subvillosis

¶ Vexillum subvillosum
Carina valde incurva

Flores terminales subracemosi, 3 f. 4. penduli. Calyx glaber dentibus
brevis: Bracteis duobus minutis ^{et pediculis} ~~et pediculis~~ glabra, lutea. Stylus exsertus
Lin. Mant. 6. Legumen villosum in pum

pedunculata A. foliis fasciculatis subulatis glabris, pedunculatis filiferis
mibus foliis duplo longioribus. L'Herit. sect. angl. Tab. 26. Curtis bot mag
tab 24
Habitat ad C. b. p. i. 5

non vid.

biflora A. foliis teretibus mucronatis glabris, floribus terminalibus
geminis, calycibus glabris, ^{5-natis} vexillis fereis

Habitat in Cap. b. p. r.

Caulis, ramis paniculatis ramis sparsis frequentibus perpaucis
sistentibus uti rami, attenuatis, vellis minutis raro fereis
adspersis, tubercula parva villosa. folia verta. Brevis
calyx campanulatus dentibus ovatis acutis.

glaucum Lind. panicula foliacea, involucriis calycibusque bifloris, florum
sessilium calycibus trivalvibus: pedunculatorum Retz off 5. p 20.
Habitat in India orientali

verniciosa H. foliis fasciatis alatis filiformibus, gemmis vernicosis tomentosissimis
nudo- lin. P. V. p. 646*

Habitat ad Cap. b. p. 5

Frutex bipedalis lignosa gemmis f. vernicis magnis. folia carnosa
glabra cicuticula prolucida. Flores laterales foliis serratis
sessilibus Calyx laciniis ~~pubescentibus~~ pubescentibus vel illis villosis hinc

Seb. mus. 2. tab. 62. fig. 7.

herb
Roy

Spemula 1. 2. brevis sive in gemmis, adentem foliorum in herb. L. Mart.
sed sub nomine
veratrum seneceum: Calycis laciniis pubescentibus longitudinem fere
corollae. folia inermia

non vid.

Aproites A. foliis fasciculatis subulatis mucronatis glabris, caule villosis,
floribus paucis. Lin. L.V.

Genita a *Aproites*, juniperinae pungentibus foliis, otheoclea, floribus
saturate luteis. Planch. man. D. 413. fig. 2.

Habitat in C. b. p. p. t.

Rami teretes. Ramuli frequentes ^{pauci} ^{rami} ^{superne}
ferugineo villosi tomentosi. ^{pinnae ~~truncatae~~} ^{linguiculatae} ^{rectae}
glabrae coriatae. Flores axillares solitarii simpliciter. Calyx
complanatus ferugineo villosus. Lacinus subulatis. Vexillum
extus leviter villosum canna et alba glabra
Syn. Seba recte excluditur cum ad *A. hystrix* pertinet

Chenopoda A: foliis fasciculatis subulatis sericeis apice patulis mucronatis
hirs, floribus capitatis hirsutis sericeis Linn. L. V
Geneta africana Cuba, floribus hirsutis in capitula lanuginosa con
globatis, foliis comoda aculeatis subhirsutis Herm. afr. 11.
Chamolant f. Chenopoda monomotapensis Breyer Cent. 23. T. 11.

Habitat ad Cap. b. spret

Rami ferrugineo hirti folia sempolluciana nigra pungentia
sca puberulis piliferis adspersa ubi flavescens

— pungentibus nigridis mucronatis hirti

non vidi

Cilicis Aphyllae foliis fasciculatis geliformibus scabris, floribus terminalibus sessilibus, verticillis
pubescentibus Mant. 2624 S. V. p. 647

Habitat in P. bono huius campis arenosis

Caulis fruticosus, bidentatus, determinate ramosus, verrucis nudis, ramis subulosis
Folia, ovata, verticillata, acuta, supra plana, subtus scabra: Ve-
nula ciliata et ex nervo adpresso villis raris. Flores sessiles 3-5. terminales. Palyx
pilosus: dentibus subulatis, spinosis, longitudine corollae fere. Corolla lutea: verticil-
lo cinereo pubescente huius. M. L. C.

non vidi

Asparagus A. foliis fasciculatis setosis pilosiusculis, calycibus foliiformibus
longitudine corollae solitariis. An. Suppl. p. 321. + L.V

Habitat ad Cap. b. p. 17

Inter ramos primis, sub pubescentibus. semina a capite foliorum
pubescentes. Folium fasciculatum filiformis f. setacea acuta rari-
tus ad apicem vix digiti minimi transversa longitudine. flores
solitarii sessiles calycis dentes longitudine fere corollae
simuliter pilosi. Corolla vexillum vix pubescens hu-

non vidi

albens *Aphalathus* foliis fasciculatis subulatis lenicis apice patulis, fasciculis floribus parvis
Len. Mart. 261. * L. V. p. 646.

Habitat in Cap. bono spei 3

Caulis prostratus, erectus, cortice fusco rimoso: Ramulis ultimis subtomentosis. Folia
5. apice acuta, patulaque, leniceo-albida. Fasciculi terminales, albo-leniceo-
nervi, plures, glomerati, pedunculati. Calyx pubescens. Bractea nulla caly-
cina, sed 1. sub pedicello. Corolla tomentosa, alba Len. M. l. c.

Rami sparsi glabri herb. Royen. an Len. Ed. J. Brugem

non vidi

hystrix A. foliis fasciculatis filiformibus rigidis pinnatis-sericeis, floribus calice
valibus sessilibus solitariis corollis villosis Lin. Suppl. p. 322. & R. V. p.

647.

Habitat ad Cap. b. p. et uti

Rami villosi ~~tomentosi~~ tuberculi villosi tomentosi. Folia fere
pollicaria sericea patentia parum incurva mucrona pungente
terete terminata. Flores magni. Calyces valde tomentosi
lobis ovato-lanceolatis mucronato pungente vexillum
extus et pagina ^{tomentosa} superiore ad apicem villosam. Corolla glabra

hinc refer. Seba

Tobis sericea. Folia densa albida sessilibus; tomentosa mucroni sub
Royeni

anillans

A. foliis ^{felicifor. ovatis} linearibus a. latis incurvis floribus ^{stellatis} que ^{laesa}
lobis glabris geminis glabris
apicalibus callosa La Marche

Habitat in Cap. b. p. c. t.

Rami per intervalla conferta terna vel 4na. ^{stellatis} in a
ni post capum foliorum tuberculis globosis villosis frequentissi
mis ad spem. folia sempolluciana t. ore trifida apice
subtruncata. Cal. flosi brevis pedunculati superne appro
ximati geminis Calyx campanulatus dentibus subulatis
ore latis villosis. Legumen inaequum.

an verrucosa Linn

Saccharodes A. panicula ramis simplicibus; flosculis geminis, hermaprodito
sepli, altero maturo pedicellato & abscisso, pedicelli rachisque lanato
Sw-prodr. pag. 26.
Habitat in Jamaica

Cucumis