

Appalathus

14 hermannia *A. fruticosa* foliis ternatis ^{lineari-} cuneatis petiolatis calycibus
subcampanulatis ramis spinescentibus.
Pactuus Junosum Alp. exot. 27. v. 26.

Dorycnium foliis solitariis, floribus ad alas confertis Hort.
Cliff. 370+

Adhyllis hermannia fruticosa, foliis ternatis subpedun-
culatis, calycibus nudis Lin. Spec. pl. pag 1014+

Appalathus cretica foliis ternis cuneiformibus glabris
lateralibus brevioribus, stipulis obsoletis, floribus congestis
Tithen. Spec. pl. pag 1002.

Habitat in Creta

Surdex ramosis hinc ramis sparsi venter est ultimis
viridi glaucis persisteribus sparsi spinescentes. Folii
parva cum rudimento in axillis brevis petiolata. folii
caespiticia extrosam versus sensim latiora obtusa apice
reflexo, unguiculana lateralibus minoribus. Stipula
foliacea minuta reflexa. flori axillari cinctis 5-
redicellati foliis brevioribus parvi calyx non inflatus

petioli interdum
ut ulli

Sorquodes A. herbaica, foliis quaterno pennatis

acuminatus *Apalathus*

Habitat in Cap-Ispe-herba Martini

Ramosissimus. Rami patentes, villosi, tuberculati, spinescentes. Solia foliorum
lata, minuta, sena, glabra, obtusa, crassa. Pedunculi laterales, uni flori
solitarii vel gemini. Calyces, uti restillum extus, villosi, quinque denti-
ti, dentibus parvis. Bractea dua, minuta, in pedicello.

breviflorus Appalathus foliis subulatis glabris, floribus spicatis, ramis superne calycibus vertic
lesque villosi

Genista africana spicata lutea lanicis folio brevi viridi Rai herb. 3. Dendr. 104.

no 23

Habitat in Cap. b. frei herb. mus. 5.

Onites pedalis. Rami tenues, superne lanuginos villosi. Sola confecta, copiosa,
plumma, semina quicquidaria, patentia. Flores alterni. Calyx dentatus:
dentibus calyce brevioribus

an nova species

Appalathur

Genista minima orthoceras foliis thymi confectis hirsutie pubescentibus Plukh. Alm
165. Phyt. tab 297. fig. 6.

Genista africana frutescens lanis incana folus Tournef. F. R. h.

Habitat in Cap. b. frei herb. mus. t

Stimulus facie Appal. enicadi, totus villosus - hirsutus excepto caule, subsericeus.
Folia subulata, parva, s. g. approximata. Flores superne in ramis, alterni, subpi-
cati. Vexillum villosum. Calycis laciniis longitudine corollae.

Camphorosma odor. Aspalathus villosa-hirsuta, foliis linearibus, floribus alternis subsessilibus,
calycibus linearibus

geneta africana camphorata foliis villosis floribus parvis Rai. hist. 3. Dendr. 105

no 44

~~geneta africana~~
Habitat in Cap. b. p. herb. Mus.

an nova species?

nubeni: Aspalathus glaber, foliis fasciculatis subsensifoliformibus floribus axillaribus solita

ris

Genista agrifera foliis capillaceis floribus minoribus luteis Ray hist. pul. 3.

Dendrol. 105. no 30

Habitat in Cap. bono spai herb. mus.

Antea, totus glaber. Rami sparsi, distander, angulati. Folia remota, rupecentia
uti ramuli, ~~Folia~~ angulata, 5-6. Calycis colorati: laciniis setosis, longi
tudine corollae.

Aspalathus folio sericeo: inferioribus ternis superioribus solitariis floribus ca-
pitati

genistella minor non spinosa aethiopia folio serpylli candido ut et sericeo
instar mollebus 13 regn. prod. 2.

Genista africana frutescens spicata purpurea folio angustifolii Oldenlandi
Tours me fuit

Herb. Vaillantii

Species nova non est quo pertinet synonymo nunc non recordor

vermiculatus Aspalathus

Habitat in cap. b. spici herb. la Martini

Ramosissimus, virgatus: ramuli filiformes, canescentes, tuberculati. Siliaplura
parva, carnosa, obtusa, mucosa, glabra. & locis laterales, solitarii, sparsi, breviter
pedunculati. Calyx campanulatus, sericeus, dentibus ovatis, minutis.
Sextillum alio et caetera extus villosa subpaneei

habeo

Aspalathus

Aspalathus cespitosa ha Mart?

Habitata Cap. b. p. t. h. ha Martini 5

Folia terna ter na sessilia, lanceolata, ^{alt. o lato, & subangustiora, foliata.} mucronata, p. Flores Verminalis 3-4. amul-

Subcylindrici villosi. Rami dichotomi

Striatus *Appalathus* foliis subulatis villosis, apice coloratis, calycibus striatis den-
tibus ovatis, vexillis subrotundis extris femineis tomentosis
Appalathus canescens La Mart

Habitat in Cap. 6 spec. herb. La Martii

Rami teretes, glabri: Ramuli parvi, incani, tuberculati: tuberculi incani
Folia fasciculata, subtentia, villosa, acuta, apice femineo, semiu-
guiculata. Flores cataractae, simpliciter, solitarii. Calyx campanulatus, femi-
neo tomentosus, fimbriatus, dentibus ovatis
prope caniscentem collocanda

Apulathus

Habitat in Cap. b. p. herb. La Manthui

Affinis *Cyrtopoda* La Manthui diversa vix videtur. Solea inermis ^{pubescens} pappi
ma tomentosa. Ramis non tuberculati. Calycis breviter pedunculati
bracteo duo subulato tomentoso, uti vertillum, lanis et alio extus
Calycis dentes ovato, parva

nurspurca *Asplenium*

Habitat in Cap-6 p[er] h[ab] La Martini

Ramae purpureae, superne villosi, amulopi: ramuli parvi, filii formos.

Folia fasciculata, setacea, acuta incurva, vix unguis ulana, tenuia,
pilosula. Flores axillares sessiles, solitarii. Calyx pilosus: laciniis longioribus
vix Corolla. Corolla glabra

mollis *Appalathus*

Habitat in Cap. b. pra. herb. La Martini
villosa, canescens. Folia subulata, brevia. Flores laterales, sesplor. Scillum
oblongum.

det. La Martini

Tuberculata Appalathus

Habitat in cap. b. spec. herb. Royenii 5

Rami teretes, tuberculis pulverulento tomentosis nodosi. Rami e tomento pulverulento
tenuissime incani. Folia fasciculata, plura, teretia, crassiuscula, fere pollicaria, iner-
mia, glabra, patentia. Flores axillares, solitarii, sessiles, parvi, lutei, glabri. Calyx
dentibus 5que setaceis.

Truncata *Alphalathus*

Habitat in Cap. b. spec. herb. Royeni 5

Truncatus. Rami parvi, glabri, teretes: ramuli articulati, apice canescentes. folia
scapula, terna, linearia, vix semiangulata, acutiuscula, subpicea, pubescentia,
stipulae duae ovatae, minutae, adpressae. Pedunculi terminaliter, 1-2 flori. Calyx unico
latius, truncatus. Corolla mutans

gibbosa. *Uppalathur*

Habitat in Cap. b. p. herb. Roxyeni 5

Rami teretes, virgati, erecti, glabri. ramuli patentesissimi, alterni purpurei, villosi. bractea carnosae, mucronata, acuta, glabra, subovata, supra plana, subtus convexa, adpressae, basi subgibbosa, cum fasciculo foliorum (3) in axilla, folio intermedio longiore. lobe viridia, distantia. Flosterminalis solidarius, pedunculatus, a. galeoidis, minor. vexillum extus villosum. Corolla et alae glabrae. 13 nectea duo minuta, opposita ad basin calycis. Calycis lacinae subulatae.

habes

Calcani Apalathui

Habitat in cap. b. p. herb. Progeni 5

Rami p. 4. s. verticillati, erecti, simpliciter vel apice interdum iterum ramulosi.

Aspalathus

an Aspalathus fasciculata foliis quinis sessilibus brevissimis papulosis umbri-
cis, floribus axillaribus Burm. prodr. fl. cap. pag 21

Habitat in Cap. b. spec. herb. Royani 7

Rami parvi, elongati, interdum 3-4 verticillati: ramuli superne approximati, semi-
pollyares

habes

Apalathus

Habitat in Cap. b. pui herb. Provent

Rami cortice nriso, superne uti ramuli teretes tomentoso-caniscentes, nigri: ramuli
alterni, distantes. Folia fasciculata, subulata, spina terminata, unguiculata, teretia
pungentia, glabra, plum, tuberculo tomentoso ramulorum insidentia. Flores laterales sili-
ces, solitarii, magnitudine Cl. verrucosae. Calyx dentibus quinque, corolla mul-
to brevioribus. Vexillum villosum
affinis App. verrucosae diversa tamen videtur

Appalathus

Habitat in Sup. b. prae herb. Royen.

affinis *Cnicifolia* Bergii, an eadem? Erutem rigidum nudo, cortice nudo: rami
ramulique frequentibus fractis. Folio fasciculato, villosa. Flore laterales, sesplis,
solitarii. Vertillum Yonemtopum.

4 flora: Appalatus

Habitat in Cup. b. frei herb. Royen: 5

lobes

erinacea Appalathus

Habitat in Cap. b. paci herb. Royen. 5

Regda. Rami frax siglabri: ramuli frequentes, patentiformi, bipollicares, funescentes,
vellos-canescetes.

habes

Spiniflora Elspulathui

Habitat in Cap. b. pui herb. Royen. 3

Rigidus ramosus, spinosus. Rami teretes, cortice nudo. Ramuli frequentes, sparsi, ramu-
losi, spinoscentes; spina subulata, purpurea, villosi, subanescentes. Solia flori-
culata, parva, acerosa, mucosa rigida ter murata, patentia. Pedicelli 3 versus api-
cem spinulosi, uniflori, villosi, canescentes. Calyx villosus: laciniis subulatis. Venti-
lum et carina extus villosa: Ala glaberrima. Legumina villosa, micana

Aspalathus

Habitat in Cap. b. spici herb. Desfont.

Rami teretes villosi-sordide cinerei. Folia cincta 10, fasci ciliata, subulata, tub.
ciliata, tuberculis hirsutis, costarum glabra. Flores sessiles, solitarii, caxerules.
Calycis lobis, uti foliis retillum extris ferrugineo villosis tomentosi. Corolla
purpurea, apice subvillosa.

Spinescens Aspalathus

Habitat in Cap. b. spui herb Royen t

Rami frequentes, glabri, alterni, patentissimi. Folia plura, fasciculata, crassifolia, glabra, teretiuscula, vix unguiculata, obtusa cum mucrone minutissimo: ramis c. spinescentes, foliosi et floriferi. Flores axillares, solitarii, brevissimi pedunculati, Bractea 3. lineares. Calyx glabriusculus, coloratus: laciniis ovatis, acuminatis, purpurascens. Corolla glabra, flava. Vexillum purpureum

bracteata *Opulatha*

Habitat in Cap. b. pui herb. Royu. 5

Rami fraxis, frequentes, villosi. Folia patentia, recurvata, crispifolia, margine
pilosula. Calyx pilosus. laciniis subulatis, longitudine corollae. Vestitum est
villosum

Cystifoides Aspalathus

Habitat in Cap. b. frei Herb. Royeni 7

Truncus subdichotome ramifus: rami subdivaricati, superne hirsuti, striati, angulati,
Folia sessilia, ramulorum ternata, unguiculata, linearia, patentia, acuta hirsuta
ramulorum ^{ovum} fasciculata, minorum, villis brevioribus vestita. Flores in pici s' ter
minalibus; 2-3 pollicibus, distantes, flavi. Bractea 3. lineari lanceolata,
longitudine calycis et ad ejus basin, hirsuta uti calycis. Calyx campanulatus: la-
cinis quinque linearis, recurvo, corolla brevioris. Vexillum uti carina villo-
sum

Ju' ni penna *Aspalathus*

Habitat in Cap. b. pici Herb. Royani &

Truncus rigidus, cortice rimoso, glaber. Rami patentissimi, frequentes, alterni. Folia fasciculata, patentissima, teretia, spina pungente Vermenata, unicum unguicular velique minora. Flores in apice ramulorum, racemosi, alterni parvi, vestillo corinaque villosi. Calyx campanulatus, dentibus quinque spicatis, glavis, corollae brevioribus.

Apalathus?

Habitat in Cap. b. frei hab. Kopeni 5

Stem erectus, fructus, ramifus: rami alterni, simpliciter. Folia ternata, sessili
Canaliculata. Legumen ynotan.

vermiculata *Aspalathus*

Aspalathus vermiculata Lamour

Habitat in cap. b. p. h. h. h. - La Mark 5

Caulis ramosissimus, virgatus: ramuli tenues, in canis. Folia plura, minuta,
glabra, oblonga. Pedunculi axillares, solitarii, frequentes, foliis longiores.
Flores parvi villosi, Calyx canescentes.

acuminatus Appalachus

Aspalathus acuminatus La Mark

Habitat in Pop. b. p. c. La Mark. herb.

Rami purescentes. Folia minuta, mucronata. flores solitarii

revoluta

a foliis lineariibus glabris carnosis revolutis floribus lateralibus
spathis sub solitariis calycibus aequidantibus corollisque glabris
Habitat in Cap. b. p. i. Montem ramuli fruticulosi sordide villosi
Praxi & Yomendo tenui subinerti, tuberculati tuberculi villosi
cinerei folia semiunquiculata ~~crassa~~ ^{pleurica} acutiuscula absque mucro-
ne subtis ^{pleurica} lineae longitudinalis sulcata, petentia verta vel caius
v. pedunculi axillares folia breviori solitarii vel gemini
villosi uniflori. Calyx ^{unicolor} ~~complanatus~~ dentibus aequae lineariibus
obtusiusculis glaber flavus uti Corolla

Picula Poa

~~Jacq. Coll. p. 2. p. 304.~~

~~Gramen pleurum~~

Cynodon spica disticha

Bot. sic. pag. 62. t. 33. fig. 2.

Jacq. obl. p. 2. p. 22. t. 43.

umbellata A. foliis ^{glabris} terribus - carnosis glabris obtusis floribus terminalibus
umbellatis laciniis calycibus oblongis obtusis.

Habitat in Cap. 6 spec. 5

Rami parvi ramuli villosi rari. folia semiunguiculata
floribus terminalibus 3-4 pedunculati. bracteis 3 lineari ad basin
calycis calycis oblongo campanulatis submembranaceis albis
que dentis pubescentibus brevibus violaceis ~~foliis~~ corollae
albido. ~~floribus~~ flavescens glaber. stylus vix illo longior

Celaene ~~ffh.~~ foliis lanceolatis, ~~dalicibus~~ bifloris, pedicellis ciliatis, flore utroque
foemineo anthera tota geniculata Retz. obj. 6. p. 364
Habitat in China

Carnate submucronatus

clavata A. foliis verticibus subulatis ~~obtusis~~ ^{acutis}que glabris, flombus
 lateralibus solitariis subpedunculatis, verticillis villosis
 Habitat in cap. b. p. 5 ^{suberuli parvi tomentosi}
 Rami et ramuli praesi ^{apice} glabri subvillosi folia vix semi
 unguiculata inaequalia. Calyx campanulatus. Dentibus acutis
 subulatis

~~Selenia *subulata* ^{subulata} ~~subulata~~ ^{subulata} ~~subulata~~ ^{subulata}
 definitio anthoni & mark. J. Enc. bot. 190. tab. 47. fig. 2.
 Habitat in Bohemia~~

~~bifolium macrolobum~~

~~Sonapa bifolia~~ Aubl. fl. Guian. pag.

tab. 7.

~~Habitat in Guiana~~

non videri

Carnosa *Apalathus* foliis fasciculatis teretibus obtusis, calycibus subpubescentibus acutis,
corollis glabris Mart. 261 * L. V. p 676

Apalathus carnosa foliis fasciculatis carnosis teretibus glabris sursum incurvatis ob-
tusis, floribus quaternis, terminalibus Berg. Cap. 206 *

Habitat in Cap. bono spec. campis arenosis 4.

Caulis fruticosus, ramis firmis, tripedalis, nudus, determinate ramifera. Folia 4-7.
in Belgica carnosa, incurva, glabra obtusa. Flores terminalis umbella-
ti, 4-6 pedunculis brevissimis pubescentibus. Calyx campanulatus, vix mani-
feste pubescens, acutus. Bracteis 3, ovato-lanceolatis. Corolla glabra, lutea Lin
m. l. c.

ramuli inani. Folia inermia glabra. Calyx campanulatus: lacini
nisi ovato. Flores 4-6 bracteis oblongo herb. Royeni an. Lin: Jacq. Bouzon

exarata A - foliis lineariis incurvis glabris mucronatis subtus linea exarata
tis floribusque terminalibus glabris

Habitat in Cap. b. spec. 5

Rami glabri raris pilis pubescentibus tomentosis. Folia
unguiculata. Calyx glaber profunde fessus lacinus subulatis

~~Setopus Q. spica linear-oblonga, in volucribus setosis, setis enormibus
interioribus basi villosis, villis ciliatis, glumis lobatis Sw.
prod. pag. 26.
Habitat in India occidentali~~

proleptens a foliis lineantibus subternosis mucronatis rectis floribus glabris
sessilibus floribus lateralibus simplicibus verticillis villosis

Habitat in C. b. p. 5

Rami et folia ovulata terminalia adpressis velis raris primis adpres-
sis. Calyx campanulatus profunde fessus laciniis fimbri-
atis linearibus lanceolatis

galeoides A. foliis fasciculatis linearibus coriatis, pedunculi bifloris elongatis
apice foliosi Lin. Mant. 260. * P. V.

Aspalathus galeoides: foliis fasciculatis subulatis inermibus glabris,
gemmis remotis, caule procurrente Berg. fl. Cap. 210

Habitat ad Cap. b. p. t.

Caulis pedales tenues glabri pauciflori ^{inapertis ramis rami}
li frequentes sparsi simpliciter filiformes. ^{st. not. approp.} folia subulata
inermis ^{inermis} glabra ^{inermis} femur ^{inermis} angustata ^{inermis} pauciflori
recurva. Pedunculi laterales et terminalis biflori
calycis ^{inermis} ^{inermis} lacinus subulatis
verruca in meo specimine nullo adspicit

anflata A foliis linearibus mucronato aristatis glabris floribusque terminalibus
solitariis calycibus glabris vexillis subullosis

Habitat in Cap. b. frei

Ramulibus frequenter squamis uti raris reflexis pubescentibus
folia parva patula parum incurva pallide viridia mucrone
mucronate flavescente ^{cupisata} terminalia. pedunculus terminalis brevis
similis solitarius, floris. calycis reflexis glabris laciniis
5que sublancoatis in spinulam desinentibus. vexillum adpressum
villis aliquot raris superne reliqua petala glabra

triflorus

A. foliis oblongis carnosis glabris mucronato subpergentibus; floribus terminalibus subternis, calycibus glabris & illis subulosis

Habitat in Cap b. p. 5

Stami et ramuli prope teretes purpurascens apice villosi - flos-
culi foliorum distantia. folia mucronata patentia mucrone brevi
rigido terminata. Flores terminali terni subumbellati pedun-
culis breviter pedunculati. bracteae duo lineares ad basin calycis. Calyx
campanulatus dentibus subulatis alba et canna glabra
affinis affinis

granulans M. spicis lateralibus, valvulis exterioribus orbiculatis punctato
callofis, vaginis pilosis; Culmo erecto. Sw. prodr. p. 25

Gramen Cyperoides polytachyon, spicis ad nodos et foliorum albis
prodeuntibus Sloan hist. 1. p. 120 t. 80

Cenchrus granulans racemis geminis, fructibus globosis rugoso
reticulatis Cen. Mant. 875 t. 1. v. pag. 907.

Habitat in India occidentali

cupudata A. foliis terribus carnosis mucronato pungentibus glabris
floribus ~~lateralibus~~ ^{terminalibus} solitariis ~~calycibus glabris~~ ^{semples, tubulosis}

Habitat in Cap. b. p. 3

Fruticulus rigidus rami ramulesque patentibus ramuli
teretes tomentosi. Folia distantia breviter glabra patentem
sape octona. flores in apice ultimorum ramulorum saepe solitarii
interdum gemini brevissime pedicellati. Calyx glaber
campanulatus laciniis subulatis. flores ~~pateti~~ vexillum
extus leviter villosum ore latis, reliqua petala glabra
appau anstata

ilicata Cymbachne Roxb. ~~pro~~ obj. pag. 364
Habitat in Bengala.

purpureoviola A. foliis ~~terrosi~~ ^{glabris} tereti oblongis obtusi carnosis, floribus lateralibus
caea solitatis glabris pedunculatis

Habitat in Cap. b. p. 5

Fruticulus pedalis ramis simplicibus frequentibus pappi
teretibus inferne tuberculatis superae leviter ferrugineo subtomentosa
folia parva minutis glab. 4-7ca. pedunculi foliis duplo longiore
uniflori. Calyx glaber, campanulatus dentibus 5que obtusis, purpureo
liens corolla parva glabra purpureo violaceis
affinis salsoleida

Paspalum A paniculo spicis solitariis, pedunculis elongatis. subfastigiatis,
rachis lanata, glomerulis antheris, masculo fertili. Sw. prodr. pag. 26
- Habitus in Jamaica.

Salpoldes
~~microphylla~~ 11 foliis teretibus obtusis carnosissimis glabris, floribus terminalibus

geminis pedunculatis villosis

Habitat in Cap. b. frei 7

Stipulus facie Salpola ramosissimus vixatus ramis cortice per
purascente leviter villosis ^{tuberculatis} ramuli filiformes villosi uncinati
per caput foliorum tuberculi globosi villosi folia minuta tereti
oblonga plura nitida carnosissima. Pedunculi terminales gemini uniflori
breves incurvi & calyx coloratus campanulatus coloratus pubescenti
4 dentibus 5que ovato. petala ~~ter~~ villosa

pyramidalis Melica

microphylla A. foliis ovatis carnosiss. floribusque lateralibus glabris

Habitat in Cap. b. sp.

Interdus similis crispula rami villosi incanis foliis a foliis fere
imbriatis. Folia minuta obtusa. Flores laterales patentes se. lutei
glabri Calyx campanulatus. Dentibus lineari-sublancaolatis

brachem. Ad: specis geminis lanatis, calycem valvula altera acuminata: altera
truncata tridentata, petalo majore aristato Retz. off. 5. p. 21.
Habitat in India orientali.

Seneca a. foliis fasciculatis lanceolatis serratis, pedunculis terminalibus
bifloris, vexillo nudis. Sp. L. suppl. p. 221. & S. V. p. 647.

Habitat ad Cap. b. p. a. t.

Similema apparazoidi sed folia hujus plana capitulis folio
rum nullis floris majores glabri. Vexillum non vellosum
nisi parum in canna dorsali hujus

non vidi

argentea A. foliis vna linearibus fasciculatis seneci, squulis simplicibus mucronatis,
floribus fraxi tomentosi. Lin. S. V. p. 640 + Spei. pl. pag. 1002

Apalathus senecio Berg. foliis fasciculatis ovato-lanceolatis tomentosi-
seneciis, spicis ovatis hispidis terminalibus Berg. Cap. pag. 22 +

Habitat ad Cap. b. spei

geneta africana argentea, foliis minimis alopecurodes. Herm
afr. 11.

Genetella minor non fraxosa theopica, foliis propylis candidian-
tibus et seneci castor mollibus Breyn. prod. 2. p. 50

Pyt. frax africana angustifolia senecio lanugine argentea
tur. spica lagopoda ex Pona. b. spei Plukh. mant.

63.

Habitat in Cap. b. spei

Rami teretes inferne glabri superne seneci. Fasciculi
foliorum frequentissimi. folia plura 6-10. utraque
senecio longitudine fere internodiis interstitiorum
semper angustiora. Spica terminalis ovata oblonga den-
sa tomentosa. bractea oblonga. lacina calycis subulata

fasciculatis lineantibus seneciis, spicis terminalibus ovatis densis
hispidis

seta

La manna fenicea huc pertinere videtur cum sola ad condendam.
folia ternis linearia, ubi tota planta fenicea, unguiculata. Stylo nulla flo-
res axillares, gemini, sessiles, vexillum glabrum herb. tur. Th. M.

mollis A. foliis ^{lineari oblongis} cuneatis foliis ^{inferis} ramorum fasciculati supra ramulo-
 rum ternis, spicis terminalibus hirsutis pubescentibus
 Habitat in C. b. spei Montis qui a Thuabergis habuit &
 accedat ad heterophyllum ^{si} vero me specimen in herbano sub
 hoc nomine saltem et forte tantummodo varietas serpylli folii
 quod nomen non in molle
 hic erit heterophyllum h. folia autem linearia in heter. f. lineae
 Rami elongati ramuli ^{aeque} vellosi. Veti. foliis
 folia terna ut propter rudimenta ramulorum foliata in axillis
 in feroribus fasciculata apparent supra terna tantum omnia
 parva villosa grisea. Spica terminalis fl. semiglobosa
 oblongi flores conferti calycis villis longioribus veti. Dentibus
 subulatis vexillum et carina villosa superne alio giabra

an alba Le. Montis serpyllifolium cuneatis

Subannus

Copenfis ~~Subannus~~

Pallasia ~~Copenfis~~ Houttuyn Plant. Syst. 3. pag. 319. tab. 22.

751

~~Copenfis Pallasia Houttuyn Plant. Syst. 3. pag. 317. tab. 22.~~
~~Copenfis Pallasia Houttuyn Plant. Syst. 3. pag. 319. tab. 22.~~
~~Copenfis Pallasia Houttuyn Plant. Syst. 3. pag. 319. tab. 22.~~

Heterophylla A. foliis ramorum fasciculatis, ramulorum ternatis linearibus hirsutis,
spicis terminalibus, calyce corollaeque villosi Lin. Suppl. pag. 321. * L. V

p. 647.

Habitat ad Cap. b. Spei

Rami tenues villosi sparsi. folia ~~ternata~~^{ternata} superiora plerumque 3 na
raro quaternaria linearia lanceolata utroque acuta pinnatifida
ciliata. Flores in ramulis vespis apicem albissimi approx-
mati sessile. Bractea ^{longiuscula calycis} duo linearia lanceolata ad basin
calycis et corollae (vix. al. conna) extra villosa flavescenti
perenniter nitida. Lacinia calycis angusta lanceolata

caudicans A. foliis ternis fasciculatisque filiformibus sericeis, flombus
sublateralibus, sessilibus nudis Hort. New. 3. p. 17.

Habitat ad C. b. p. 17.

Rami uti tota planta inanis sericea post caput foliorum
tuberculata. Folia semiangustulosa absque mucroni.
Flores solitarii axillares ^{pub} sessilibus foliis brevioribus. Calyx
5fidus laciniis angustis lineari lanceolatis.

an albentia La Martini. Folia plura canescentia. Calyx
lateralis, villosus, albentia solitarii herb. La Martini

quinquefolia Alpat. foliis quinis sessilibus, pedunculis spicati Lin. Am. l. c. p. 92. n. 317
2. pag. 640.

Cyrtis, angustis parvis acutioribus et linearis foliis, Ethiopia, floribus fulva
lanugine hirsutis Pluk. alm. 120. t. 270. fig. 4.

Habitat in Cap. bono spici.

non vid. folia quinque, sessilia: folioli lanceolatis, petiolatis, suppilosis, mucro
natis; lateralibus paulo brevioribus. Pedunculi foliis multoties longioris,
racemose spicati. Corollo supra tumentosa. Lin. Am. l. c.

La manchi quodam foliis superioribus ternatis, sessilibus oblongis, mucro
natis & comulis foliatis. Flores racemosi. Calyx flavescens an lin.
sub mus.

non vid.

Descriptio Lin. parum quadrat cum figura
Pluk.

pinnata Apat. foliis pinnato quinatis, obcordatis, pedunculis capitatibus Lin. Am. Ac. 6 p. 92.

n. 32 * S. V. 648.

Habitat in Cap. b. Spei 7

~~Contra~~ affinis Apat. quinquesolis. Folia petiolis brevissimis pinnata: foliolis
quinque approximatis, obcordatis subpeltatis, subtus tomentosis. Pedunculis foliis
longioribus. Spica subrotunda. Corolla extus subtomentosa Lin. Am. b. c.

non vid.

macronata A. foliis ternis lobatis, ramis acuminatis, floribus racemosis Lin. Suppl.
p. 320. * N. V. p. 648.

Habitat ad Cap. b. p. e. t.

Caulis lani remote ramosus, absque verrucis. Rami per se
attenuati quasi spinosi. folia ternata lanceolata sub
qualia glabra, brevissime petiolata. Racemi terminales
erecti, pedicellis brevissimis. Calycis dentes minuti.
Corolla glabra Lin

non vid.

racemi florum A. foliis trinis linearibus subunciformibus glabris utriusque, floribus
racemosis villosis

Habitat in Cap. b. spec. La Mart. 3

Ramuli sparsi canescentes. folia ^{superiora} parva sesquialia frequentia aboque
mucronata ovata villosa. Racemi terminalis interdum
bipollucaris pedicelli breves tripartiti & lineares ad basin calycis
laterales parum longiora et angustiora. Calycis dentes ovati setula
omnia exteriora villosa

~~t. crenata Burmanni
gemini folii et folio radi Calibus lineantibus simplicibus, squamis pa-
pi lanceolatis papis 3. 4 flori
Habita in India orientali
fere coarctata~~

Canadoto - mucronatis
perpylli folius A. foliis ternis oblongis ~~foliis~~ flonibus spicati villosis.
Appalathus cymifolius foliis ternis lanceolatis mucronatis utraque
pubescentibus caule ramis paniculato, flonibus ternis axillaribus
foliis villosis La Mart.

Habitat in cap. b. sp. La Mart. 5

similis ap. b. squalifolius in modo venetas. Fruticulus ramo
siformis ramis ramulisque spicis ramuli villosi foliis
trianis ^{oppositis} ~~trianis~~ ^{4.} floris in spica brevi axillari confert. lacini
calycis angusto lacini vixillum alio et canoni extus villosa

~~Perrin~~ Perlepus

tridentata Oppal. foliis ternis lanceolatis glabris, stipulis tridentatis mucronatis, glabris
floribus capitatis L. S. V. pag. 640.
Habitat in C. bono spec. 7

non redi

anthylloides A. foliis ternis lanceolatis equalibus subpubescentibus, stipulis nullis,
capitulis terminalibus Lin. L. V

Anthylli asphaltoides fruticosa, foliis ternatis equalibus capitulis
terminalibus sessilibus Lin. Am. Acad. 4. p. 326 +

Habitat ad Cap. V. p. 5

Rami teretes cortice rimoso, in piceis transverse in frustulis decidua
superne leviter pubescenti folia ternata ^{ordina} subt unguiculata,
acuta supra laevia, subtus subt nervi margini villosa. Bracteae
lineares inter folia uti calycis sessiles pediculi laciniis calycis
subulato. Petalum carina et ala extra villosa
rami villosi, feminae, folia subfalcata lanceolata, attenuata,
acuta, rigidiuscula, venosa basi attenuata subulosa. Stipulae
nullae. Flores terminaliter circiter 7. brevissime pedunculati. Brac-
teae setaceae. Calycis laciniis lanceolato villosa.
Ea falcata ex errore in Det. W. nym. Dixi

Appalathus pallens

~~*Appalathus*~~

~~foliis ternatis sessilibus lanceolatis glabris, floribus capi-~~

~~tatis~~

~~Habitat in Cap. b. part. S. Bulow~~

repnantur omnia

~~Calycis ramiflorus: rami parvi ramulosi glabri ramuli
tuberculati e capite foliorum saepe cernentes erecti
Folia ternata sagittulata ovata, rigidiuscula utrinque
acuta altero latere convexa. Flores in capitulum termi-
nale collecti plures. bractea subulata basi folii obvallata
bractea subulata ad basin calycis longitudine eum aequans
Calycis ~~lanceolatis~~ foveis lanceolatis longitudine
corollae. Corolla villosa. Germen villosum~~

Stipula nulla

~~affinis *Appalathus anthylloides*~~

~~*Appalathus anthylloides* Ca. Martii~~

Cytisoides a. foliis ternatis sessilibus lanceolatis subtus subtiner-
is margine foveis villosis ciliatis floribus capitatis

~~an *Appalathus anthylloides* an hujus generis~~

orientalis Appal. foliis ternatis lanceolatis pubescentibus, floribus fasciculatis quinis, Calycibus
pubescentibus, caulis erectis angulatis Lin. Mant. 269. R. V. p. 648.
Cestisus orientalis, floribus amplis glomeratis Tournef.

Habitat in oriente &

Caulis fruticosus, erectus: ramulis angulatis, pubescentibus, pediculis. Folia
lespelia, linear-lanceolata (Lini) acuminata, pubescentia, interstitiis lon-
giora. Flores terminales, fasciales, subquini, erecti, fasciculati. Calyx pube-
scenti; dentibus subulatis. Corolla lutea obtusa, magnitudine labur-
ni. Stamina connata Lin. Mant. l. c.

non vid.

callosa a. foliis tenuis subulatis aequalibus; stipulis subrotundis callofis
floribus punctatis glabris des. l. v. pag 640 + Bergl. p. 209 +
Cytisus trifoliatus; juniperinus foliis; floribus luteis in
speciem densam adactis Prom. bono per Pluken
mont. 63. t. 345. fig. 4.

Habitat in Cap. b. per

Fruticulus ramis ^{glabris} ~~capis~~ ^{foliosis} adpressis callos rotundatis
sine villosis. ^{Juniperina} folia terma, basi callosa ~~sine villosis~~ insiden
tibus sessilibus sub lineari sub carnosa glabra subtus convexa
acuta. Fructus terminales laxo. Bractea subulata longi
tudine calycis. lacinis calycis subulatae Corolla glabra

— lineari floribusque punctatis glabris

Plumier

alternans *Cotyledon* foliis orbiculato pinnatis, ^{integerrimis} floribus ~~paucis~~ paniculatis glabris
pedunculis alternis.

Cotyledon orbiculata Forst. Cat. plant. Arab

Corollis ovatis membranaceis flavo rubentes; foliis laciniatis, diversa foliis
pedunculis parvis alternis.

Tota glabra

Corolla ovata acuminata membranacea, quadrifida
laciniis lanceolatis flavo rubentes.

Carthago Ahal. foliis ternis linearibus villosis, floribus fasciculatis quinis, calycibus
lacinatis, caulebus prostratis dentibus Mart. 263. * S. V. p. 640

Hab. Aethi. Cap. bono speciei reperitur

Caulis subherbaceus, subdecumbens, teres, flexilis, pubescens: ramis alternis. Folia
petiolata, linearia, lata, pilosa: petioli brevissimis. Flores terminales fasci-
culati, 5 in capitulum. Calyx corolla dimidio minor, lacinatus, dentibus subu-
latis. Bractea calycina propria nulla. Corolla glabra lutea Lx M. l. i.

non vidi

pilosa. Apsal. foliis ternis linearibus villosis, capitulis terminalibus pilosis simplicibus, corollis pubescentibus Mart. 263 & L. V. p. 640

Hab. At ad Cap. bono fructu.

Caules subvillosi, simplicis simplicis, palmares, subvillosi. Folia sespita, acuta, pubescentia, subpubescentia. Capitulum terminale hispidissimum, bracteis calycibusque pilis albis ovalatam. Calyx quinquepartitus pilosissimus; laciniis lanceolato-linearibus. Bractes 3, lineares, pilosae, acutae. Corollae petala omnia extus pubescentia. Len. M. l. c.

non vid.

