

Apraragus

africanus *Aprasagus*

Habitat in Africa herb. ha. Manhi

Rami teretes, glabri. Spina solitana, brevis, patens, subulata, purpurascens.  
Tuberculum foliiferum. <sup>multinervi</sup> Folia fasciculata, setacea

*Hippellae cur. Appamuzus*

Habitat herba Mantii.

Rami teretes, villosi, tuberculati, ramulosi: ramuli frequentes. Folia plura, opposita, ovata, unguiculata, linearia, glabra, supra canaliculata, mucrone terminata. Spina foliis longior, erecta, unica ad apicem, brevior, apice flavescens. Stipulae plures, ovatae, acuminatae, a basi sub ramulis et foliis villosae. Pedunculati villosi, angulati, uniflori, longitudine foliorum.

*aphyllus fruticosus pentagonus aculeis tetragonis compressis fructu den-*

~~herbaria~~  
11 *aphyllus*

*Apparagus caule inermi angulato fruticoso, foliis subulatis fructu rigido*  
*potentissimus* Suppt. pag. 203 et pag. 204 L. n. t. v. p. 333.

*Corduba altera Clus. herb. 2. p. 170*

*Apparagus aculeatus alter, tribus aut quatuor speciebus ad eundem locum Buch*

restituatur  
omnia

*in 1770 hypancus, aculeis crasporibus horridus Tournet inff. 300*

*Apparagus* ~~fruticosus~~ <sup>potentissimus</sup>, *caulis inermis et brevibus aculeis, magno fructu*  
*Tournet inff. p. 229 et 229.*

Habitat in Sicilia, Hispania, Lusitania, Barbaria;

Caulis sesquipedalis et ultra ramosa <sup>ramis flexuosis, magis nigra</sup> ~~semitruncata~~ angulatus. Rami alteri, <sup>potentissimus</sup>. Folia saepe pollicaria, spines formica, solitaria in apice ramorum terna, distantia. Stipula lanceolata hyalina basi dilata in auriculam res deorsum tendens, rigida spiniformem Flores axillares aggregati quini

Rami recti, potentissimi, ramulose, glabri, teretibusculi. Folia aggregata, s. b. rigida, equalia, semicirculana, mucroni pungente terminata potentissima. Pedunculi inter folia, saepe nunquam longitudine, 2-2.3 flori

herb. Vaill. <sup>herb. Vaill.</sup> *synonymum adjectum*

Caulis flexuosus: folia fasciculata vix unguiculana herb. Royen

1. *officinalis* Apparagus caule herbae co. Testi erecto foliis petalis, stipulis parvis.  
Lin. Spec. pl. p. 440. \* L.V. p. 332.

*maritimus* a Apparagus maritimus Clus. hist.

Apparagus maritimus crassifolia Bauh. Pin. 490

β. Apparagus sylvestris matth.

Apparagus sylvestris tenuisimo folio Bauh. Pin. 490

α. Apparagus Camer. Epit. 259.

Apparagus fativa Bauh. Pin. 489

Habitat in Europa arenosis &

Caules paniculati. Stipulae solitane extenores lanceolato subulato et  
bino interiores minores inter quas folia 3:4:5, in infimis ramulis.

Corolla campanulata  
Pedunculi gemini laxi cum flori penduli, geniculo articulato, <sup>†</sup> petala  
li interioribus longioribus Lin.

~~5 *retrofrans* *Apparagus* *caulis* *subsessilis* *caulis* *subsessilis* *ramis* *patentibus*  
*foliis* *obovatis* *caulis* *subsessilis* *ramis* *patentibus* *foliis* *obovatis*  
*ramis* *patentibus* *foliis* *obovatis*~~

Habitat in Cap. b. part.

Rami laxisque purpurascens <sup>netidi</sup> angulo sub subcompres si ramum  
 festuosi; ~~fructu~~ Ramuli albid. Folia teretia 10 et ultra in  
 equalia ~~ramum~~ incurva glabra rigidiuscula, aculea <sup>solitarii</sup> parum  
 curvatis, in ramulis nullis. Flores solitarii. pedunculi capite  
 Care folia longiora

Pubulatus App. frutescens inermis, ramis retroflexis, foliis teretibus  
 Pubulatus Thunb. prodr. pag. 66.

Scandens A. herbacei inermis volubili foliis lanceolatis falca  
tis Thunb prodr. pag. 66  
Habitat in Cap. b. spei

~~6 pubescentis~~ Apparagus caule <sup>inermi</sup> tereti ramisque pubescentibus, foliis fasciculatis teretibus

Habitat in Cap. bono spei

Rami molliter pubescentes. basi stipula ferruginea ad basin ramorum. Rami paucis ramuleque patentissimis. Folia rigida parva glabra 3-5. Pediculi aggregati longitudine foliorum medio geniculati, superne crispores

Subulatus A. frutescens inermis, ramis retroflexis, foliis teretibus subulatis Thunb. prodr. pag 66



17 Verduellani *Apparagus foliis verticillatis lanceolato ensiformibus Lin. S. V.*  
pag 333 +

*Apparagus orientalis, foliis galii Tournef. Coroll. 21. Buxb. cent.*  
V. App. 47. t 37.

Habitat in oriente circa Deventum et Alebi

non vidi



7 apatiens Apparagus aculeis solitatis, caule erecto, ramis feli formibus,  
foliis fasciculatis Lin. l. V. pag. 333.

Apparagus aculeis alternis ramis solitatis feli formibus, foliis seta  
tis fasciculatis lateralibus Lin. Hort. Cliff. 1227

Habitat in Asia

non vid!

3 retrofractus Apparagus aculeis solitariis, ramis teretibus reflexis retrofractis quez foliis  
setaceis fasciculatis in omnibus Lin. l. V. p. 332.

Apparagus africanus tenuifolius, viminalibus virgis, foliis lanceis adnatis  
ex uno puncto numerosis stellatis prostratis Pluk. amalth. 40. t. 375. fig. 3.

Apparagus frutescens, foliis fasciculatis setaceis terminalibus, ramis  
reflexis retroflexis. Hort. Cliff. 121\*

Habitat in Africa

Rami teretes dichotomi flexuosi dichotomis verticillis aculeis mi-  
nuto nutante. Colea tenuissima plurima (20) inaequalia flexilia

Stipula ovata hyalina

valbus. Aparagus aculeis solitariis ramis angulatis flexuosis, foliis fasciculatis tri-  
quetris muticis deciduis Lin. L. R. naz. 333.

Cornuta Verta Clus. herb. 2. p. 170

Aparagus aculeatus spinis horridus Bauh. herb. p. 490

Habitat in Leptania Hispania

Rami albi uti spinis aculeis aculeis unguicularis ter-  
folia plura aculeis longiora

Rami flexuosi spinosi, albescentes, frequentes. Spina unguicularis, valida  
recta, caulis reflexa, ramorum patentissima, solitaria. Folia semipolli-  
cane ex axillis, plurima herb. Mus.



dependens Af. fruticosus aculeatus, rami reflexi, folia subu-  
latis Thurb. prodr. pag. 66

apparus rubicundus rami proumbentibus aculeis  
solitariis, ramulis alternis inermibus. folia subu-  
latis fasciculatis Berg. Pop. pag. 98.

Habitat in Pop. b. p. et

Rami teretes laevi rubicundi glabri <sup>rami flexuosi</sup> aculei <sup>curvi</sup>  
ramuli alterni <sup>albid.</sup> foliiformes folia <sup>16 vel 18 nervis</sup> plurima <sup>securigui-</sup>  
cularia inaequalia parum incurva rigidiuscula  
flores solitarii. Pedunculi capillares folios longior

2 horridus Apparagus aphyllus, fruticosus, pentagonus, aculeis tetragonis  
compressis striatis lin. Suppl. pag. 203

Apparagus Hispanicus, aculeis crassis horridus Tournef. Inst.

p. 300.

Habitat in Hispania

Caules aphylli. Aculei alterni, solitarii, remoti, lignosi, robusti,  
interstitiis longioribus f. longitudine digiti, ~~striatis~~ lin.

Apparagus stipularis Forsk.



aphyllus *Aparagus* caule <sup>inermi</sup> angulato, foliis subulatis striatis ino  
qualibus <sup>et diversis generibus</sup> L. V. pag. 33.  
Corduba altera etc

13 *Ethiopicus aparagus aculeis solitariis reversis, ramis angulatis, foliis lanceo-  
latis linearibus* Lin. Mant. 63. x. l. v. p. 332.

*aparagus aculeatus africanus, comido* 3. Clusii simili Raij Suppl.  
354. n. 5. et 2.

Habitat in Q. b. frei 4

Similis falcato, sed folia minor, 7 circiter nec 3. Stipulae emittunt  
spicam retro spectantem. Rami flexuosi angulati, quasi fruticosi  
virides. Lin.

non vid.

14 Incurvata aphanogon foli aculeis reversis foliis solitariis fasciculatisque linearibus  
incurvis floribus ratemosis

Schadareli Kelangu Arch. Malab. 10. p. 14. t. 100.

Habitat in Zeylona Malabar

femiliis A. galeatis, at foliis quadruplo minoribus ratemosis bipollicares  
aculei minuti pmi sub foliis

17 *Falcatus* Apparagus aculeis solitariis <sup>reversis</sup> foliis ex piformibus falcatis floribus <sup>atillanbey</sup> racemosis  
Apparagus foliis falcatis ex uno puncto numerosis Burm. Zeyl. 36. t. 13. fig. 1.  
Apparagus falcatus; aculeis solitariis reversis, ramis teretibus, foliis an piformibus  
falcatis Lin. Flor. Zeyl. 123\* S.V. p. 332.

Habitat in Zeylona t,

Rami & retes cineriferae patentissimae aculei subramis validi breves  
Folia fasciculata, 5-na, basi angusta <sup>terque</sup> pollicaria ~~sub~~ <sup>super</sup> ~~membrana~~ <sup>reversa</sup>,  
superius arcuata aculeis <sup>parvis & aculeis</sup> ~~aculeis~~ <sup>solitariis</sup> ~~sub~~ <sup>ex</sup> ~~foliis~~ <sup>foliis</sup> ~~racemi~~ <sup>axil-</sup>  
laris 2-4 bipollicares. Pedicelli capillares solitarii ~~ter~~ <sup>solitarii</sup>  
vel terni distantes. bractea membranacea.

Figura Burmanni habet ~~flora~~ pedunculis unifloris stellatis Descript. her. Racemi  
confer. Heron. herb. non vidi

16 Sarmientosus Aparagus foliis solitariis fasciculatisque lineari lanceolatis falcatis  
floribus racemosis Lin. S.V. pag. 333; Cl. zeyl. 124 \*

~~Chadaveli belanga Rheed. Mal. 10. p. 14. t. 10~~

Aparagus aculeatus Zeylanicus maximus sarmientosus Herm. huydt.  
62. t. 650

~~Aparagus sarmientosus~~

Habitat in Zeylona Rami teretes flexuosi. Ramuli alteri laxes  
aculeis reflexis. Folia alterna distantia, bipollicana, mu-  
crota parum falcata ~~na~~ plebilisime nervosa, aculei minuti  
reflexi. Racemi axillares terni sesqui pollicares patentissi-  
mi. Pedicelli alterni

Canisus. A. a. u. l. e. s. s. o. l. i. t. a. n. i., f. o. l. i. o. l. a. n. c. e. o. l. a. t. i. s. s. u. b. f. o. l. i. a. t. i. s. s. p. a.  
D. u. n. i. c. u. l. i. s. a. x. i. l. l. a. n. t. i. b. u. s. s. o. l. i. t. a. n. i. s. T. h. u. n. b. p. r. o. d. r. - f. l. c. a. p.  
p. a. y. 66.  
H. a. b. i. t. a. t. i. n. C. a. p. 6. p. e. i.

non vid.

2 declinatus Aparagus caule inermi tereti, ramis declinatis foliis setaceis  
An. S. V. pag 332 \*

Habitat in cap. bono spei ?

Similis A. officinali sed altior foliis pluribus duplo longioribus.

Caulis annuus. Stipula solitaria, lanceolata subulata, basi  
deorsum mucrone membranaceo. Folia 7. / 10 filiformia patens.

An. l. c.

in herb. Neyeri specimen gaudet foliis solitariis, setaceis curvatis  
caulis et rami flexuosi. forte alia species.

9 acutifolius Appanagus caule inermi angulato fruticoso, foliis aciformibus  
nyctulibus perennantibus mucronatis equalibus.

Corrada prior Pluf. h. a. p. 177.

Appanagus foliis acutis Bauh. Pin. 490.

Habitat in Lusitania, Hispania oriente &

Rami & caeteri subtilissime fracti rigidi alterni ramuli pinguic  
ulonibus horizontalibus. Folioa septena parva tercia mucro  
ne albo pungente, brevissima.

Folia semiunguiculatae copiosa. Pedunculi folio longiores.

Schouboe differt videtur a Toffh. foliis longioribus.

Alcam in oriente legit Toffhalous, caule ramisque pubescentibus sed specimen  
non nisi respmum adest.