

Aspenula

confertus & Culmo Inqueto nudo, umbella simplicis foliosa, spiculis ovatis
 conglomeratis, glumis apice recurvis acuminatis *Lu. prod. pag. 20.*
 Habitat in Jamaica

*Habitat in Andonia Borneo
 Gaudia & affinis Bur, prod
 Borneo glumae reflexae, folia densa linearibus per
 Borneo inflorescentia supra et margine pubescentia, et alba glumae
 Borneo inflorescentia supra et margine pubescentia, et alba glumae
 Borneo inflorescentia supra et margine pubescentia, et alba glumae
 Borneo inflorescentia supra et margine pubescentia, et alba glumae
 Borneo inflorescentia supra et margine pubescentia, et alba glumae
 Borneo inflorescentia supra et margine pubescentia, et alba glumae
 Borneo inflorescentia supra et margine pubescentia, et alba glumae*

— oblongo —

Defin. adde se: specina perfecta Westii

regni. *Lu. prod.*

Cristatus

Cyperus capitulis oblongis, spiculis ovato oblongis, umbellae cetero dicta involo triphylo brevior.

Cyperus maderaspatensis maximus panicula cristata contractiore
Pelt. n. 591. p. 55.

Habitat in India Orientali. Ex herbario horti parisini

Culmi crassitie pennae anse, involucrium acute trigoni. Involu-
crum di-triphyllum. Umbellae radii compressi, spithamae
vel breviores. Capitula sesquipollicaria, spiculi numerosissimi
imbricati, caespit. obtusa. Spiculae unguiculatae et ultra,
trigintaflora, obtusae, sordide flavescentes: valvulae ovatae, lateribus
laevibus

Crassitie fere
semi pollicis

Radius ^{radialis} unicuique interius Ventum daret in specimenne et ab illo con-
cludo quod ~~pot. vennis~~ rectius ad compositor pertinet

Appendix

Rubicola orientalis, foliis galli, flore multiplici et viridi florescente
Tournef. Cor. pag. 5.

Habitat in Armenia Herb. Tournef.

Caules fruticatosi, basi ramosi, fasciculi florum pedunculati, axilla
v. eo oppositi

herb.

elongata Asperula

sub nomine Asper. repentis e Lusitania ^{magna}
Caules elongati ^{propumbeles} bipedales ramis ^{angulatis} teres glabri tetragonis ramis
alternis folia densa linearia ^{acuta} vix ^{semipollicaria} supra vallis
rari subtus glabrum margine ciliata. Flores terminales et axillares in
opice pedunculati sessiles unites decem in capitulo folioli 400 in
volucris. Corolla tubo ut unguiculari albedo incarnata
longior

~~Asperula orientalis argus foliis incarnatis, flore magno externa Tournefort
Cor. pag. 32.
Hortus in oriente herb. Tournefort.
Ravallio Indico-mor., Juniperus, unguiculari, videri in
gemma~~

artemisiifolia. Centaurea squamis lanceolatis & canicis, foliis pinnatis lan-
ceolatis subtus caule iniani ramoso iniani
Paganus orientalis, artemisiifolius Tournef. Cor. 32.
Habitat in oriente. Herbarium Tournefortii et Vaillantii
Caulis herbaceus, erectus, strictus, angulatus, ramosus, sublanatus,
inferne state glaber. Folia petiolata, bipollicaria: pinna alternis,
sessile, ^{acuta} ultimo decurrentes; la inferiorum latera inferiore lacinula
acuta, superiorum angustiore: omnes acuta

aspera Clopenula

Rubeola lusitanica aspera, floribus purpurascens Tournef. Inst. v. h. 130

Habitat in Lusitania herb Mus.

Caulis plures, herbacei, basi ramosi, semi-pedales, erecti, inferne villosi, superne
glabri, laeviter. Folia fere crassifolia, spiculi curvi setiferi mibus adpressa, lineari
revoluta, acuta. Involucrum oblonga, glabra.

~~of the paper~~

Aspinula

Hubeda vulgaris quadrifolia Loris flentibus et solitis Michx. planta Rom. et Neapol.

Et habitat in Italia herb. Mus.

Caulis herbaceus, sesquipedales, tetragoni, ramosi, glabri, teres. Solum sericeo, etiam superne, fere se-
mi-pollucaria, linearia, scabra. Pedunculi ex axillis et apice, solitarii 8-14 flori. Involucra
concolorata, glabra. Corolla glabra, Asper. cyanantha.

Asprella

Habitat in Persia herb Mus.

Caulis herbaceus, adscendens, spithameus, glabrus, sulcatus, lineo aculeato scabri, sub
ramosa. Folia inferiora sericea, approximata, minora, angustiora, arida, reflexa,
insequentia et ramorum g. lanceolata, plana, unguiculata vel panum ultra
avena, enervata, mucronata, canna margine aculeolata-uleata. Strobili
apice in capitulo collecti, multiflori, sessiles, basi cincti verticillo foliorum
glabro, unguiculato ^{non} tam. Stylus corollae longior

Louisa manna Gmelin &

viridiflora *Aprenula*

Aprenula orientalis foliis galii flore multiplici ex viridi flavescente Tour-
nef. Cor.

Habitata in oriente herb. Mus.

Caules basi lignosi, erecti, simpliciter, striatissimi, villosi, uti folia. Folia inferne
9-10 superne sena, diamum opposita, unguiculata, linearia: fasciculi folio-
rum in axillis. Pedunculi ex alii supremis, oppositi: inferos sive verticil-
li gemini, 4-5 flori, involucri ovata, ciliata, longitudine calycis. Corolla
magnitudine a. Cymachis.

habes

Appendula

Rubio laetitia iniana floribus purpurascensibus Tournes. Cor. 5

Habitat in Oreta herb. maj.

Caulis herbaceus, erectus, teretiusculus, ramosi inferne villosi - subtomentosi, superne
si abnasculi, oculo armato villosuli. Folia semipetiolata, undique fina, linearia,
villosa, canescentia. Pedunculi ex axillis supremis. Ceres saepe in verticillis
geminis, approximatis, multiflori. Involucra lanceolata, calyce parum longi-
ores, villosa. Corolla asper: lympha rubra, artus villosa

Calabroica *Asplenula* foliis linear-lanceolatis, icule fruticoso L¹⁹ Herb. fasc.
4. pag. 65. 4 tab. 32

As: calabroica foliis, glaucis et nigris oblongis obtusis lobibus h. Linn. 1204 P. V
Saleriana pumila *Sipera* Raii catal. 110
mag

Cantero di candia fruticoso maggiore fetido Can. est. 144. t. 27.

Oleander creticus fruticosus major fetidus Raii hist. 2. 1919. Syllog.

¹⁰⁹
Thymelaea *Sipera* lignosior cretica, ingrati odoris, major Pluk.

alm: 36 7. Can. hist. 216. t. 166

nerium suffruticosum, antithurifolium putens, floribus carnis Cap.
bot. 152.

Rubecula cretica foetidissima frutescens myrtifolia, flora magno
suave rubente Tournef. Cor. 5.

Sherardia foetidissima Cynil. Char. Cy. t. 3. p. 7.

5 Habitat in lino montibus Calabria, atlante t

Folia tantum bina, odor huius oranz ~~subulsi sub.~~

Caules teretiusculi ^{subulsi} ~~subulsi~~ ^{pubescentes} oppositi ramosi.

Foliusculi foliorum in axillis. Folia subpeltata pollinosa, obtusiuscula, nuda. Rami ^{pubescentes} ~~pubescentes~~ ^{terminalis} ~~terminalis~~ ^{terminalis} floriferi terminales, terni oppositi. Cum ramulo alterius ex crepente, tri flori flores scapites. Corolla purpurea unguiculata

Fruiti buccia cordato-orata, compressiuscula, succosa, umbilico clauso.
Semina 2. semiovata, basi planissima inde convexa, lora Richard

Conyzae foliis capitulis oppositis, foliis sessilibus quinatis An. N. 692.
Omnis quinata, foliis quinatis integris, cuneatis, sessilibus; Pan-
bu sessilibus, subquatuordecim lora; Boyle: pag. 130 n. 4.
Panicum foliis hujus speciei carituris de morem a vestra
~~Boyle~~

pyrenaea Apenda foliis quaternis lanceolato linearibus, caule erecto, floribus sordid
trifidis Lin. Spec. pl. p. 151. * S. V. pag. 144

Rubia cynanchica saxatilis Bauh. Prodr. p. 146. Pl. 332.

Habitatio Pyrenaei versus Hispaniam et prope Valentiam Gallorum,
Caules erecti, spithamei, quadrangulares. Folia omnia in caule quaterna
linearia, carinata, acuta, teria; inferiora etiam quaternaria sed breviora,
lanceolata, obtusiora; folia summa et floralia opposita, latiora, acuta
lanceolata. Flores tubulosi, rubri, sordid trifidi. Natura Sherardii
arvensis Lin. Spec. l. c.

an mea pyrenaea Lin.
tum varietas de caule basi folisque inferioribus villosis

non vidi

Cynanchica a foliis quaternis linearibus: superioribus oppositis, caule erecto, flori-
bus quadrifidis Lin. Spec. pl. p. 151. t. V.

Galium album minus Tabern. herb. 433. t. 433. fig. 2.

Galium montanum latifolium cruciatum Col. Exph. i. p. 296. t. 297.

fig. 1.
Rubia cynanchica Hall. herb. 450. Bauh. pin. 333. Bauh. herb.
3. p. 723.

Habitat in Germania, Anglia, Gallia Helvetia Italia, Hispania
et Orientis praeae aridis saxosis cretaceis et

caule ramosi. ^{rami alterni superne oppositi} folia inferiora breviora, superiora linearia pollicaria
internodii breviora. ~~supremo et~~ ^{supremo} ~~et~~ ^{pedunculi ex apice ramulorum}
et axillis ^{et} ~~supremis~~ ^{terminis} ~~oppositi~~ ^{et} ~~apice~~ ^{et} ~~pedunculis~~ ^{et} ~~terminis~~ ^{et} ~~et~~ ^{et} ~~floribus~~
floribus ~~et~~ ~~pedunculatis~~ ~~et~~ ~~sepalibus~~ ~~et~~ ~~albis~~

varietas caule inferne folisque inferioribus pubescentibus

anftata A. foliis linearibus fubcarnofis: inferioribus quaternis, floribus fubter,
nis anftatis. Lin. Suppl. p. 120. S. V. p. 149
~~Habitat in Europa aulfordi~~
Caulis erectus. Flores pallidi, flavescentes, parallele pofti: laciniis ob
fufis anftatis. Lin.

Trinetaria A. foliis linearibus; inferioribus senis; intermediis quaternis, caule flaccido, floribus plerisque trifidis

Galium album 3. Tabern. hist. 443. t. 733. f. 1. bona

Galium album tripetalum Monj. prol. 267.

Habitat in hircis, Thunigis, Galles, Sibris collibus aridis saxosis
Caulis subramosus ^{mai alteri} folia superiora ^{apice & trichotomis} linearia polluciana inaequali glabra
suprema opposita, pedunculi terminalis pedicelli terni pariter
terni, pedicelli terni triflori ^{sub} flori sesplesi albi

Cavata A foliis quaternis ellipticis enerviis tenuifolia; pedunculis divaricatis
Inchotomis, seminibus scabris Lin. Mant. p. 38 Paque. fl. Austr. vol. 1. tab. 94.

Cruciata Lusitana latifolia glabra, flore albo Tournef. F.R. 4. 115

Cruciata minor glabra, flore molluginis albi Barrel. Ic. 323.

Habitat in Barbaria Lusitania &

Caules filiformes primum erecti, semipedales. Ceteri deinde diffusi. Folia sub
petiolata, margine scabriuscula, obtusiuscula, internodiis breviora
Pedunculi ex apice caulis ramorumque solitarii, filiformes, foliis longio
ri, terminati bracteis. lanceolatis parvis et pedicellis tribus trifloris
excepto tertio iterum dichotomo. Flores albi. Semina lora, matura
nigra rugosa, glabra non hispida Lin.

~~Asperula~~ Asperula foliis tenuibus acutis denticulatis
inferioribus ^{Asperula} floribus aggregatis terminalibus
^{Sp. pl. de. etc. n. 127.}
Rubeola lupitani a J. J. Tournefort, floribus purpurascens
Tournefort. l. p. 130
Habitat algeris

non ord.

Crassifolia u. foliis quaternis oblongis obtusis lobatis. Lateralibus revolutis
obtusiusculis pubescentibus Lin. Mant. 37. + L. V. p. 149

Habitat in Creta, Orient

^{dicotome}

angulis scabri

Caules suffruticosi alterne ramulosi, diffusus ^{sub} pubescent ^{ut} tota ^{planta}.
Folia inferiora oblonga ^{ramosa} ^{inaequalia} linearia, floralia
gemina omnia mucronato-sicabra internodiis breviora, supra gibba
pubtus cava e marginibus revolutis. Ramuli floriferi axillares
et terminales sub aphylli, ^{in axillis pauciflori} pedunculi tres ⁴⁻⁵ ^{plures} in sin-
gulo sessile ^{et} ^{pubescenti}

arvensis A. foliis pinnis, floribus sessilibus terminalibus aggregatis Len S.V. pui. pl. p. 1504

Aspenula conulea. God. pempt. 355.

Aspenula conulea arvensis. Bauh. pin. 334.

Habitat in Europa arvis

Caulis ^{dichotome ramosus}

Folia inferiora quaternaria oblonga, superiora pinnata linearia. & coralea
pedunculi terminalis elongata

perua 16.

caulibus longitudine florum, supra hispida. & lora in capitulo peduncula
& sessiles conulei

Saurina a foliis quaternis ovato-lanceolatis, floribus fasciculatis terminalibus.
Spec. pl. p. 150 + Lin. S. V. pag. 1484

Rubia quadrifolia et *latifolia* Loris Bauh. pin. 334. Monf. herb. 3. f. 9
Tab. 21. fig. 1.

Habitat in alpidibus Helvetiae, Italiae 2

Caulis alternatim ramosus. ^{longus erectus} folia sessilia trinervia acuta internodiis
duplo breviora, ^{ovata} pubescentia. folia duo structura foliorum caulis sub
floribus. ^{ovata} foliola circa pedicellata inter flores. Flores copiosi

odorata A. foliis ovatis canaliculatis, florum fasciculis pedunculatis in l. v.
Flor. Dan. tab. 562.

Aprenula s. Nubeola montana odorata Bauh. pin. 334.

Habitat in Europa borealis. umbrosa &

Caulis simplex glaber folia basi attenuata, ^{inter nodos} ^{8. medio breviora} serrulata mucronata
^{superiora} ^{acumina} ^{apicalia} pollicaria. Pedunculus ternarius sesqui pollicari
erectus trifidus pundunculi subtriflori involucrium sub peduncu-
li partibus minutum.

hexaphylla ^{foliisque} A foliis senis capitulis involucriatis, involucri lineariibus margine scabro
Appendula hexaphylla; foliis senis linearibus, floribus umbellatis ser-
minalibus sessilibus All. fl. Pedem. p. n. 40. Tab. 87. fig. 3. *

Habitat in fuscis rupum Pedemontii

Caules herbacei filiformes glabri, inferne ramosi. Folia omnia

internodii pollicares
superum longiores

linearia sena, glabra, internodii ^{parum breviter} longiora. Flores in capitulis

terminalibus sessilibus, tubo angusto longo filiformi involucri lineari

polyphylla ^{foliis linearibus} ^{longitudine dimidii tubi} Flores purpurei quadrigide

^{sp. clus glaber}
diversa a denudata caule teneriore et involucri lineariibus

Denudata A. foliis linearibus finis, floribus aggregatis sessilibus involucriatis

Habitat in Hispania et Barbana, ^{ramis decussatis} Rami inferne scabi pilosissimi ^{omnia} ^{arcti}

fructi

Habitus Alp. Cynanchio. Caules basi lignosi. Folia ^{revoluta} penna linearia, mucronata
la infima minima saepe reflexa, ^{margine revoluta} mucronata pilosissima scabra, superiora
longiora unguiculata internodi breviora. Pedunculi axillares
caeci et terminales supremi oppositi breves inferiores pollicares
Flores ²⁶ ^{conopsea} sessiles, perianthii glabri, quadriplici ^{semper unguiculatis} involucrium
polyphyllum, foliolis oblongis acutis, glabris flore brevioribus.