

46. dentatum A. pennis oblongis omnibus diffracti crenato emarginatis obtusis
 47. marinum A. pennis obovatis ultimis confluentibus superne gibbis obtusis
 basi cuneatis
 48. trichomanoides A. pennis subrotundis crenatis
 49. vnde A. pinnis oblongis crenatis basi truncatis
 50. microphyllum A. pennis oblongis subincis serratis
 51. alternifolium A. pennis alternis cuneiformibus superne incisis crenatis
 serratis

×××× fronde bipinnata.

52. bulbiferum A. pennis decurrentibus oblongis obtusis crenatis subpinnatifidis
 stipitibus paleaceis
 53. incisum A. pennis incisi subrhomboides
 54. minimum A. pennis oblongis serratis minutis
 55. nitidifolium A. pennis in ferebus pennatifidis lacinis obovatis super^{ventibus}
 oblongis obtuse serratis fructificationibus lineantibus
 56. cicutaionum A. pennis decurrentibus cuneatis apice bis tridentatis fructi-
 ficationibus oblongis
 57. rubra muraria frondibus alternatim decompositis: foliolis cuneiformibus
 crenulatis

58. *Trichomanes ramosum* A. ^{foliis alternis}
 pennis alter lanceolatis inciso-serratis
- 59 *fragrans* A. frondibus ^{subtripennatis}: foliis alter nis, pennis lanceo-
 latis ciliatis apice serratis
- 60 *Adiantum nigrum* A. frondibus ^{subtripennatis}: foliis alternis: pen-
 nis lanceolatis inciso-serratis
- 20.-24. *falcata* A. fronde ^{pinata}: pennis falcatis acuminatis inciso-
 serratis: basi integra

dedit / appl. Tournef. cast. fig. 6. Plukenet. 73 fig. 6.
Desf. hemiconitis tab 66. fig. 1

Trichomanes Plukenet 73. fig. 6 tubus ex h. m.

Plumier filii 92.

volubilis, fronds opposita e tuberculis. Habitat plures Guatemae

Chorophyllum Apleurum

Habitat in Brasilia Com menses herb. Mus.

habes

Tomentosum Opplenium

Habitat in Brasilia Commarson herb. Mus.

Foliola inferiora subpinnata

Bulbifera affinis?

Habitat in insula Bourbonis Comma sen. herb. Mus.

lates

O. Splenium

Habitat in insula Francia Commaison herb. Mus.

Styler villosi, sesquipedaler. Pano infimo subrotundo, membrana vesper-
costam papaveris.

habes no 2.

Asplenium

Habitat in insula Francia Comites. herb. mus.

Susculi repentes, hirsuti, frondes semperdaler.

in eadem in insula Martorice?

habes no 1.

inter ripam Aplesium

Habitat in Quad. clausa herb. ha. Marchii

Stipes glaber. Truncus simpliciter, elliptico lanceolato, attenuato, apice serrato
inethamoa et ultim, glaberr, nervi tenues, alternatim simpliciter
variosi. Locus fructificatus in nervis alternis, abbreviatis, uncinatis
Hec species cum fructu conferenda

fulvatum *Asplenium*

Plat. n. 123 - fig. 6

Habitat in insula Bourbonis Comnes. herb. Jus.

affine Asp: adiantheide. Stygo fus co-purpurascens, Ye, no, loris, inter fronda
subpaleaceus. Eoiv bipinnata: foliola uti pinna petiolata, 3 pollicari: pinna
inferores oblonga, unguiculares, utrinque acuta, argute serrata, basi versus
integerrima, ^{deparentia} demum in pennulam terminalem lanceolatum attenuatam
inferne incisam: latius serrati ex trosum serrati: supra venosa striati.
Serrationes frequentes, membrana versus costam se aperunt

Tomentosum Asplenium

Habitat in Brasilia Dombey herb Lus.

Stipites plures, pedales et ultra, teretes, villosi tomentosi. Frondis pinnate: penna
reticulata, pollicares, ovata, acuta, inferiori basi utraque lobo ovato obtuso, intermedio
longiore, uti reliqua semita, obtuse serrata, raro inter gemmas, margine pectoso, utraq;
villata, profertim subtus. Nervi bipartiti, alter plenum bifidus, uniparti. Punctifica
tiones in nervis, membrana non vidi

Casopitum Cypleum

Habitat herb. ha. Martii

Stipes inter fronde paleaceo. Fronds bipinnata: pinnae alternae, inferiores subpetiolatae, unguiculatae, ex trochum decrescentes, plerumque subteretibus, obtusis pinnis, glabra, integerrima. Verminalis subrotunda, acuta, pinnata multifida, oblonga, 1-4 distantia, ad marginem exteriorem, i. e. ad internodum: pellicula utraque circumscripta.
an potius polytrichum?

LasERPitiosoleum Applanum

Habitat

herb. Thourni

Stipites palasii. Trons bipinnata: pinna ovata, Trapezio, obtusifimo, unguis clari
membrana fructificantes Vexar. Puncta fructificantes immersa, supra protuberan
cia

argustifolium Applenium

Loxichetis Monf. hist. 13. p. 14. Tab. 2. fig. 25.

Habitat ad flumina ripas fluminis Obi

Stipes sesquipedalis, glaber, supra biplicatus. Ervum pennatum: pinnae septem
lanceolatae, alternae, sesqui pollicares, ex trochum brevior, attenuatae, acin-
to, crenatae, glabrae. Linae fructificantes breves, contiguae, oblique
positae, membrana intus versus se aperens

Aptenium

Habitat in A Domingo Herb. Desfont.

Tripes altero latere convexus, altero striatus, glaber. Eoni pinnata: penna
reticulata, alterna, sequipollicaris; inferiores et superiores breviores, lanceolatae,
serulatae falcatae, attenuatae, basi superius aurata, auriculo rotundato, supra
nuda & subtus pallide virens. Rinea multifurcatae; breves, obliquae, membra
certam versus sese aperient.
an Ebenum. H. Kew.

Asplenium

Plum. fl. tab. 56.

Habitat

herb. Desfont

herbes

Fulcrum Alpinum?

Habitat herb. Thonini

Stipes fuscus, glaber. Stems bipinnata: foliola bi-3. tripollucaria: pinna oblonga, inferior subhombes, basi acuta, serrata, superior nitida, nervosa, subtus fulcata, extrema confluentes. Membra inter versus sse apertis

Filipenduloides Asplenium

Habitat p herb. Thounii

Stipulae plures; pithamaei, glabri, fileiformes. Eriis pennata, pinnae inter
media unguiculatae, superiores et inferiores minores, oblongae intermediae fuscae
foliolo triangulari, obtuso paucis serrato, glabro. Lineae fructificantes inter
versis sese apertae

pellucidum Applenium

Habitat in America meridionali herb. Thononii

Stipites fusci, luti. Frons pinnata: penna alterna, infima ovata, subrotunda
unquiculata, superiores, lanceolata, bi- & triplicata, attenuata, basi
sepe, remote serrata, apice integerrima, superiores minores; coaduna
ta, nervosa: laminae intus versus sepe apertae

Apuleium?

Habitat in Granada herb. Thesaur.

Stipes glaber. Frons pinnata: pinnae alternae, remotae, petiolatae, 3 pol-
licares, glabrae, acutae, ovato-lanceolatae, extenuatae minores, obsolete
remotae serratae, fructificationes utrinque ad lineam versus apicem
et basi in medio, lineares

pellucidum A splenium

Habitat in insula Francia. Lommes. herb. Turf.

Stipites bipedales et ricta, nigri, semiteretes; pilis nigris hirti, inferne
crasitie fere penno an penno, ~~trons~~ pinnata: penno supollicari; super
na et inferne minore, lanceolata, basi subovata, per sum truncata, alte
nuata, alterna⁴, inferna² ovata, obtusissima, infima² unguiculata², remo
ta, ⁴acuta, serrata, supra glabra, subtus rare nigro pilosa. Mem
brana vesper centam se aperens

Cuneatum Aoplenium

Sloan herb. 46. fig. 2.

Habitat in America meridionali herb. frus.

Aquiter plures, cœves, semiteretes, nigricantes, pedales. Frons bipinnata: foliola
alterna, bipolliciana, interna et externa minora: pinnula obovata serrata
basin versus integerrima et basin acuta, intima bi-^{tripartita}, unguis ulares
linea fructificantes 2-3. in pinnula versus ^{membrana} costam versus se aperens.

palmatum Applanum

Hemionitis peregrina Clus.

Habitat in Hispania herb. Jusf.

Stipes foliiformis, glaber, palmatis et ultra, rugicosis. Erons 3-4 pollicia
ris, basi cordata, margine integerrima vel subincisa junis in cordata,
ultra 3-5 lobis. lobi ovati, acuti, membrana vespi eorum se apertis

Asplenium

Habitat in insula Bourbonia Commerf. herb. Musf.

Stipuli repentes, Yomentif. Eroni simplex, subpetiolata, pedalis, canaliculata
utroque attenuata, integerrima, venis obscura reticulata. Lines fructifican
tes lineares, lato, semi pollicares, utroque obtuse, prope costam parum obliqua
membrana nulla
an p. Plantagineum

unilaterale Applenium.

13

Habitat in insula francia Commer. herb. Aus.

Stipuli repentes, tenues. Stipules pedales, filiformes, nigri nitidi: frons
pinnata: pinnae sesquies parallelipedo, basi ^{apice inferiore} acuta transversa, apice
^{apice inferiore} obtusissima, ^{subrotundata} ext. vespum serrata: serraturis bidentatis, inferiori pollicari,
extrema elongata, margo inferior versus medium a vasis cernit. Linea
fructificantes parallelae, breves, approximatae, tres vel quatuor vespum
apicem ad alterum latum. Membrana ext. vespum versus se apertens

Fuglandifolium Asplenium

Habitat h

Leb. Prof.

Stipites tenues, glabri, virides. Crura pinnata pedalis et ultra: pinnae
alternae, petiolatae, interiores et exteriores minores, canaliculatae, attenuatae,
integerrimae, basi sursum obliquae, utrinque acutae, glabrae, lobes, remote.
Nervi bifidi. Emulsi ficata non adest, eisdem tamen ordinis videtur ac
fuli folia

an ^{hinc} Sloan tab. 37. et 40 eadem?

prolesum Aplenum.

Habitat in insula Francia Comteson herb. Musf.

Stipites tripedales, laxes, rubidi, subtetragonii, dorso convexi, crassitie pen-
na asperna. Eonis pennata: pinna remota, semipedales, pollicem lato,
ovato-lanceolata, acuta, basi profunda fenata, serraturis latis subtrunca-
tis, extropium remote acute serrata. Costa purpurascens, glabra, nervi
ano homopantes. Linea fructificantes alterna a costa ad marginem
utrinque, ad hanc lineam fructificantes, oblique, frequentes. Membrana
utrinque ad lineam sse aperens.
Similis quam maxime Appl. fenato Lin.

Aliud specimen, similis in quam plurimis, quoad figura pinnarum diver-
sum. Stipite muricato: pinna obsolete serrata, in nonnullis basi dentes
pauci, ut in altero bulboque in axillis e squamis femineis
an specie diversum?

Laperpetifolium Applenium

Habitat Per Brasiliae Commeson herb. Musc.

Stipes semiteres, levis, glaber. Froni quadripinnata: penna obovata, un-
guiculata, serrata, inferne versus integerrima, subnervosa, basi acuta, subpé-
luta: infima sublobata vel infida. Linea gnetificantes duo in penna
pennula 3-4 si penam divisa. Membrana versus costam se aperens.
Affinis cuneata

Lilipenduloides Applanum

Habitat in insula Bourbonca Commeson herb. P. us.

Stipites plures, semi pedales, usque ad basin fere frondosi, glabri, firmiter.

Frondis pennata: pinna ^{uniquilares} externa et interna minuta, oblonga, attenuata

et si per se truncata et saepe bipartita, interna tripartita: reliqua serrata, obtusa, basi acuta: lenco fructificantes circiter 6. Membrana vesp. costam saepe aprenens

Cuspidatum Asplenium

Habitat in Penn herb. Fus.

Stipites pedales, feliiformes, semiteretes. Fronds bipinnata: pinnae alternae
unquiuulares, lanceolatae, attenuatae, inferiori extremitate uno altero
linea fructificanti geminae in singula pinna, membrana vesiculosa
se aperient

Aplenium

Habitat in caula fructus Cornu maris herb. musci

habes

Juglandifolium Aplanum

Habitat herb. ha. Martii

Stipes loric. Trorsu pinnato: pinnae remote, alternae, petiolatae, quinque, ovato lanceolatae, sive pollicares, attenuatae, integerrime, nitidae, basi extrorsum latiores, obliquae, nervi dichotomi. Fructificationes non vidi.

Demidratium A frondibus pennatis, pinnis triplex oblongis attenuatis sursum
angulatis deorsum integris planis lvs prodr. pag. 129

Habitat in Jamaica

Stipes paleaceo hirsutus glaucus. Pinnis petio lata infimo opposita
superiores alterna, b. s. tripollicares inferne pollicum lata extros
sum et superne serrato subnatis fructificationibus pluribus lineari
bus

^{tu}
tenuum A. *Quadratus* pennae folioli rhombeo oblongo, obtusi in eis serratis

Loeff. prodr. pag. 00

Habitat in nova Zelandia

non vidi

placidum A. folioli alternis remotis pennatis, segmentis linearibus stratis

Forst. prodr. pag. 80.

Habitat in nova zelandia

non vidi

Adiantodes

lanceolatum A. fronde pennata: pennis linearibus pennatifidis laciniis linearibus,
apice dentatis, stipite hirsuto

Adiantum africanum n. m. muroni facie omulorum, segmentis
longioribus acutis Planch. alm. 10. t. 123. fig. 6

Applenium lanceolatum: frondibus pennatis, lanceolatis; pennis
oblongis acutis, pinnis alternis. Forst. descr. pag. 105

Habitat in Cap. b. spei, Insula franco, Arabia

Stipes pedalis altero latere convexo altero sulco longitudinali
li fusius pilis copiosis fuscis hirsutus. ^{periploca} Tolia petiolata inferius
subopposita, superiora alterna pennatifida, supra linearia
subtus nervosa pilis ut inco stipita adpressa pennatifida
pennis linearibus extorsum parum lata lat. super parum
dilatis saepe bifidis apice bif. bidentato promissis

promorsum A. fronde tripinnatifida, pinnis subuneiformibus, pinnulis apice
erose-dentatis Sw. prodr. pag. 130

Habitat in Jamaica

Stipes teretis sulcus glaber pedalis. pinnae sessiles - alternae ^{pollidares}
uneato apice unice dentatae sunt lineo fructificantes

pinnata

apice
unice fructu

erofum A. frondibus pennatis: pinnis trapezio-oblongis striatis
sicut erofii basi acutis lin. 1. v.

Applenium simplex nigrum, foliis oblongis acuminatis
margine quasi laciniatis Brown. jam. 94.

Habitat in India occidentali

Stipes lavis. pinnis petiolato alternis in acumine longis alternate
mutatis, palmatis glabris, supra striatis nervosis, serratis ^{remota inaequaliter}
basi integerrimis ^{factis} ^{fructibus} ^{triangulis} lineis parallelis distantibus marginem
haud adhaerentibus

sicut serratis

lanicollatis attenuatis

Descriptio ad adu. Applen: foliatum amandatur

falicatum fl. fronde pennata: pinnis falicatis acuminatis incis
seratis: basi integra Retz. obs. 6. p. 37.

Silix non Vanosa zeylanica, foliis adianthi in modum serratis
Murm. zeyl. p. 97. t. 43.

Trichomanes adianthoides frondibus pennatis: pinnis basi
formibus acuminatis incis serratis, serratis bifidis
Lin. f. v. p.

Habitat in India orientali

foeres cultifolii Guss. v. t.

Not. descript. adianthi eropi huius pertinet

Dissectum A frondibus pinnatis; pinnis alternis lanceolatis subserratis;
^{pinnis serratis, apice cordatis}
~~basibus superne rectangulis, inferne rotundatis Sw. prod. pag. 130~~
Lonicitidis dentata pinnularum caerulearum Dissecto Plum fil.

46.

Habitat in Jamaica.

byolliacae

Stipes filiformes laevi nitidi, Pinnae sessiles suboppositae angustae
in acume lineare attenuata inferne incisae superne dentatae

caudatam A. Solioli pennatis di linearibus apice setaceis, segmentis
obtusis apice inciso serratis, stipite hispido herbis Torr. pro
no. 10

Habitat in nova Zeelandia

ab App. descripto Sw. non differt et auctoritate Sw

Stratum A. frondibus pennatis: pinnis pennatifidis obtusis crenatis:
terminali acuminata.

Tulix Strata, pinnis crenatis, major et minor Pet. fol. 113. 114.
Tab. 3. fig. 4. Plum. fol. 15. 16. Tab. 10. 19.

Habitat in America

non vidi

polypodioides A. frondibus pinnatis. pinnis lanceolatis attenuatis penna
4-fida laciniis obtusis subentegimis

Habitat in India occidentali

affinis fructo. penna petiolato alterno tri- v. quadripollicariis ulti-
mi connatis apice serrato laciniis subdentatis

Forstia folium A. fronde pennata pinnis lanceolatis attenuatis inciso serratis

Habitat in India occidentali

Stipes pedalis glaber. foliola simplicia infima opposita, superiora
alterna ultima confluentia, bifidipollicaria attenuata. Linea
fructificantes ad costam

bident

Platyspermum A. frondibus pennatis: pennis lanceolatis serratis alternis

Habitat in India occidentali

Stipites pedalis glabri. foliola subpetiolata alterna cincta

tripollicaria glabra basi sursum transversa deorsum arcuata

serrata subnervis serratis bidentatis basi integerrima

linea fructificantes parallela subopposita

aquaticum Applenium frontibus pinnati pinnis ovatis
repandis crenulatis

Fructibus aquatica membrana tenaci contexta

Plum. fil. p. tab. 87.

Habitat in India occidentali

Stipites plures glabri. Folis petiolata alterna
repando subpinnatifida glabra basi pollicis
bines lato. lineo fructificantes. Sub secundum
nervos parallela

^{o. m.}
~~Chirophyllum~~ frondibus apice radiatis: pennis ovatis ^{foliis} repandis ^{superioribus} subauri-
sis ovatis: ~~marginibus~~ ^{pinnis} remotis integerrimis.

~~Louchei~~ affinis facie, pennulis variis ^{f. subrotundis} ex utroque late-
re auriculatis Noan hist. 1. p. 76. v. 29. fig. 1.

Habitat in India occidentali

Stipes striatus glaber ^{superne} compressus ^{marginibus} tenuissimis ^{decur-}
rentibus. ^{res pennis} Fronds: pinnolato alternis ^{remotis} superioribus simplicibus
inferioribus pennatis: pinnis oblongis cuneatis alteris latere oblique
basi acuto ^{exterioribus} dentatis ^{inferius} integerrimis ^{superioribus}
subnatis lobis dentatis ultimis ^{superioribus} subnatis
querrimis ^{remotis} linearibus ^{fructificantes} parallelis

Japonicum frondibus pinnatis: pinnis acutis inciso-pinnatifidis
bimulatis; stipite squamoso Thurb. &c. pap. pag. 332. pag. 434.

Habitat in Japonia

Styis compressis sulcatis, inferne squamosis, superne glabris, cretulis
bipedalibus. Frons pinnata. Pinnis oppositis sessilibus, lanicolatis acutis
inciso-pinnatis, palmatis; inferiores longiores; suprema inciso
subtriangularis, acuminata: lobis ovatis, obtusis, bimulatis. Linea
fructificantes disci parallelae, approximatae, tres vel quatuor
costigulae

confer Pet. falc. p. 112. tab. 9. fig. 2.

Plumieri Scovola ^{Scovola} foliis obovatis glabris integerrimis
Scovola Plumieri Len. - f. V. pag.

Squamosum A. frondibus pennatis: pennis acuminatis incis, plicata
squamoso.

Lonchitis ramosa, caule squamoso. Petrus. fol. 112. Tab. 5. fig. 2.

Habitat in America

Lingua cervina ramosa, foliis acuminatis et pinnatis Plum. fol.
p. 86 t. 103

monanthemum a frondibus pennatis: pennis trapezii obtusis superne
crenatis; Linea fructificationis unica Lin. Mart. 130⁺. V
pag. 933

Habitat ad Cap. b. speci

Folius adnanti, Stipes lani niger nitidus. Pinna alterna sessile apice
rotundata, basi truncata, unguicularia infima et extrema pinna
minora, glabra, versus marginem inferiorem linea fructificans cuius qua-
na lineam secta per pinna quadruplo brevior

asplenium monanthemum: pennis trapezi formibus obtusis
lanceatis, pinnis integris, linea fructificationis subsolita
rui Smith. ec. 3. p. 73. t. 13.

forte species Coccoloba

Superne serratis
Adiantum f. trichomanes bermudense maximum
lanceatis foliis acuminatum Pluken. tab. 125.
fig. 1

ancipr A. fronde pennata trapeziformi oblongis sursum ^{subcrenatis} ~~sessulatis~~ multifloris
stipitibus ancipitibus

Habitat in

Stipites nigrici et glabri palmares compressi superne inter fronda
folia lineo utraque tenui membranacea ^{secusante}
pinna sessiles ^{semperque palmati} suboppositi, oblonga basi sursum obliqua
superne crenae una et pauca minuta lineo fructificantes
o. breves

Dentatum L. Frondibus pinnatis: pinnis exsiformibus obtusis crenatis-emar-
ginatis.

Polytrichum patabile dentatum Plum. amer. 35. t. 50

Trichomanes latifolium dentatum Plum. fol. 7. 101.

Trichomanes fructum vulgari faciei Pet. fol. 120. t. 2. fig. 15.

Habitat in America meridionali

glabra

Stipites plures filiformes, palmates vel ultra. Pinnae alternae petio-
latae oblongae venis emarginatis sive unguiculatis, glabrae linea
fructificantes quatuor vel sex in singula

oblongis omnibus distinctis

mannum A. pennis obovatis serratis superne gibbis obtusis. basi
tuncatis

Tilicula manina ex insulis Sveciadis Brauk. per 349

Chamofila manna anglica Moif. hist. 3. p. 573. f. 14. v. 3. fig

²⁵
Habitat in anglica et insulis Sveciadum

stipites palmares glabri superne et pennis pedibus unrentibus marginati
Pennis ovato serratis ^{alternis} ut unguiculatis infero remotioribus minoribus

singula 4. 6 floribus.

varietas B. ad Trich. dent. pertinet cui synonyma adjienda

Trichomanoides A. pennis subrotundis crenatis fl. Dan. tab. 119

Trichomanes Lam. epit. 925.

Trichomanes f. *polytrichum officinarum* Bauh. pin. 356. Plum. fol.

26. Tab. V. fig. 1.

β. *Trichomanes* foliis eleganter incisi Tournef. Fl. II. 539. 7315.

fig. 4. C

Quartum maximum segmentis subrotundis Pluken. phyt. tab.

173 fig. 6

γ. *Trichomanes minus* & *Venerius* Bauh. pin. 356.

Habitat in Europa supra ripam inque Oriente

Stipites plures cespitosi; digitales nigri nitidi; folia sessilia, semi
unquivalana, extrosum crenata aut convexa extrosum
integerrima, leneo fructificantes unites 6

vnde A. Gondibus pennatis: pennis subrotundis crenatis basi truncatis
Hudf. fl. angl. pag 453.

Trichomanes costa vnde quandoque bifida foliis denticulatis
crenatis Raj. syn. 119.

Habitatio

Trichomanes foliis eleganter incisus Tournef. F.R. 4/ 539. t. 350
fig. 2. C.

Adiantum mantium segmentis rotundioribus Pluken. phys.
t. 73. fig. 6.

Habitatio Europa

affinis A. trichomanoides. Stipites palmari glabra glabris
mes: pinna inferiori opposita superior alterna subpetiolata
oblonga basi ^{demum} acuta obtusa ⁱⁿ ^{plumae} ^{marginibus} ^{crenatis} ^{quam} ^{flore} ^{flore}
osium totum occupantibus

oblonga

microphyllum A. frondibus pennatis oblongis subnatis serratis

Habitat in Helvetia

Affinis Trichom. pinnae inferiores rotundiores superiores alternas
utrinque acute suspensae latiores

alternifolium A. Frondibus pennatis: foliulis alternis cuneiformibus
superne incisis Linn. S. V. pag. 933. Faug. Musc. 2. p. 51. Tab. 5. fig. 2.
Asplenium caule pennato pennis imis trifoliatis superioribus simpli-
cibus dentatis Hall. hist. pl. n. 1690.

Asplenium Bryonii

Habitat in Europa

Stipites caespitosi glabri, nigri nitidi. Frondes pennatis infimis
foliola ternata superiora simplicia, cuneiformia.

bulbiferum A. Frondibus bipinnatis: pinnis decurrentibus oblongis obtusis crenatis
subpinnatifidis que ^{in pinnis paleaceis}
Oppletum bulbiferum frondibus subbipinnatis, foliis decurrentibus
oblongis obtusis pinnatifidis, fructificationibus proleptis ^{topp. prod. pag}

00
Habitata in nova zelandia

Stipites sesqui pedales glabri adpressi paleis candidatis. Folia alterna
petiolata, intermedia longiora tri pollicaria. pinnis alterno semunqui
culari, basi acuta utrinque crenis trifidis vel in tribus lacinis secta
extimis subconfusatis. ^{viden. vel tridentatis utrinque integerrimis}
fructificationes magna distans totum fere complectens

incisum A. frondibus bipinnatis pennis incisio

Habitat.

Lotho vudu pithamoum. folia petiolata alterna appressa
pinnata, pin superiora pinnatifida. Pinnae basi acuta superius
inciso subtrilobae

minimum. A. frondibus bipennatis: pennis oblongis serratis
Habitat in India occidentali
a reliquis omnibus differt pennis minutis

an *Loxites* minima, variosa Plam. fol. tab. 50?

~~serotinum~~
nubifolium

A. frondibus bipinnatis pinnis inferioribus pinnatifidis lacinis obovatis
superioribus oblongis obtuse serratis fructificationibus lineari-
Habitat in India occidentali.

Stipites sesquipedales glabri laeves. Solia petiolata alterna, per pinnas
remota foliola petiolata alterna inferiora pinnatis pinnis dicitur
ventibus obovatis apice obtuse serratis, superiora oblonga basi atten-
nuata sublobata seu fere pinnatis apice obtuse serrata, terminalis
linearis attenuata remote alternatim serrata. fructificationibus
linearibus.

an nita maxima foliis oblongis crenatis Boan herb. tab. 46.

Cicutanum A. fronde tripennata glaberrima, superioribus pinnatifidis, foliis
lanceolatis integris.

Radix murana ascendens, filicula non ramosa minima Sloan. herb.
1. pag. 92. Tab. 52. fig. 3.

Habitat in America

Radix fomentosa. Stipes filiformis, glaber, palmari vel parum
ultra. folia alterna pinnatifida lacinae pinnis decurrentibus
cuneatis apice bis tridentis glabris late vixibus. Fructificatio
nes solitane vel geminae oblongae in singulis foliolo

— — — bipennata — — — pinnis decurrentibus cuneatis
apice bis tridentatis fructificationibus oblongis

Ruta muraria frondibus alternatim decompositis. folioliis cuneis
sermibus crenulatis. fl. Dan. tab. 190

Paronychia Cam. epit. 709.

Ruta muraria Bauh. pin. 356.

Habitat in Europa ex nemum fuscum &

stipes cespitosi viridis digitales glabri. Folis pinnis quatuor
sive tres alterni ultimis pinnatis oblongis apice serrula
si subtus fectus fructificatione

Trichomanes ramosum A. frondibus duplicato-pinnatis. foliis alter-
net: pennis lanceolatis inciso-serratis. ~~fl. Dan. Tab. 250~~

Trichomanes ramosum majus et minus Bauh. pin. 358.

Trichomanes ramosum Bauh. hist. 3. p. ~~747~~ 755

Habitat in Arverno rupibus

Crispum G. foliis reniformibus crispis scabris, caule fruticoso len.
Mant. 257. Berg. cap. 126. P. V. p. 6134

fragrans A. Frondibus subtrepennatis, foliolis alternis, pinnis lanceolatis
latiusculis, apice serratis W. prodr. pag. 130
Habitat in Jamaica.

non vidi

Adiantum nigrum L. frondibus subtripinnatis: foliis alternis: pinnis
lanceolatis incisiferratis fl. Dan. Tab. 250

Dryopteris nigra God. pempt. 446.

Adiantum foliis longioribus pulverulentis, pediculo nigro
Bauh. pin. 355.

Adiantum pulcherrimum Bauh. hist. 3. p. 737.

Habitat in Italia, Gallia, Danica, Hibernia, Anglia

Species ^{ad} pendens niger, nitidus foliola pinnata alterna.

pinnis oblongis ~~semit~~ denticulatis serratis basi acuta integerrimis
in flore imbricatis quatuor contiguis

Supina M. floribus capitatis, foliis ovatis serratis, caulis procum-
bentibus