

Asfonia

Crotolon Pentapetes

^{Boffer}

Habitat herb. mus.

Rami teretes, ~~superne~~ angulati, incani. Folia petiolata, sesqui-pollicaria, cordata, oblanceolata, attenuata, acuta, integerrima, venosa, rugosa, supra glabra, subtus incana. Pediculi axillares, biflori, incani.

puberifolia Dombeya

Habitat in Java herb. Arch. 7

Rami superne flavescenti tomentosi. Folia petiolata, alterna, 3-4 pollicum
oblonga, basi ovata, attenuata, acuta, versus apicem dentato-sinuata, ^{trinervi,}
supra glabra ^{nervi} nervosa, arena, subtus tomentosa, venosa. Stipula ^{trinervi} petiolaris gla-
bra. Calyx ^{trinervi} fructifera 5-partitus: laciniis ovata, acuta, venosa, villosa, un-
guiculari. Racemi axillares, brevissimi, 7 flori: pedicelli unguicularis
pedunculo parum longiores. Fructus globosus.

Folia ex arb. Pentapet. *puberifolia*

angulata Dombeya

Habitat herb. Gusf.

Folia 4-5 pollicaria, supra glabra, subtus villosula, nervis, nervis tomentosis, crenata. Pedunculi axillares, bifidi, cum flore in divisa: pedicelli racemosi, secundi.

Antennaria Dombeya.

Habitat in herb. Guaf.

Rami teretes, cortice cinereo, superne villosi tomentosi. Folia 3-4 pollicaria, 3-5 angulata, sublobata: lobi rotati, attenuati, inaequaliter crenati, raro 7loba. Pedunculi axillares & terminales, hispiti, apice bifidi. Pedicelli mucronati, pauci cum pedunculo indivisi.

Erythroxylon Pentapetes foliis lanceolato-cordatis, crenatis acuminatis Torreri Dom. Gott.
1709. p. 61.

Habitat in nemora Trif. Heleno &

Caulis arboreus innoxialis. Rami patentes fasci crenaticatus. Folia parva, conferta
netiolata, scabripetula, supra videntur subtus tomentosa albida, palmaria
Petioli obsolete angulosi, scabripetuli tomentosi, foliis dimidio breviores.
Peduncululi axillares, solitarii biflori. Flores bipollicares candidi vel rosei.
Calyx quinquepartitus foliolis lanceolatis scabri ^{exte} albida vireatibus. Petala 5
obovata Calyci duplo longiora. filamenta 10. alterna longiora apice
pauculum catiora sterilia & fertilia calycis dimidio breviora. Stylus longi-
tudine corollae: stygmata 5. filiformia. Capsula subglobosa quinqueloba
lani. Semina solitaria, ovale

palmato D. foliis palmato ^{sub} septemlobis ^{glabris} serratis pedunculatis bifidis
pedicellis racemosis

Dombeya palmata foliis cordatis palmatis septemlobis
lobis acutis serratis crenatis, floribus corymbosis Lavan
Duf. 3. p. 122. Tab. 38. fig. 1.

Habitat in insula Bourbonis

Rami teretes cuneati apice ^{infusis} pilosi. Foliorum apice ramorum
alterna patentia, palmata glabra, novem nervis nervis
subtus villosis, venis ^{profunde} 7 vel 9 lobis lobis lanceolatis attenuatis
serratis lateralibus sicuti nervis basi cordata. Petiolus
longitudinis foliorum apice pilosi. Pedunculi aeterni
longitudine petiolo longioris apice bifidi hinc rami ante flores
tam revoluti ut in asperifolii pedicelli racemosi a
latere superiore pedunculi pariter floripedicellatus
in divisa: Calycis foliola exteriora ovata interiora
lanceolata vel extus villosa-tomentosi germen
pelosum incanum

pedicelli pollicares

acnifolia A. foliis multipartiti calycibusque internodiis. Tournet. p. 90.
de sem: cent. p. V. 131. fig. 1.

an est eadem cum procedente

tiliofolia D. foliis cordatis subrotundo-acutis crenatis, floribus racemosis
corymbosis. Cavan. Desf. 3. p. 124. tab. 39. fig. 4

Habitat in insula Bourbonica 5 heb. 4 usq.

Rami circinnati. Folia 3-4 pollicaria, attenuata. Racemi bipartiti.
Flores secundae.

~~non ad.~~

1
tomentosa D. foliis cordatis subrotundis crenatis tomentosi venosi: venis
subreticularibus, floribus umbellatis Cavan. Desf. 3. p. 125. tab 39 t. 73

Habitat

h. h. h.

Rami purpureo-erubescens, tetragonis. Folia 4 pollicaria, attenuata, oblonga
crenata, subtus mollissima, supra glabra. Pedunculis bipartitis.
Pedicelli et ca. ly. ^{ca.} h. h. h.

angulata L. foliis cordatis ovato-oblongis acuminatis repandis glabris
floribus umbellatis globosis Cav. desj. 3. p. 127. tab. ³⁹ 47. fig. 4.
Habitat in insula Bourbonne 5

non vidi

populnea *Asplonia* Cavan. *Dis.* 1. 2. *Tab.* 42. *fig.* 1.
Asplonia fastuosa G. & G. *Observat.* 1307.

Habitat. in Insula Bourbonis

Rami teretes glabri. Folia versus apicem ramorum approximatam
parva, petiolata palmata cordata ovata, attenuata in-
qualiter remote dentata, venosa, utraque glabra. Petiolus
folio dimidio brevior. ^{petiolus} Pediculi axillares petiolo parum
longioris apice bifidi. parvales ramosi. calycis glabri foliolum
ovatum ad basin calycis. Capsula glabra magnitudine
Pipens

uniflora D. foliis ovato-lanceolatis oblongis subtus mucronatis subtus tomentosis pedunculis terminalibus unifloris

Habitat in Madagascaria Commaison Thourin &

Frutex ramis teretibus superne incanis: ramuli teretes alterni pollicaris. Folia petiolata alterna, unguiculata, avenia, enervia, supra ad lentem villosa tamen vincta subtus incana, mollia, apice subtus mucronem mucrone. Petiolus folio triplo brevior. Pedunculi ex apice ramulorum solitarii semiunguiculati uniflori.

Calyx ⁴⁻⁵⁻⁶⁻⁷⁻⁸⁻⁹⁻¹⁰⁻¹¹ Perianthi duplex: exteriori triphyllum: foliolis cordatis acutis interiori parum breviori: interiori pentaphyllum foliolis lanceolatis attenuatis extus villosis subtomentosis intus glabris Corolla 5 petala, petalis obovatis oblongis longitudine calycis Stamina filamenta 15 basi mucronata membrana connata inter singulum stamen foliolum petaloideum lineare obtusum extrosum parum latior longitudine corollae e membrana filamentis conruente. Germen globosum pilosum uncinatum, stylus unicus quinquefidus

1-2 velutina Pentapetes ^{Pentapetes} ^{ovata} ^{lanccolatis} ^{fomentosi} foliis ^{ovatis} ^{seratis}, floribus pentandris.

Melhamia velutina Cosk. deser. pag. 64

Calyx duplex ut in Pentap. phoenicea. Petala, filamenta et reliqua
sunt si cetero. omni no ^{met character} idem Pentapetes, differunt modo numero flami-
num. In nuperis Pentap. phoeniceam a ceteris separavit Caranulla;
sed cum des. lacedaevi auctoris ad nos nondum pervenerit, ^{et} ^{hinc} ^{neque}
^{an} Melh. ^{num} Cosk. potius erit species Dombeyo, ^{vel} ^{una} ^{an} ^{jure} ^{eum} ^{phoeniceam}
a Pentap. suberifolia divelli potest. Liberalitate ^{quidam} Puel. ^{esse} ^{per} ^{specie} ^{vero} Juss. Dombeyam
ovatam et punctatam possideo, valde affines suberifolia ^{est} ^{hinc} ^{per} ^{specie} ^{vero} Juss. ovata
genere a Pentap. Lance differunt ex his mihi non constat.

velutina ad Jonia

umbellata D. foliis cordata ovatis glabris subrepandis floribus umbellatis
Bombeya umbellata foliis cordatis ovatis oblongis acumini
natis repandis glabris floribus umbellatis globosis Cass.
Sust. 3. p. 127. t. 41. fig. 1.

Habitat in Inf. Boib. Bombay.

Rami teretes glabri. Folia petiolata utroque glabra
venosa, quinque nervia, palmata acuminata. Petiol
serquipollicares. Pedunculi axillares folio parum
breviores gemina. Pedicelli numerosi, pollicares. Ger
men unicum.

punctata D. foliis ovato lanceolatis ^{integerrimis} subtus tomentosis reticulatis, floribus
umbellatis

Dombeya punctata: foliis ovato lanceolatis longis integerrimis
subtus tomentosis, supra punctato-scabris, floribus dioicis Cavan.

Desf. 3. p. 125. Tab. 40. fig. 1. Guspeu 3.

Habita in Insula Bourbonis. ~~to mentosi~~

Rami teretes, tomentosi. Folio petiolata, alterna, quadrifollicaria supra
glabrescens, a pili minutissimi stellati prope ramos punctati, basi parum
acuminata, acumine brevi terminata, trineria, subtus venoso reticu-
lata pili brevissimi stellati scita tomentosa. Hipulo subulato ungui-
culari. Petiolus tomentosus. Peduncululi axillares foliarii, folio
breviori tomentosi. Pedicelli unguiculari ~~conspicui~~ numerosi unguicu-
lari. Anthera in meo adpressis rudimentum germinis atque
pustelli in masculis, folia supra levra neci scabra

Decanthera D. foliis oblongis repandis acuminatis, pedicellis umbelatis, pedicellis pedicellis
umbellatis, staminibus quinque fililibus quinque steri-
libus.

Dombeya decanthera foliis ovatis acuminatis repando-crenatis, flori-
bus umbellatis; staminibus quinque decantheris, quinque steri-
libus. Caran. Desf. 3. p. 126. n. 100. t. 40. fig. 2.

Habitat in Madagascariis.

Rami teretes longitudinaliter rugosi, cespitiosi. Folio-
petiolata alterna bipollicaria basi acutiuscula, venosa
superius versus repando subcrenata inferne integerrima
glabra costa subtus villosa in ana profertim inferne.
Pedunculi axillares foliis breviores. Pedicelli umbellati
unqui culores.

ovata D. foliis ovatis dentatis quinque nervis tomentosis, stylo minimo
Cab. Desf. 3. p. 127. t. 4. f. 2.
Habitat in Angula Bourbon.

non vid.

ferruginea D. foliis ovatis ^{oblongis} serratis subtus tomentosis floribus corymbosis
 Dombeya ferruginea foliis ovato oblongis septemneris subtus
 ferrugineis, petioli pedunculis calycibusque tomentosis Cavan.
 Dec. 3. p. 120. Tab. 42. fig. 2

Habitat in H^{is} de France

Rami sulcati ^{crenati} ^{inferne} ^{capicant} ^{superne} ferrugines
 tomentosi. ^{versus apicem} folia petiolata alterna, bipolliciana et
 parum ultra basi ^{pinnata} subcordata subconata supra
 a pilis stellatis ferrugineo tomentosi, supra avenia 5que
 nervia glabra subtus subseptem nervia ^{pubescente} ^{completis} ^{venis} ⁱⁿ
 ma, punctis ferrugineis pilosis in venis. Stipulae seto
 leae. Pedunculi axillares tomentosi foliis longior
 es bifidi pariterque ramosi ferruginei. ^{gera} capsula
 tomentosa magnitudine Piperis

Subaequaliter
 serrata

Tomida a.

Walcuffa Tomida B. ni: A. app. p 67. unione