

After

Aster dentatus; caulis fruticosus; foliis dentatis, subtus ferrugineis;
floribus terminalibus; pedunculis uni flori, bracteatis. Andr. rep. #.

61.
Habitat in nova Hollandia 5

Cephaeroides Forth

Calyx umbriatus squamis oblongis acutis ~~mem~~ apice
membranaceis ^{obtusis} in senonibus. ~~senonibus~~ ^{senonibus} longiori-
bus et tandem linearibus acutis

Semina papposa pappus festinis pilosis

Flores ligulati nondum observari omnes tubulosi ~~an~~ des-
mophroditi an cythra ad Polygam: aequalem spectat: semina
vero radii absq; flores inven

Sebilis A. foliis lanceolatis basi attenuatis, caule ramoso, floribus fasciculatis axillaribus, capsulis bilocularibus Hort. Kew. t. p. 163. *

Habitat in India Orientali O.

Calyx angulatus. Petala pallide purpurea. Filamenta fundo calycis inserta, eoque breviora. Anthera ovata, flavo. Capsula ovata biloculari Hort. Kew

mark. non nota

~~Repositum. polytrichum. (Hoffm.) Hoffm. 1792~~
~~non nota. abstr. non nota~~

punctatus Aster tripartitus

Hungaria
Basis tripartita ^{et paniculatus} superne in ramos floriferos. Divisus ramuli
caulis tripartitus ^{scabris et} erectus, teres, glaber laevis, penna aspera ^{scabris et} angustior
Folia sessilia sparsa bipollicia lanceolata angusta, tri-nervia
glabra, trinervia, margine scabra, utrinque praesertim superne
punctis minutis impressis Pedunculi superne alterni pollicares
vel breviores subfastigiat. Calyx glaber subsimplex foliola line-
ria corollae rudius coeruleo violaceo repleto discus luteus
rudimenta ramulorum in axillis

~~Prodrum Egerum vulm Anguete umbella glomerata involucro sulcato pube-
ris, spiculis aggregatis, quibus utroque Le. Mart. T. Eger. pag. 147.
H. abstr. in flora austriaca?~~

Laxus

Cyperus umbella laxus, spiculis terminalibus subternis, granis distinctis, valvulis subrotundis mucronatis, involucrio hexaphyllo.

Cyperus laxus; Culmo triquetro nudo, umbella foliosa latissima, spiculis subaggregatis raris squarrosis Lamarck. Illustr. t. p. 146.

Habitat in Brasilia, Capena. Ex herbario Lamarckii

Culmus 8 equipedalis, aculeo trigonus, gracilis. Folia radicalia, Culmo duplo breviora, laxa, graminea, extrossum margine & scabrae & cula. Involucrii foliola quinque, umbella longiora, foliis fere latiora. Otthrae obtusae. Umbellae radii octo, ea longiores tripollicares, laxi, capillares. Spiculae tres vel quatuor, unguiculares, quatuordecim florum: valvulae distantes, margine membranaceae laeves, coeternum & striato virides. Semen trigonum, nigrum.

Primo in habitu ita similis *C. inia*, uti si cautum facile fallit, differt vero patria, umbella simpliciori, spiculis terminalibus nec digitalis nec alternis. Si Sloanae i. figurat. 75. f. l. huius pertinet, pessimum est et nullius momenti.

Longobard Aster

La Marche

Habitat herb. frus.

Totus glaber. Caulis erectus, teres, subternatus, superne ramosus. Folia
semiamplexicaulia, lanceolata, acuta, medio remote serrata, sub
tus glaucescentia, venis pinnatis. Flores ex apice ramorum, solita
ri, uniflori. Pedunculi foliosi. Calycis foliola lanceolata.

After

Habitat in Carolina Bosch. herb. Desfont.

Caulis erectus, teres villosulus. Folia frequentia, sessilia, simpliciterveana, lanceolata
4a, acuta, integerrima, glaucescentia, glabra, margine scabra. Peduncululi super-
ne, axillares solitarii brevissimi; squamis paucis. Calyx laxe imbricatus
canescens: foliola linear-lanceolata

infernus Aster

Habitat in Carolina herb. Rich.

Caulis erectus, herbaceus, superne in pedunculatos diviso, scaber. Folia petiolata, ses-
qui pollicis longa, oblonga, utrinque attenuata, acuta, integerrima, scabra, venosa
senis villosa. Pedunculi ramosi, patentes, pauciflori, pubescentes, nudi. Folio-
la calycis lineari lanceolata, lara.

acuminatus Aster

Habitat in Carolina herb. Rich.

Caulis erectus, simplex, pubescens, superne flexuosus. Folia subpetiolatis, bipollicina
na et ultra, oblonga, apice vix attenuata, remote dentato-serrata, basi ver
sus integerrima, glabra, levia. Pedunculi superne, patentes, ramosi, pauciflori
Pedicelli uniflori, pubescentes, squamula unica instructi. Calycis foliola gla
bra, lineari, laxa

Fabulae Alter

Habitat in Carolina Herb. Ruth.

Habes

Biflorus Aster

Habitat in Cantena herb. Ruth.

Caulis interdum 1.2.3. flori, simpliciter

manilensis Aster

Coryza asteroides

Habitat in America septentrionali herb. kuh.

Caulis erectus, herbaceus, glaber, subangulatus, folia inferiora in petiolum attenuata, superiora sessilia, oblonga, avenia, subtinnervia, margine serrulata et siaba ex trocha remote, obscure obtusaque serrata. Corymbi ex axillis supremis et apice simpliciter, subquadri flori, solum ad basin singuli pedicelli, coeternum aphylli. Calyx obovatus, imbricatus. Sepala lanceolata, obtusa. Flores albi

racemopus Aster

Habitat in Carolina montibus herb. Ruth.

Caules herbaceus, erectus, villosus, canescens. Folia lanceolata, basiamplexicaulis inferiora basi angustata, pollicaria, undulato serrata. Pediculi axillares solitarii, uni vel squiflori, squamosi, superne racemosi. Flores sessiles. Calycis foliola lanceolata, linearia.

Dwarf-folius Aster

Habitat in Carolina herb. Reich.
affinis *A. undulato*

herb. Reich.

Junulofo Aster

Habitat in Carolina herb. h. h.

pedunculi superiores, interdum 2. interdum 3-4, uni vel biflori. Summitati
procumbentes. Caulis simplex.

puberulus Aster

Habitat in Carolina herb. Kunt.

habes

After

Habitat

Mont Panif.

Caulis herbaceus, erectus, glaber, apice villosulus. Folia pollicaria, linearia, septem
lana, integerrima, glabra: radicalia 3-4 pollicaria, in petiolum attenuata, lineari
lanceolata. Pedunculi superne, pauci, alterni, uniflori, foliosi. Calyx villosus,
foliola lineari-lanceolata. Corolla aff. Tripolii major

toxicifolius Aster

Habitat in Carolina West. Mich.

Caulis ramosus

Cuneatus Aster.

Habitat in Carolina herb. Desfont.

Caulis tenuis, pubescens, striatulus, superne ramosus, subaequalis. Folia
subopposita, oblonga, basi petiolata, obtusa, basi versus attenuata, integri-
ma, glabra supra, margine scabra. Corymbi terminalis simplicis, 6-8 flori.
Folia duo sessilia sub calyce. Calyx turbatus. foliis oblonga apice
obtusiusculis villosa. Flores majusculi.

Solidagineus praeteris est

brachiatus Aster

Plutina Tab 79. fig. 1²

Habitat in America boreali herb. Tusf.

Caulis erectus, teres, striatus, superne ramosus, glabrusculus; rami alter
ni subfastigiati. Folia opposita, bipinnata, lanceolata, acuta, venosa, glabra,
subtus pallidiora, margine a ciliis aculeo armato videndis, ^{albi} Pedunculi
ex axillis et apice, uniflori. Pedunculi nudi. Flores parvi. Calycis foliola
lanceolata, pappo breviora. Pappus nescens
affinis divaricato

β folus lato lanceolatus

γ folus subtus villosi, pedunculis brevibus fastigiatis

amplexicaulis Aster

Aster canadensis subhispidus foliis peltatis floribus coccineis Tournef. I. v.
herb. pag.

Habitat in Canada herb. Guss.

Caulis herbaceus, erectus, teres, ramifus, villosus. Folia lanceolata, amplexi-
caulia, bipollicaria, integerrima, acuta, scabra, utraque pubes minutis, sub-
tus pallidiora. Pediculi ex apice ramorum et axillis supremis, solitarii,
cinniflori, folia 2-3 sub calyce ceterum apophylla. Calycis foliola linearis-lanceo-
lata, lata. Pediculus longus. Pappus purpurascens.
confer cum Ast. Novo anglis

incanus Aster

Habitat circa Petrum Incanville herb. Fusf.

Incanus. Caulis herbaceus, erectus, superne ramosis. ^{integerrime} Solcia sespites, lan-
ceolata, semi-pollucaria, avenia, enervia. Pedunculi solitarii, uniflori, ru-
di

Andropogon Callicarpa

Habitat in India orientali & Ind. Ausf.

permelus Afler

Habitat in cap. b. p. i. herb. Royani

Planta prostrata, erecta, e frigidis rari scabra, basi amara: rami simpliciter pinnati in
pedunculo unifloro depressos. Folia denticulata
↳ minus pinnata

confer ulterius cum Afl. Tenello

polifolius Aster folus linearibus, caule fruticoso, ramis incanis, pedunculis unifloris elongatis

Habitat in Cap. b. pra. herb. Royen. 5

Trunculus ramis teretibus, subramulosis, superne tomentosis incanis, venis. Solea
quenda, linearia, prostrata, sessilia, glabra, ovula armata villosa, ramulorum et supremata
nascantur, state glabra. Pedunculus primum terminalis, deinceps lateralibus, bipollia
ris, solitariis, erectis, unifloris, incanis, aphyllis. Stos coerulei, magnitudine
astari Venelli. Calyx imbricatus, canescens. Squama linearibus oblongis.
Confer cum Anula asotricha cui flos luteus.

Jalenus Aster

Habitat in Sibiria herb. ha. Mantini

Caulis herbaceus, erectus, superne in ramos floriferos divisi, striatus glaber

Folia pollicana, lineari-lanceolata, glabra, integerrima, avenia, serrata.

Corymbi simpliciter: pedicelli squamis paucis lanceatis adpressi. Calycis foliola lanceolata. Flores 3plo vel 4plo maiores quam in Ast. Tripolo. Corollulae radii angustissimo

pinnatus After folio pinnatis: pinnatis pubescentibus apice
dentatis Cavan. Ic. vol. 3. pag. 6. Tab. 212.
Habitat in nova Hispania 4

non idi

adms A

abyssinica Poa panicula patula spiculis 8nifloris, foliis filiformibus ones
barbati ^{vel} caule ramoso.

Poa abyssinica panicula patula, spiculis oblongis 3niter quinque
flori culmo geniculato inferne procumbente ramoso Haeyn.
Musc. 2. p. 364. Ic. rar. 8. 43.

Habitat in abyssinia

Caules Culmi numerosi vel basi ramosi bipedales et filiformes
erecti. vagenata ~~ita~~ glaberrima exceptis oris vaginarum
pedunculi flexuosi ramosi. Spicula oblonga et remotiflora
calyce longior. Salvula lanceolata.

glutinofus - After caule fruticoso foliis ovatis ^{oblongis} serratis sessilibus
glutinofus Cavan. Ic. 2. p. 93 t. 168.

Habitat in Mexico 5

Caulis fruticosus bipedalis ramosus ramis alternis unifloris
glutinofus: uti tota planta. Folia nonnihil glauca
utroque punctata squamulis minutis sparse vix. Flores
magni lutei. Calyx imbricatus squamis lineatis subopaco
libus inferioribus cartilagineis. Semina ovata coronata papae
sessile subplumoso. Receipt. nudum Cavan

non vid

Vatanius A folus radicalibus lanceolato ovatis serratis scabris, caule pauci
floro Lin. Suppl. p. 373. f. V. 763.
Habitat in Libinia 4

chinensis A. foliis ovatis oblongis integris sinuatisve ciliatis, calycibus foliaceis
patentibus ciliatis Hort Kew. 3. p. 200

After chenopodii folio, annuus, flore ingenti petiolo dill. Clth. 30. 1. 34.

fig. 30.

After chinensis foliis ovatis angulatis dentatis petiolatis, caulibus patentibus
foliis terminalibus Lin. S. V.

Habitat in China C

macrophyllus A. foliis serratis oblongis. supremis ovatis sessilibus; caulinis cordatis
petiolatis: petiolis superioribus alatis Hort. kew. 3. p. 207.

Aster canadensis, foliis imis amplioribus cordatis serratis Vaill. act.
Paris 583.

Aster macrophyllus foliis serratis: radiceibus maximis cordatis trinervi-
vatis: caulinis ovatis sessilibus Lin. Spec. pl. pag. 1232 t. 1. v.

Habitat in America septentrionali.

variet foliis radiceibus oblongis cordatis et foliis radicalibus ovatis
cordatis

maieri A. foliis sessilibus lanceolatis subserratis glabris, calycibus imbricatis sepalis
acutis, disco radioequali, caule villosiusculo Hort. kew. 3. p. 205

Offet *maier* foliis serratis: ramorum integerrimis, floribus ovatis: disco
radio longiore. Lin. Spei: pl. pag. 1232 & f. v.

Habitat in Am. septentrionali &

Tandiflorus A. foliis sessilibus lanceolatis basi attenuatis serratis glabris, calycibus latis.
foliis lanceolato-linearibus subaequalibus glabris Hort. Kew. 3. p. 209
Aster tandiflorus: foliis parvis lato lanceolatis serratis oblongis: basi festis
seu semiamplexicaulibus, caulis prostratis, floribus terminalibus
Spec. pl. pag. 12317 S. V.
Habitat in America septentrionali

novi belgii A. foliis subamplexicaulis lanceolatis glabris margine serratis:
inferioribus serratis, ramis subdivisis, calycibus laxa imbricatis: folioliis linearis
lanceolatis, caule tereti glabro Hort. nov. 3. p. 206

Alter novi Belgii latifolius umbellatus, floribus dilute violaceis Heron.
Leyd. b. 66. t. 6y.

Alter novi Belgii foliis lanceolatis subserratis sessilibus, caule panicu-
lato, ramulis unifloris solitariis, calycibus squamosis Lin. Hort. Ups. 262x
S. V. pag.

Habitat in Virginia Pennsylvania &

variet foliis viridibus et glaucis

Tradescantia A. foliis lanceolatis serratis sessilibus glabris, ramis virgatis, calycibus
ante imbricatis, caule tereti glabro Hort. Kew. 3. p. 204.

Aster virginianus ramosis finis serratis, parvis floribus albis *Tradescantia*
mon. hert. 3. p. 121.

Aster Tradescantia foliis lanceolato-linearibus medio serratis, pedunculis
foliosis, caule ramoso, calycibus erectis her Hort. Ups. 2 62 & 65

Habitat in Virginia 4.

variat floribus concoloribus et albis

mutabilis A. foliis subamplexicaulis lanceolatis serratis lobis inferne attenuatis, ra-
mulis virgatis, calycibus subfoliaceis latis, caule glabro Hort. kew. 3. p. 205

Aster novi Belgii latifolius paniculatus; floribus saturate violaceis
Herm. Lugdb. 65. t. 67.

Aster mutabilis. foliis lanceolatis serratis, calycibus squarosis, panicula subfasti-
giata Lin. Spec. pl. pag. 2230 t. L. V
Habitat in America septentrionali 7

Lonicera A. foliis amplexicaulis oblongis integerrimis laevibus: radicalibus subserratis,
ramis simplicibus subserratis, calycibus imbricatis: foliis subserratis acutis
apice incrassatis, caule glabro Hort. kew. 3. p. 206.

Aster loni: foliis lanceolatis sessilibus lobatis subserratis, pedunculis foliis subserratis
vitis Len. Spec. pl. par. 12304 S. V

Habitat in America septentrionali 7

punicus A. foliis amplexicaulibus lanceolatis serratis scabriusculis, ramis panicu-
latis, calycibus latis discum superantibus. foliis linearilanceolatis subqua-
libus, caule hispido Hort. kew. 3. p. 200

Aster americanus latifolius, puniceis caulibus Herm. Lugdb. 649. 7. 657.

Aster punicus foliis amplexicaulibus lanceolatis serratis scabri, pedun-
culis alternis subunifloris, calycibus discum superantibus Lin. L. V
Habitat in America septentrionali 4

variat caule 7 pedali saturate purpureo, octopedali e viride rufescente et tripe-
dali.

Cordifolius A. foliis cordatis anguste serratis subtus pelosi petiolatis: petiolis
subsimplicibus, ramis paniculatis caule hirsuto Hort. Kew. 3. p. 207

after *latifolius autumnalis* Pers. canad. 64. t. 65:

after *latifolius glaber humilis ramosissimus*, flore parvo conice, foliis ad basin
cordatis Mon. hist. 3. p. 121. f. 7. t. 22. fig. 34

after *cordifolius*: foliis cordatis serratis petiolatis, caule corymboso, pedunculis
aphyllis, caulebus teratis Lin. L. V. p. 7 687

Habitat in America et Asia septentrionali 7

grandiflorus A. foliis linearibus integerrimis sabamp. lenticulebus hispida ciliatis. ramo
rum calycisque reflexis Hort. kew. 3. p. 200

aptes grandiflorus aptes: squamis reflexis Dell. Clth. 41. t. 36. fig. 41.

aptes virginianus: pyramidatus, buglosi foliis apertis, calycis squamulis foliaceis
Mart. cent. 19. t. 14.

aptes grandiflorus foliis complexiculis angulatis integerrimis, ramis unifloris
calycibus squarosis Lin. L. V. pag. Mell. ci. 202

Habitat in America septentrionali.

undulatus A. foliis serratis pilosis undulatis: inferioribus cordatis: petioli alatis basi
dilatatis, ramulis sergatis, calycibus imbricatis caule hispido Hort. Kew. 3. p. 206
after novo anglica purpureus, vixto auresc facie et foliis undulatis Herm
parad. 96. 7. 96.

Aster undulatus foliis amplexicaulibus undulatis subtus tomentosis, flori-
bus racemosis ascendentibus Lin. S. V.
Habitat in America septentrionali 7

Novae angliae foliis lanceolatis integerrimis cordatis amplexi caulebus pilosis,
calycibus discum superantibus latis: folioli linear-lanceolatis subquadratis,
caule hispido Hort. Kew. 3. p. 20.

After novae angliae altissimus hirsutus, floribus amplis purpureo violaceis
Herm. persid. 98. Tab. 98

After novae angliae: foliis lanceolatis alternis integerrimis semiamplexi
caulebus, floribus confertis terminalibus, caule hispido lin. Spec:
pl. rar. 1224. S. V.

Habitat in Nova anglia 4

varia ramis brevissimis ^{pub} confertis et ramis numerosis paniculatis

linifolius A. foliis linearibus integerrimis scaberrimis, ramis corymbose fastigiatis
foliolosis, calycibus imbricatis, radiis disco subaequalibus Hort. Kew. 3. p. 200

Alter linifolius: foliis linearibus acutis integerrimis, caule corymbose ramo
sesimo Lin. V. pag. 761x

Habitat in America septentrionali

linariifolius A. foliis linearibus integerrimis mucronatis scabris fructibus: superiori-
bus longe remotis, calycibus imbricatis, ramis saepe quadratis Hort. kew. 3. p. 198

~~Cyper~~ amencanus frutescens, saturo foliis scabris, floribus amplis saturate
violaceis Pluker alm. 56. t. 14. fig. 7.

Aster linariifolius foliis linearibus integerrimis mucronatis scabris carina-
to, pedunculis foliopsis dentatis pl. par. 12207. t. 1. v. p.

Habitat in Anene septentrionali 4

ericoides A. foliis lineanbus integerrimis glaberrimis: ramulorum subulatis
approximatis; caulinis elongatis calycibus subquarrosi: foliis acutis
caule glabro Hort. kew. 3. p. 702

~~Aster *ericoides* dumosus Dill. Elth. 40 t. 76 fig. 46~~

Aster caule paniculato, floribus racemosis, calycibus patulis oblongis, foliis
subulato-lineanbus Royer Lugd. 168

Aster *ericoides* foliis lineanbus integerrimis, caule paniculato, pedunculis
racemosis: pedicellis foliosis Lin. L. V.

Habitat in Europa australi.

excl. Symb. Dill.

Solidus A *foliis lanceolatis*, *lanceolatis* *integerrimis* *glabris*: *ramulorum* *patentissi-*
mis, *calycibus* *imbricatis*: *foliolis* *acutis*, *caule* *pubescente* *Hort. Kew. 3. p.*
202.

Aster *enoides*, *meliloti* *agraria* *umbone* *Pell. Elth. 39. t. 33. p. 39.*

Habitat in Am. sept. 4

Dumofus A. foliis linearibus integerrimis glabris: ramulorum brevissimis, ramis paniculatis, calycibus cylindraceis acuta imbricatis Hort. kew. 3. p. 702.

Aster novo anglicus, Linnaei foliis, chamomeli floribus Herm. parad. 95. t. 95

Aster americanus multiflorus; flore albo bellidis: disco caesio Plukh. alm. 56. t. 78. fig. 6.

Aster *Dumofus* foliis linearibus integerrimis, caule paniculato, floribus terminalibus her. Spui: pl. pag. 1227. t. V.

Habitat in America septentrionali ?

varia radio pallide violaceo caule pubescente et radio albo caule glabro

amellus A. foliis oblongo lanceolatis integris scabris, ramis corymbosis, calycibus imbricatis subquarosis: foliolis obtusis: interioribus membranaceis apice coloratis. Hort. Kew

3. p. 194

after Atticus Dod. pempt. 266.

after P. Italorum Turchi Clus. hist. 2. p. 16.

after atticus conleus vulgari Bauh. pin. 267.

after amellus: foliis lanceolatis obtusis scabris trinerviis integris, pedunculis nudis fasciculis corymbosis: squamis calycinis obtusis linc.

Habitat in Turonia australi apertis collibus 2

varia foliis obovato lanceolatis planis, corollae radii numerosissimi subimbricatis
et foliis lanceolatis rugofuscis subundulatis, corollae radii divariatis

Tripolum A. foliis linear-lanceolatis integerrimis carnosis glabris trinerviis, foliolo
calycinis submembranaceis obtusis Hort. Kew. 3. p. 199

Tripolum Dod. pempt. 3079.

Tripolum majus conuleum Bauh. pin. 267

Aster *Tripolum* foliis lanceolatis integerrimis carnosis glabris, ramis
inoequatis, floribus corymbosis Lin. 1. V. p. 761. Gmel. fib. 2. p. 107. T. P. O.
fig. 2. Flor. Dan. tab. 615. Haeyn. collect. p. 55.

Habitat in Europa littoribus maritimis et ad Sibiriâ Caucasos &

Gmel. 2. p. 107. T. P. O. fig. 2

variat flore radiato et discoides

fibrinicus foliis lanceolatis subamplexicaulis ferratis pilos. Rabris, calycibus laxi
folioli lanceolatis acuminatis foliaceis hispida Hort. Kew. 3. p. 200
Aster foliis ovatis oblongis supra ferratis, caulibus striatis, pedunculis uni-
feris umbellatis Gmel. Sib. 2. p. 186. V. 30. fig. 10
Aster fibrinicus foliis lanceolatis venosis Rabris eodem ferratis, caulibus
striatis, pedunculis tomentosis L. V.
Habitat in Sibiria

varia foliis basi catheribus, floribus numerosis et basi angustioribus floribus
paucis

alpinus A. foliis subspathulatis hirtis integerrimis, caulebus simplicibus unifloris
Hort. Kew. 3. p. 190

Aster 7. austriacus Clus. hist. 2. p. 15?

✓ aster montanus caeruleus, magno flore, foliis oblongis. Bauh. Pin. 267?

✓ B. aster alpestris alpinus Bauh. pin. 267.

aster alpestris caeruleus alpinus Bauh.

V. aster hirsutus austriacus caeruleus magno flore, foliis subrotundis Bauh.
prodr. 124 Pin. 267

✓ Aster alpinus foliis spathulatis hirtis: radicalibus obtusis, caule simplicis
Smo unifloro Lin. S. V. Gaëqu. fl. austr. 1. tab. 00

Habitat in Alpibus Europae australis 4

*Senecio A. foliis filiformibus aculeato-ciliatis, calycibus hemisphaericis: foliis
equalibus. Hort Kew. 3. p. 190*

Planta Plukh. phyt. 271. fig. 4.

*affinis parvus aethiopicus, chamomeli florus, Tamarici aegyptiaci
floribus foliis tenuissimis denticulatis Plukh. alm. 567. 271. fig. 4.*

*affinis tenuifolius: foliis filiformibus aculeato-ciliatis, pedunculis
nudi, calycibus hemisphaericis equalibus Lin. L. V*

Habitat in Q. b. p. A

Taxiifolius After *Suppiniticosus* foliis decurrentibus subulatis calathiculatis ciliatis floribus
terminalibus L. Am. Ai. 6. pag 102. 69 * Berg. Pap. 206 * S. V. pag. 760.

Habitat in Cap. b. p. 5

Triticifolius ex appertus a cap. foliorum superne ramosis: rami ^{nocturne} ~~red~~ con ag-
gregati erecti. *folia* subulata, decurrentia ^{longiora} ~~approximata~~ ^{puberula} ~~patentia~~ ^{complicata} ~~et~~ ^{subtus} ~~per~~ ^{subtus} ~~cur-~~
^{cam decur} ~~supra~~ ^{reus} ~~lorisima;~~ ^{marginis} ~~reflexa;~~ ^{dentibus} ~~minutis~~ ^{ciliato} ~~foliis~~ ^{foliis} ~~fibra-~~
^{subtus tomentosa} ~~aeuita~~. Flores terminalis ^{sessilibus} ~~saeci~~ ^{pent.} ~~linifolii~~. *calice* ~~calyci-~~
^{na} ~~fusca~~, ^{pubere} ~~villosa~~, ^{setacea} ~~recurvata~~.

reflexus a fruticosis, foliis ovatis subimbricatis recurvatis serrato-ciliatis
floribus terminalibus Lin. am. ai. 6. p. 604 spec. pl. pag. 1225

Aster africanus frutescens splendens parvis et reflexis foliis

Com. hort. 2 p. 51. t. 20

Habitat in Cap. 6 spec 5