

After

Cnicus a. *fruticulosus*, foliis ovato oblongis acutis subtus tomentosis,
calycibus pilo terminatis Lin. Am. acad. b. p. n. 66. x. Spei: pl.

pag. 1225. x

Habitat ad Pap. b. Spei 5

Friticifolius a *friticosus* foliis linearibus punctatis pedunculis unifloris
nudis Lin. 1. v

Aster africanus frutescens; foliis angustis et plerumque conjunctis Comm.
hort. 2. p. 53. t. 27.

β. *Aster maritimus fruticosus*; hysopifolius confertis, flore albo Pluken.
Mant. 29. t. 340. fig. 19.

Habitat ad C. b. praesens saxositate

Divaniatus A. ramis divanatis, foliis ovatis serratis, floralibus integerrimis
obtusiusculis amplexicaulibus

Affer americanus latifolius albus, caule ad summum bracteato

Pluk. alm. 56. t. 29. fig. 1.

Habitat in Virginia

Hyssopifolius a foliis linearibus canaliculatis basi attenuatis integerrimis striatis,
ramulis corymbose fastigiatis: foliolis crebris linearibus imbricatis, calyci
bis imbricatis Hort. New R. p. 200

Affer fol *hyssopifolius*: foliis linearibus obliquatis integerrimis acutis
marginibus scabris, pedunculis subnudis Lin. Mant. 114 & S. V. p. 761

Habitat in America septentrionali 4

Tenuifolius A. foliis sublineariibus integerrimis, pedunculis foliosis Lx. Spec. pl.
nuz. 1227* S.V

Aster americanus, belvedere folio, flombus ex conules albidantibus, piciis
longi Plukh. alm. 56. 8. 8. p. 4. 5.

Habitat in America septentr. 2

acrida - foliis lanceolato-linearibus fructis integerrimis planis floribus corymbosis
sarrigatis, pedunculis foliosis Lin. l. V.

Aster minor nabonensum, Tripolii flore, lanaria folio Lob. ii. 344. Pluk alm

~~464. 27.~~

Aster Tripolii flore Bauh pin. 267.

Aster angustifolius, Tripolii flore Barrel. ic. 606

Habitat in Hungaria interjamnei, Hispania, Galloprovincia

Concolor A. foliis ovatis sessilibus integerrimis, caule simplicissimo, racemo terminali
Linn. Spec. pl. pag. 1220. Gron. Veg. 1234
Habitat in Virginia 4

rigida A foliis linearibus alternis floribus terminalibus solitariis Lin. S. V.
Habitat in Virginia &

annuus A. foliis peltatis: inferioribus subovatis serratis; superioribus lanceolatis,
calycibus hemisphaericis foliolis subaequalibus stygosis Hort. Kew. 3. p. 209

Bellus ramosa umbellifera Corn. canad. 193. t. 194.

Aster annuus foliis lanceolatis: inferioribus crenatis, caule corymbose, pedunc.
Sulis nudis, calycibus hemisphaericis Lin. Hort. Up. p. 262 & Fl. Dan. tab. 486.
Habitat in Canada nunc in America

sermus A. foliis radicalibus lanceolatis integerrimis obtusis, caule subnudo foli
formi subramoso, pedunculis nudis Gron. Voy 124 L.S.V.
Habitat in Virginia 4

indicus A. foliis ovato oblongis serratis: floralibus ovali lanceolatis integerrimis
ramulis unifloris Lin. S. V.
Habitat in China

Hesperidus A. foliis infimis oblongis crenatis scabris, caulinis lanceolatis integris ciliatis,
caule scabro Thunb. fl. jap. p. 315*
Vestf. Komph. Am. ex. fasc. 5. p. 076.

Habitat in Japonia

Radix tamosa fibrosa. Caulis erectus hirsutus, ramosus. Rami divaricati. Folia
infima obtusa. caulina et ramea obtusa sensim minor: omnia scabra. Flores
terminalis in ramis solitarii. Radix alba. Pappus ferrugineus pilosus Th.
C. C.

Scaber A. foliis oblongis serratis scabris, pedunculis paniculatis Thunb. fl. jap. p. 3167

Habitat in Japonia

Caules herbaceus, teres; striatus, erectus, pur purcus glaber, pedalis, inferne simplex superne
paniculato ramosus. Folia petiolata, acuminata glabra; supra viridia, valde
scabra ciliis albis in pagina et margine, subtus pallida, venosa, levia; patentia
Flores terminales. Pedunculi et pedicelli nudi; aphylli. Bractea sub singulo pedi-
cello lanceolata Thunb. l. c.

acuminatus ^{superior} glaber, foliis lanceolatis ^{superior} acuminatis, integerrimis glabris margine scabris
pedunculis foliosis
in America

Caulis erectus sulcatus lineis scabris, purpurascens

Folia subsessilia, approximata erecta lanceolata utrinque acuminata
venosa, ~~scabra~~ glabra, subtus pallidiora, integerrima scab marginibus
scabra, pelliciana lineis ~~scabra~~

~~Flores~~ ^{occurrentes} ~~pan~~ petiolis brevissimis lineis se basi puguli petiolis
Folia pedunculatis ^{occurrentes} ~~occurrentes~~ corim basi in summitate. Pedunculi
Culorum lineari ^{foliosis} ~~foliosis~~ pedicellisque patentibus ^{scabris} ~~scabris~~ pedicellis filiformi
bus foliosis ^{scabris} ~~scabris~~ ^{scabris} ~~scabris~~ ^{scabris} ~~scabris~~

Calyx subimbricatus foliolis lanceolatis glabris ovato breviori
bus. Flores mediores duplo minores quam in grandifloris.