

Aster

1 *piculum*  
aster qui Conyza botica Plasci

2 Villarsii

an aster albus coeruleus minor Tournef. f. v. h.

Aster albus montano purpureo si multo vel globularia Baub. hist. 2. p. 1047.

3 à son Pêcher Angles occident

an Plukin. Alm. 190 tab. 341.

aster longissimo folio et angustissimo Vaell. act. Paris 1720. p. 310

an 4usf. eadem qd mea  
caulis semper uti tota planta glabris, teris. folia pollicaria remota linearia et hetero-

Pedunculis perovnales et laterales, paucis, uniflori Calycis foliola lanceolata  
et 4us



lucidum

Anacardium

caulibus <sup>sub</sup> demissis, pedunculis scopiferis mutis, spicis <sup>oblongis</sup> ~~ovatis~~  
foliis <sup>ol</sup> ~~late~~ <sup>3-5 partitis</sup> ~~integerrimis~~ <sup>lycibus oblongis</sup> ~~subfasciculatis~~ acutis H. Kew. l. p. 16

# Anacardium lucidum; foliis minimis bipartitis acutis superne  
nitidis, spica ovata, calycibus mutis. La Mark. Musc. bot  
l. p. 77. n. 347. t. 22. fig. 3.

# Anacardium lucidum; Habitat in insulis Falklandis &

caulibus subdemissis; Caulibus brevissimis, decumbentibus, basi squamam ferrugineam vestitis.  
scopiformibus, spicis folia petiolata ~~folia~~ ad basin caulem, approximata, bipolli-  
cratis, foliis oblongis canis, cunctis decem pinnis, ~~et~~ sessilibus, externa sessilibus, ex parte  
quae integerrimis bilineari, profunda trivulsi si que partita interiori 3 partita ut fac  
acutis subfasciculatis folia foliola apparent, interna indivisa; omnia pubescentia  
ciliatis H. Kew.  
l. p. 15

Canis apiceque pilosa. Petioli pilosi basi dilatati membranacei.  
Pedunculus foliis altior, teres, villosus, folio interdum instructus.  
Spica semipollinacea. Flores inferius interdum distantes.  
Calyces pilosi. Drupe ovata subrotunda  
germen supra medium ventriculis 4or obsolete notatis, pilosum  
Drupe superne inaequaliter cornuta hort Kew. l. c

*Aster americanus*, frutescens, Stoechadis citrinae folio, flore luteo umbellato  
aureo Plum. cat. 10.

*Helenium frutescens*, agerati folio, subtus incano, floribus minimis fere  
umbellatis Vaill. in act. par. 1720. n. 27.

*Grula*, caule fruticoso, foliis lanceolatis, dentatis, subtus tomentosis,  
floribus corymbosis minutis Plum. ii 30. t. 42. f. 1.

Habitat in America meridionali. Ex herbario Vaillantii

*Eridex ramosus*. Rami teretes, superne incani. Folia petiolata, semi  
nulliana, lanceolata, utrinque acuta, remote dentata, supra glabra,  
remota oblique lineata, subtus. Corymbi terminales, supra decomposi  
ti. Pappus simplex

Magellanicus After glaberrimus foliis inferioribus spatulatis linearibus; superioribus  
linearibus amplexicaulibus, caule unifloro.

Habitat ad fratum magellanicum  
After magellanicus foliis radicalibus longe petio lato lanceolatis; cau-  
linis parvis oblongis amplexicaulibus flore unico terminali la-  
Marx Encyclopaedia

Caulis erectus herbaceus, teres, lavis, simplicis primis 3 pollicans pro-  
niferis prolonis <sup>3 vel 4 in caule</sup> folia radicalia et inferiora oblonga in petiolum semipollicarem  
procumbentes Desfontia lamina, petiolo duplo brevior, caulina linearia, am-  
plexicaulia, polliciana sensim minor. omnia glaberrima  
lavis obtusiuscula, integerrima, subavenia crassiuscula  
8 <sup>purpureis</sup> loris terminalis asperis triplici Calyx simplex foliolis linearibus  
ceolatis

folia in praecipua desf. integerrima Flor magnitudine Tripoli Calyx foliola lanceolata

folia plerumque radicalia lanceata bi- / trifida dentata, glaberrima  
ma ut tota planta crassa. Scapus erectus, prolonis procumbentes foliosi  
radici albus discus lateris reb. Aust

Dracunculoides After foliis lanceolato linearibus integerrimis margine retrosum scabris  
triner vis, pedunculis ~~sub~~ foliosis  
habitat. 4

Rami simplicibus <sup>herbaceis</sup> <sup>ramis</sup> <sup>tenis</sup>, <sup>erectis</sup>, striatis <sup>puberulis</sup> <sup>scabris</sup> <sup>fulvis</sup> <sup>glabra</sup>  
<sup>ramis simplicibus</sup> <sup>ramis</sup> <sup>tenis</sup>, <sup>erectis</sup>, striatis <sup>puberulis</sup> <sup>scabris</sup> <sup>fulvis</sup> <sup>glabra</sup>  
folia approximata sessilia, lanceolato linearia, <sup>retrosum</sup> <sup>scabra</sup>, <sup>puberula</sup>, <sup>triner</sup> <sup>vis</sup>  
maxime <sup>marginis</sup> <sup>retrosum</sup> <sup>scabri</sup>, <sup>pollicaria</sup>  
flores <sup>conyso</sup> <sup>boji</sup>

Pedunculi pedicellisque foliolo uno alterove.  
Calyces ovati <sup>arcti</sup> imbricati, foliolis extremis ovatis interioribus oblongis flavescens  
dorso linea viridi longitudine tubi flosculorum radii

an hysopifolia Lin. ? vel

nomine antea confusa cum amelloide, mihi videtur differre figura foliorum, glabritie  
ramis simplicibus <sup>ramis</sup> <sup>tenis</sup>, <sup>erectis</sup>, striatis <sup>puberulis</sup> <sup>scabris</sup> <sup>fulvis</sup> <sup>glabra</sup>  
quomodo vero a hysopifolia distinguitur nescio, cum mihi <sup>habita</sup> <sup>ad</sup> <sup>sa</sup> <sup>dracunculoidem</sup> <sup>alludens</sup> <sup>foliis</sup> <sup>draca</sup> <sup>vera</sup> <sup>flora</sup>, <sup>peduncu</sup>  
homo Upsalicensi a Lin: <sup>habita</sup> <sup>ad</sup> <sup>sa</sup> <sup>dracunculoidem</sup> <sup>alludens</sup> <sup>foliis</sup> <sup>draca</sup> <sup>vera</sup> <sup>flora</sup>, <sup>peduncu</sup>

an hysopifolia Lin

crinitus After *Androsace*, folus ovato-oblongis acutis subtus tomentosis, calycibus pilosis  
menstr. d. Am. Ai: 6. pag. n. 66 \* Spec. pl. p. 1225 \*

Habitat in Cap. b. p. i. t.

Rami minus ramosi, pubescentes. Folcia sessilia margine scabra, subtus albo-tomen-  
tosa. Pedunculi terminales, foliosi, uni flori. Calycis squama in pilum fu-  
sum desinens. Floris radius isuleus l. sp. l. c.

Unifloratus - After foliis radicalibus subcuneiformibus apice incis, Caule unifloro, Stolombis proceum-  
bentibus.

Habitat ad fretum magallanicum

Planta digitalis, caulis glaberrimus stoliferus. Caulis erectus simplicissimus inferne foliosus  
rad. <sup>caulis</sup>  
Folia petiolata, laciniis linearibus obtusis, caulinis aliquot integris amplexicaulibus  
Oler terminali unico calyce imbricato: squamis linearibus lanceolatis.



~~Holoniferio Senecio foliis apice trifidis, capite unifloro, stolonibus prostratis~~

rosmanifolius Aster, foliis radicalibus oblongis petiolatis, <sup>caulis</sup> caulibus filiformibus, caule  
simplicissimo ~~unifloro~~

rosmanifolius Boic. 60 fig. 4.

Aster Amazonensis foliis radicalibus spatulatis, integerrimis, caulibus lineari-  
flora Anag. <sup>836</sup> tab. 8. fig. \*

Habitat in Amazonia 2

Caulis plures erecti, <sup>periclyti</sup> tenuis, glabri, striati simplicissimi, pedic. solum radi-  
calibus petiolata oblonga integerrima glabra, lora. Caulibus angustis lineari-  
flora ~~integerrima margini reflexo, unguibus linearibus~~ <sup>conspicua</sup> polli-  
cari. Flo. unius caulem interdum terminat saepe plures. Calycis orati  
imbriati. Corolla lanceolata obtusiuscula. Pediculi subquamof.

nervosus Aster glaberrimus foliis <sup>integerrimis</sup> ~~radicalibus~~ <sup>superioribus</sup> oblongis nervosis, caulibus spatulatis,  
ramis subpifloris, pedunculis ~~foliis~~ <sup>subfoliis</sup> villosis  
habitat in monte video Brasilia

Rami teres glaberrimi foliosi, apice endentes

Folia <sup>inferiora</sup> radicalia oblonga basi in petiolum attenuata, obtusa  
<sup>hypoleucana</sup> nervosa superiora spatulata <sup>retentia</sup> amplexicaulia acuta pinnata; omnia  
integerrima, glabra. Foliola pedunculata linearia obtusa  
3. 4 in singulo pedunculo

Petioli brevis firmus basi dilatatus, amplexicaulis

Pedunculi bini ad apices; ramorum villosi 1-3 pollicares

Flor Tripolii major

Calyx imbricatus foliolis linearibus villosis subtili versus marginem  
villosis, obtusiusculis

Pappus ferrugineus

radula A. foliis lanceolatis serratis acuminatis rugosis scaberrimis, calycibus imbricatis.  
foliis lanceolatis obtusis Hort. Kew. 3. p. 210  
Habitat in N. Scotia 4

Spectabilis A. foliis lanceolatis scabriusculis. inferioribus serratis ramis corymbose,  
foliis calycinis latis foliaceis subcuneiformibus acutiusculis squarrosis Hort.

Vier. 3. p. 209

Habitat in America septentrionali

Caulis bipedalis. Radix conoleus

paniculatus A. foliis glabris acutis serratis petiolatis: radicalibus cordatis; caulinis  
ovatis: supremis lanceolatis integris, ramis paniculatis, calycibus latis subim-  
bricatis, caule glabro Hort. kew 3. p. 207

Habitat in America septentrionali 7

*Corymbosus foliis cordatis glabris acuminatis omnibus argute serratis petiolatis*  
*petiolis simplicibus; ramis fastigiatis. caule glabro Hort. Kew. 3. p. 207*

Habitat in Amer. septentr. 4

variat caule purpureo et viridi

pendulus A. foliis ellipticis lanceolatis serratis glabris: ramulorum remotiusculis, ramis divaricatis  
patissimis pendulis, caule pubescente Hort. Kew. 3. p. 204.  
Habitat in Amer. sept. 4  
Radix alba; discus luteus; tandem ferrugineus



*Daffodus A.* foliis elliptico lanceolatis serratis glabris proportionatis, ramis patentibus  
calycibus imbricatis caule pubescente hort-hen 3. p 205

Habitat in Am. septentr.

Radix alba. vana caule tomentoso, ramis patentissimis, disco rubro et caule  
pubescente, ramis virgatis, disco stramineo

Divergens A. foliis ellipticis lanceolatis serratis glabris: caulibus lineari lanceolatis  
elongatis, ramis patentibus, calycibus imbricatis, caule pubescente Hort. kew 3.  
p. 205

Habitat in Am. septentr. 7

Caulis quinquepedalis et ultra debilis. Calyx cylindricus, foliola numerosa  
acuta. Radix alba. Calyx brevior. D. Ficus rubens H. kew t. c

umbellatus a. foliis lanceolatis basi attenuatis integerrimis margine scabris, ramis  
corymbosis fastigiatis Hort. Kew. 3. p. 199

affert umbellatus Mill. Dict

Habitat in nova scotia ?

Caulis festucalis, strigosus, glaber, superne tantum ramosus. Radius albus

Aster canadensis Canadensis altissimus albus foliis pinnatis copio  
Vall. in act. parisi.  
habes ex nordmanni.

ab Ast. amygdalens La Martini forte nondum descriptus

multiflorus A. foliis linearibus integerrimis glabrescentibus, ramulis secundis, calycibus  
imbricatis squarrosis: foliis subfoliaceis acutis, caule pubescente Hort. Kew 5  
p. 203.

Aster ericoides dumosus Dill. Elth. 40. t. 36. fig. 40

Habitat in Am. sept. 4

varia ramulis submultifloris et ramulis unifloris.

*Juncus A. foliis lanceolato lineariibus sessilibus glabris: inferius pubescentibus;*  
*ramulorum lanceolatis, ramis virgatis, calycibus imbricatis, caule glabri*  
*sculo Hort. kew. 3. p 204*

*Habitat in Am. sept. 4*

*Caulis quadripedalis. Calycis foliola acuta, apice subrotunda. Radius cavitatis*  
*incarnatus; discus elevatus, pallide flavus*

*Salsola* A. foliis lanceolatis, lineariibus integerrimis glabris: ramulorum paten-  
tissimis, calycibus imbricatis: foliolois acutis, caule pubescente Hort. Kew 3. p. 202  
Aster eriooides, meliloti agraria umbone Will. Elth. 39. T. 35. f. 39.  
Habitat in America: sept. 7

*Salixifolius* A. foliis linear lanceolatis integerrimis glabris, calycibus imbricatis  
4is latius, caule Levi Hort. Kew. 3. p. 203.

Habitat in am. sept. 4

Caulis humano altitudinis. Calycis foliola acuta, apice patula. Corolla  
rotunda e coruleo incarnatus

officinis A. foliis lanceolatis subamplexicaulis integerrimis glabris margine  
scabris, calycibus laxis: sepalis equalibus. Hort. kew. 3. p. 203  
Habitat in Am. sept. 3  
caulis bipedalis hirsutus. Radix concolor



nemorali A. foliis linear-lanceolatis basi attenuatis pabruisculis, ramis feli formi-  
bus unifloris, calycibus laxis imbricatis: folioli acutis Hort. kew. 3. p. 198  
Habitat in nova Scotia &

Caulis pedalis. Radix conchus; d. f. r. albus

paludifera A. foliis linearibus amplexicaulibus erectis integerrimis glaberrimis  
marginibus scabris, pedunculis per nudis, calycibus squarrosis Hort. Kew. 13.

P. 201.

Habitat in paludifera Carolina &

Botia 3 vel quadriuncialis, lineas duas vel tres lata, remota. Pedunculi  
nudi proter foliolo, plerumque duo sub calyce. Radius concavi magnus.  
Asper-luteus.

*Cymbalaria* A. fruticosus, foliis ovatis sinuatis hertis, calycibus imbricatis  
hertis Hort. Kew. 3. p. 197.  
Habitat in C. b. p. 5

patens A. foliis oblongis integris acutis cordatis subamplexicaulis lobatis,  
ramis patulis elongatis paucifloris, calycibus imbricatis subquarropis,  
caule hirsuto Hort. kew. 3. p. 207.

Habitat in Virginia 4

Caulis tripedalis. Rami remoti, divaricati pubescentes. Folia basi obli-  
que flexa: suprema minuta subimbricata. Floris radius dilute  
concoloris; discus flavus

1 synonyma Silleni ad afferendi hanc omnia vera, aff. mis. tantummodo Dubia  
pauciter gemelini: flora Sibirica

Hessmanni hortus Lugd.

Plummeti in aeri mita dubia videtur, et in vno daleatur ut pote alia  
planta est

Affer amellus allioni flora Piedemont no 702 tab. fig  
figura mala folia in serratis remotis pinguentur

amenui After

rapidus La Mantre herb. la Mante



Setifolius. Aster foliis integerrimis inferioribus linearibus, superioribus filifolii  
Caule paniculato floribus terminalibus, calycibus mult  
ex horto de Alphonse

Caulis altus teres striatus, lavis, glaber, ramis <sup>superne</sup> simplicibus Rami  
superne <sup>superne</sup> virgatis aetate caulis

Folia infremota, glaberrima basi inferiora linearia  
hypoglauca, ramorum setacea pollicaria

Floris <sup>Paniculati</sup> paniculato <sup>oymbo</sup> cymbo. Pedunculis <sup>es</sup> simplicibus  
fo filiformes <sup>sub flore craspedis</sup> pubescentes, foliis minutis remotis  
vestitis

Calyx puberulatus foliis linearibus acutis glabris disco  
brevioribus

Corolla fere magnitudine triplicis Radius purpureus Corollula  
disci radii disci pauciores disci

~~Summus differt Corollula <sup>disci</sup> paucioribus quam in Summo  
an mel. tab. 79. Tom. 2. differt etiam <sup>foliis</sup> latioribus, radio al  
affinis summo an mel. Tom. tab. 79. <sup>bo. H. v. Pl. h. n. p. m. d. v. r. s. a. m. a. l. l. e.</sup> limites difficles nonnum <sup>partis</sup> habitis~~