

Astrandia

1. major A. foliis quinquelobis: lobis subtrifidis, pedunculis umbello simplicibus ternis (umbella composita)
2. carnolica A. foliis quinquelobis, pedunculis umbello quaternis, partibus ternis. (umbella ~~composita~~ decomposita)
3. minor A. foliis digitatis lineariibus serratis
4. epipactis A. foliis radicalibus quinque partitis obtusis serratis, siapocundo umbello simplici involucri lanceatis serratis
5. ciliaris A. foliis lanceolatis serratis ciliatis.

heterophylla *Asfrantia*. foliis caulinis integris ovatis; aristato-serratis
sessilibus, involucri ciliato-serratis.
Willden. Enc.

Habitat. Sibiria

Caulis indivisus erectus pedalis sulcatus glaber.
Folia radicalia non vidi; ovata acuminata
basi subcordata sessilia, alterna opposita vel
terna, margine dentata, dentibus apice aristatis.
Umbella terminalis solitaria longe pedunculata,
bina vel tres aliae pedunculatae in foliorum axillis.
Involucrium polyphyllum umbella longius, foliolis
ellipticis utrinque acutis, apicem versus ciliato-denta-
tis, quinque-nerviis reticulatis albis. Semina ut
in *Asfrantia* majori est longiora.

Ciliani A. Prantii

Habitat in Cap. b. spec. herb. Rusf.

Caulis angulatus glaber. Folia semiamplexicaulia vix semipolluciana, remotissima, lanice-
lata, serrata: serraturis juncturae terminalis floralis opposita pedunculi bi bifidi cum
pedicello in duas sum. Involucrum ovata, acuta, arenaria, enervis, semiconquivalens.

^{filices}
^{leoni} *Astrantia foliis lanceolatis serratis ciliatis* L. in Suppl. p. 177. * S. V. p. 272.

Japone Capensis Berg. Act. Upp. vol. 3. p. 187. t. 10.

Habitat ad Cap. bono spei & ad B. Weymanni

Caulis simplex, pedalis, junceus, erectus, substriatus, apice divisus in paucos ramos floriferos. Folia lanceolata, equaliter serrata: serratione setaceis sive ciliata, tercia. Radix l. petiolata: caulinea 4-6. Foliis, semi amplexicaulia. Umbella elongata subradiata. Umbellula multa radiata brevissima. Involucrum distriphyllum, foliis simile, sed minus. Involucella subdistriphylla, l. lanceolata, acuta, flosculis duplo longiora, colorata L. l. c.

folia caulinea sessilia, remota, alterna, unguiculata, lanceolata

major A foliis quinquelobis: lobis trifidis Lin. h. V
Veratrum nigrum Dod. pempt 307

Helleborus niger, Sanicula folio Bauh. pin. 106.

Habitus in alpebus Helvetia, Aetna, Bohemia, Pyrenaeis &

Caulis sesquipedalis erectus striatus glaber simplicis fimus
Folia petiolata 5 fida lobis lanceolatis extusque dilata
ta intermedia trifido fere inaequaliter serratis serratur
seta terminatis radicalium petiolis longitudine dimidii
caulis. Pedunculi ad apicem ⁴ⁿⁱ terni in culta duo inferiora
folia ad basi pedunculorum lanceolata serrata. Invo
lucra colorata basi attenuata apice utroque serratur
setacea.

pedunculis umbello simplicibus

carneolica a foliis quinque lobis

Fr. qu. fl. castr. v. s. app. 10. alba

Astragalus foliolosus Scop: fl. Carn. p. 40 n. 305. Tab. 7

Habitat

Caules pedalis erectus simplex striatus. Folia caulina
2. 3- 5 pedita inferiora lobis incisio profunde serratis superiora

indivisa serratis fibratis peditis terminatis. omnia
pallide viridia. pedunculi laterales et terminales quate

rad. uni ^{residui} quaterni laterales ramosi pedicelli gemini vel terni
folia 3 ad basin universalium parva lanceolata duo
minora ad partia lra. umbello triplo minore quam in

a. majori cui ~~form~~ omnino similis semina hinc glabra
planis scula illeni convexa muricata

umbello ternis
pedunculis post umbello univesalis

minor A

^{Soleolis linearibus}
foliis digitatis serratis Lin. l. V.

Hellebomus, panicula folio, minor Bauh. pin. prod. 97. pin. 186

Hellebomus minimus alpinus; Atractio flore Boerh. pi. 10. t. 6.

Habitat in alpebus Helvetia, Aetruina, Pyrenaeis &

caulis erectus palmatis et ultra filiformis simplex ^{petiolata} folia plerumque

ramae radicalia caulina ^{solida et angusta indurata} 1. 2. Pedunculi in apice ^{per pedicellum} terni latera

ter desuper apicem foliis duobus oppositi. folium oppositum

3fidum ad basin pedicellorum. involuella polyphylla lan-
ceolata mucronata colorata

Impatiens A. foliis quinque partitis obtusis serratis Lin. Suppl. p. 177 & f. v. 273

~~Impatiens~~ ^{fol. 8. auct. ss. app. t. 11.}

Elleborine alpina, Saniucula et Ellebori nigri Jacq. Lobel. Ic. p. 664.
Helleborine Saniucula Jacq. Bauh. pin. 180.

Astrantia Impatiens Scop. fl. Carn. 303. t. 6.

Habitat circa Bonam

Poleium radice alba ^{fimbrata} petiolatus ^{et unum} glabrum ^{capitulum simplicissimum}
et infido: lateralibus ^{subtus} purpurascens. ^{caulis} glaber ^{terminatus} involu- ^{dam tripa}
bris bifidis: omni ^{cro} penta vel hexaphyllo: foliis ^{lesplibus} subtuncifor-
mibus obtusis serratis ^{mibus} superne serratis ^{flores} luteis