

# Athamanta

1. Libanotis A. foliis bipinnatis planis umbella hemisphaerica, seminibus hirsutis
2. pyrenaica A. foliis bipinnatis, seminibus glabris
3. cervaria A. foliis radicalibus bipinnatis caulinis pinnatis ovato lanceolatis  
anguste serratis, in summo extensorum angulatis
4. sibrica A. foliis pinnatis inciso-angulatis
5. condensata A. foliis subbipinnatis: folioli deorsum imbricati, umbella centifora
6. flexuosa <sup>in</sup> foliis <sup>in</sup> pinnatis folioli inciso subpinnatifidis caule flexuoso umbella  
lateralibus terminalibusque.
7. oreopileum A. foliis tripinnatis folioli divaricati
8. sicula A. incana, foliis inferioribus natis pinnis oblongis pinnatione incisiva
9. cretensis A. villosa pinnis linearibus hirsutis trifidis acutis
10. annua A. foliis multipartitis: laciniis setaceis
11. chenevillae A. seminibus membranaceo serratis, foliis supra decompositis lobis  
multifidis

*Athamanta*

Habitat in insula francie Comnes. herb. fus.

Rami teretes, striati. Folia bipinnata: foliola appendiculata; pennula lineares  
breves, incisae acutae. Petioli laxi, crassi. Umbellae laterales. Involucrum foliola  
sema, lanceolata, acuminata, margine membranacea. Radix umbellae glabra.



*enthamifolia* Cithamanta

*Opium gracile saxatile enthamifolia* Tournef. Cor.

Habitat in Oriente herb. Guss.

Caulis crispis pennis cymis, glaber, striatus. Folia bipinnata: pennis lanceo-  
crispis, vix pollicaris, acuta. Petioli pollicares, rugenantes, striato, supra  
vernati. Pedunculi villosi, angulati. Involucrum et involuella polyphylla  
subulata: involuella longitudine radiorum parthaliis. Semina striata, villosa  
subanescentia.

*Althamanta*

*Schondyleum orientale humiliter foliis obpathii Tournef. Cor.*

<sup>et obtusis in oreis et herb. Mus.</sup>

Tota villosa, iniana. Caulis filicidus angulatus. Folia tripinnata: pinna par-  
va, semiangulata, bifida, laciniis linearibus. Involucrum polyphyllum  
brevissimum: radice angulata. Involucella valde villosa, radice breviora  
Semina villosissima

Chinensis Athamanta seminebus mem branceo striatis; foliis supra decompositis lob  
multifidis Lin. Spec. pl. p. 353. \* S. V. 280

Semina e Virginia missa: herb. Guss

Caulis angulatus, teris; erectus parum flexuosus. Folia Chorophylli teria. U  
bella minus expansa alba. Semina singula s' alis longitudinalibus pe  
Involucrum duplex. Statura Seleni Monnierii  
Tota glabra. Semina striata, oblonga, glabra herb. Guss

michi nota



Cretensis A folioli lineantibus p. lani hispidis, petalis bipartitis, seminibus oblongis  
hispidis Lin. S. V. pag. 279 & Gaertn. fl. austr. 1. 4. 62.

*Daucus creticus* Lam. epit. 536.

*Daucus foliis foeniculi* Venus. semis Bauh. pin. 150

*Daucus alpinus*, multifido Longoque folio Bauh. pin. 150

*Daucus creticus* semine hispido Bauh. hist. 3. p. 56.

Habitat in Helvetia.

Caulis palmatis et ultra villosa minus incana. fol. pinnis  
lineari trifida. involuicelli involuicis que margine  
membranaceis. semina incana  
culto glaberrima evadit pinnulesque succulentis

villosa pinnis lineantibus acutis trifidis

B Athamantae rep. tui Scop. fl. Carn. no 315 tab 9

Daucoides A. foliis pennatis: pinnis pennatifidis: laciniis trifidis  
umbellis densifloris Scop. fl. Carn. no 317.  
Lebanotis pennalis circa Costam decussatis pag. 456 Hall.  
enem. p. 456 no 1.  
Habitat in alpebus

non vidi



Matthioli *A. folius supra decompositi diffusi: folioli elongato subfeta  
cis, seminibus acutis hirsutis Wulf. <sup>st.</sup> Gaigu. Coll. 1. pag. 211.*

non vid.



annua A foliis multipartitis: laciniis linearibus teretibus acuminatis  
Lin. p. v

Myrrhis tenuifolia annua Cretica, semine tanugine alba pubescente  
Monf-hist. 13. p. 302.

Myrrhis annua cretica, semine ~~lan~~ strato villosa, incana Monf.  
umb 67.

Habitat in Creta 2

Caulis pedalis erectus glaber stratus. Folia quadripartita  
laciniis pennulorum diversicatis. Semina oblonga  
hista incana.

### ptaceis

Folia quadripartita: foliola ptacea seminaugunculoni. Caulis villosus  
stratus. Umbello radii incani hab. hist.

Seseli Turbith forte est

incana *Althamanta* tota pubescenti incana foliis supra et omnino  
foliis cuneiformibus quadridentatis umbella multica  
diata globosa Willden. Spec. pl. pag 1402.  
Habitat in Sibiria

non vidi



pyrenaica A. foliis bipinnatis, seminibus glabris  
Athamanta libanotis Jacquin illust. pag. 12.

Habita in Pyrenaeis

Caulis bipedalis angulatus, sulcatus subvellosus vel glaber. Folia  
inferiora tripinnata pinnis pinnatifidis laciniis linearibus  
lanicollatis mucronatis semina glabra oblonga striata.

Athamanta pyrenaica Jacquin h. Vind. 2. t. 197





Cervaria A. foliis pinnatis decussatis inciso angulatis seminibus nudis  
Linn. V

Dauci Vestrum genus Truct. hist. 233.

Daucus montanus, apii folio, major Bauh. pin. 150

13. Selenum foliis simpliciter pinnatis inciso angulatis <sup>Herb. Ups. 604</sup> <sup>montibus</sup>

Habitat in Helvetia, austriâ alfatia, Gallo provinciâ, ~~libi~~

<sup>4</sup>  
~~Selenum~~ Caulis pedalis ~~bipedalis~~ erectus teres ~~et~~ manifeste striatus  
simplex primus. Folia petiolis inferne membranaceis.  
descriptio Foliola 7-9. cuneiformia angulata inciso lobata venosa  
impari tripartita. Umbella convexa <sup>Herb. Ups.</sup>  
hoc forte sibirica Lin. ab Europa diversa, praesimilioria  
Lenno in sole foliosa non prorsus involuella foliola umbra  
culis longioribus.  
~~syn. Lobe. Truct. et Bauh. ad Europam pertinet~~

Caulis erectus bipedalis vel ultra tota glabra purpurea  
terribi striatus folia radicalia bipinnata folioli pinnis  
que oppositi. pinnis oppositi ovato lanceolata serrata  
inferne extrosum angulata, glabro venosa subtus

4 acq. syn. ad aliam plant. spectat. Flavia





Sibirica a foliis pennatis incisa angulatis Lin. Mant. 56. 753. N. p. 279  
 A foliis up. 60 + sub seleno  
 pl. perz. 3514 Gmel. fib. 1. Tab 40. fig. 1. 2. Gmel. fib. Tab. 40. fig. 2

Habitat in Sibiria.

~~Polygonum~~ foliis simpliciter pennatis inc  
 Caulis sive bracteatus pubescens glaber ramulosus. Foliola  
 opposita radicalia pennatim incisa glabra 6. 7. parum  
 acuta sessilia infra lacina bases dentibus utrinque  
 binis magnis remotis, venosa terminali tripartita  
 umbella converta.

~~—~~ pennatis foliis pennatis. Foliis lacina incisa

et hanc a ceruana  
 vel europaeam in speciem ed. scienda conjungitur cum  
 habina a hinc non minus quod ~~ath.~~ ceruana  
 Cironia ~~specimen herbaceum~~ <sup>athorp. ceruana</sup> an. a laeque hanc d. versum ~~specimen~~  
 cum Ath. sibiriam ~~specimen~~ <sup>specimen</sup> cum illa conjunxerat  
 sed (spec. pl.) et demum in Mantissa distincta, nec nomen forte ceruana  
 in primine deleri oblitus fuerit.

condensata a foliis subpinnatis: folioli deorsum imbricati umbella canticiformi.  
Linn. Spec. pl. pag. 3517 Gmel. bot. tab. 40. fig. 12

Habitat in Sibiriâ &

Caulis simplex pedalis inferne angulatus, superne sulcatus. Rami  
duo vel tres floriferi ex summis alii foliorum. Foliola alternatim  
pinnatifida lobo infimo majore, unde quasi emarginata evadunt  
oppositiores ad basin et inferior laciniâ se extendit supra folium  
inferius subtus nitida. Umbella densissima convexa. Anvolutum  
innum universale saepe deest. Particulae longitudine umbellae  
germina villosa hinc



flexuosa A. foliis tripinnatis pinnis in se subpinnatis, caule flexuoso  
umbellis lateralibus terminalibusque

Habitat in Schumaker

Caulis erectus teres glaber subtilis pinnatifidus, ramulosus. Ramuli  
et aules flexuosi ramulosi. folia pedalia <sup>glabra</sup> foliola remota  
Pedunculi axillares remoti frequentes, saepe elongati

*Oreopelenum* a foliolis denticatis Linn. f. V. Jacquin. fl. austr. 1. Tab 60.

*Oreopelenum* Clus. hist. 2. p. 195.

*Asium montanum* regium Bauh. pin. 153. Segu. ver. 2. p. 31.

*Asium montanum*, folio ampliore Bauh. pin. 153.

Habitat in Germanis Anglia, Gallia colibus apricis &  
Caulis bipedalis fructus glaber. Folia radicalia tripinnata  
pinnis oppositis pinnatim incisio glabris mucronatis.  
Sagena foliorum lato. Semina alata

— Tripinnatis foliolis denticatis

*Athamant* Galata Jacquin. pl. alp. Tab 5  
notus Seleni speciei



scabula a foliis inferioribus nitidis, umbellis primordiales subsessilibus, semi-  
nibus pelosi Lam. Spec. pl. pag. 352. & Gouan. illust. pag. 124  
Daucus secundus scabulus, Sophoc. folio Lam. hist. 80.

Habitat in Sicilia 4

similis a. cretensi ~~et minus incana~~ sextuplo major caulis cubito-  
lis pubescent. folia inferiora nitida, superiora subvellosa

Plantam in Barbana legi huius simillimam uti et cretensi  
robustior vero tota villosa incana caule flexuoso pedali  
umbellis densis. folia pinnis oblongis pennatis incis  
sere symphoricarpha

incana pinnis ~~ovatis~~ oblongis pennatis incis

~~muta cypta~~