

# Atragene

1. japonica A. <sup>erecta</sup> foliis oppositis Vernatis: foliolis ovatis incisii
2. alpina A. scandens, foliis <sup>oppositis</sup> Vernatis ovato-lanceolatis serratis incisii
3. capensis A. erecta, foliis alternis Vernatis - supra decompositis: foliolis cuneatis inciso-dentatis
4. venusifolia A. erecta, foliis Vernatis - supra decompositis: foliolis linearifoliformibus
5. zeylanica A. scandens foliis cuneis diphyllis: foliolis ovatis

2 alpina a foliis duplicato ternatis serratis, petalis exterioribus quaternis  
Spreng. pl. 764, Haenke. pl. austr. 3. 4. 241.

Clematis foliis compositis et decompositis foliolis ternatis serratis  
Müll. ic. 4. 204.

Clematis cruciata alpina Bon. bald. 335

Clematis alpina geraniifolia Baub. prod. 135. pa. 30 Plukh  
alm. 109. 4. 84. fig. 7.

Habitat in Baldi austro, Sibiro alpebus

Raulis scandens vixi glaber corti rami oppositi striati  
gemmae geminae ex axillis. Folia petiolata opposita

Foliola <sup>peripolluciana</sup> ovato-lanceolata attenuata in apice serrata

Pedunculi striati angulati tripollucari <sup>exteriora</sup> superne pube  
scenti. Petala lanceolata extus villosa

— scandens foliis ~~ternatis~~

3 capensis A foliis ternatis: folioli incisè dentati, petalis exterioribus qui

nis Lin. Spec. pl. pag 764 Mant 406. Berg. cap. 140

Pulsatilla alba foliis rigido, flore magno Heron. afr. 10.

Pulsatilla foliis trifidis dentatis, flore in carnato pleno

Burm. afr. 14 P. tab. 10.

Habitat in Cap. b. Spec. 21

Radix in Cap. b. Spec. 21  
nimum Semum in caule inferne Caulis basi subramosus  
trifida

Radix radicalis petiolata. Foliole cuneata dentata in

intermedia  
intermedia  
ternum biterna  
tum  
cisa glabra arena dentata incisè basi et subtus petalis ali  
quos petioli villosi basi dilatati subramosissimi  
nisi erectus pedalis villosi superne involucrium  
e stipulis geminis oblongis ventricosis villosi foliaceis  
pedunculati nudi. Tomentosi rari. Petala creberr  
no. 6 in fenora latera subtus villosa pubescentia prope  
rapiencia facies anemones

erecta foliis alternis ternatis supra dei compositis: folioli  
cuneatis incisè dentatis

4 tenuifolia A.

erecta

Folius duplicato-pinnatis: pinnulis linearibus integris hinc.

Suppl. pag. 270

L.V. pag. 511.

Habitat in Cap. b. p. p. p.

Caulis basi ramosus vaginis retrocolorum tectus pilis copiosis albi-  
si subtomentosis. Folii pinnato angustisima rigida  
pinnuli oppositi tripartiti <sup>interdum pinnati</sup> acuti omnia ad basim  
erecta foliis ternatis ~~superdici oportet~~, foliolo linearis deli-  
foliis

caulis superiore duo linearia pollicaria opposita. pedun-  
culus valde pilosus, uniflorus, petala lanceolata  
inter valle piloso tomentosa

~~erecta foliis pinnatis pinnulis trifidis linearibus~~

non vidi

polygama A. foliis caulibus ternatis, simplicibus,  
floribus ~~dic~~ <sup>dic</sup> Gaique hist. pt. am. pg.

non ~~est~~ <sup>est</sup>

tenuifolia A. erecta, foliis ternatis supra & compressis: folioli linearifolia  
formibus

Atrypae tenuifolia foliis duplicato pennatis & pennulis linearibus  
integris non ruptis pag. 270

Habitata Cay. b. spec.

non vidi

5 Zeylanica a Cartho diphyllis fl. zeyl. 226 + S.V.

Oleumatis zeylanica, floribus obsoletis parvis Herm. zeyl. 35.

Habitat in zeylona

Paulis stratus subangulatus rami oppositi. Folia petiolata  
bicolora opposita <sup>late</sup> ovata septemnerua, acuminata subtus tenui  
pime villosa, supra glabra superne serrata <sup>zinnata</sup> in  
nolluciana, petiolata petioli villosi cinerei. Petioli  
communis in Carthum depono

zeylanica scandens foliis indivisi conjugatis