

Atrophaxis

1. spinosa A. ramis spiniferentibus.
2. inermis A. inermis, foliis undulatis.

1 Spinosa Cetraraphæxi ramis spiniferentibus Lin. S. V. pag. 345

Asimplex orientalis frutex aculeatus flor. pulchro Tournef. cor. 38. Burb.  
cent. 1. p. 19. t. 30. Dill. Elth. 47. t. 40. fig. 47.

Habitat in Media ad urbem Hansem locis glareosis juxta fluvios &  
Tendiculus cortice cinereo ramis teretibus. Ramuli simpliciter, foliosi et flori-  
feri in spinam rigidam desinentes. Folia petiolata alterna, ovata vel oblon-  
ga, rigida, obtusiuscula, <sup>plena</sup> six femiunguiculata. Stipulae utraque petiolo  
adnatae minutæ hyalino. Petioli capillares folio dimidio breviores. Racemi  
li axillares tri vel quadriflori foliis longiores, pedunculis communibus spinis  
hyalinis imbricatis. Pedicelli capillares laxi. Calyx diphyllus lanceolatus. Peta-  
la duo subrotunda. Stamina 6. Stigmata duo. Semen compressum subrotundum  
membranaceum

an diversa a Polygono fruticoso vel ejusdem generi



2 inermis *Atrophatis inermis foliis undulatis* Lin. S. V. pag. S. V. pag 345\*

*Cibipula africana repens, foliis ad latera crispis, ad polygonum retata* Dill. H. Elin.

36. t. 32. fig. 36.

*Polygonum undulatum* Berg. Cap. 135.

Habitat in Cap. bono spici. <sup>erectus</sup>

<sup>inulis</sup> Erigitur erectus ramosus cortice.

Rami parsi erecti, <sup>squamosi</sup> ~~et~~ a bracteis hyalensis lanicea  
tis post capem foliorum persistitibus. Folia obovata, vel oblonga, basi attenuata  
in spontanea bi. s. trilineraria, glabra arena, undulata acuta.

Floris ex axillis supremis confecti in speciem. <sup>et</sup> longitudine fere foliorum  
Calyx quadripartitus, equalis laciniis lanceolatis, concavis. Petala 0.  
Stamina 6 lanceolata. Stylus bifidus. Semen subrotundum