

Averrhoa

1. bilimbi A. foliis pinnatis: folioli ovato-lanceolatis acuminatis subtus
puberulosis floribus racemosis
2. carambola A. foliis pinnatis: folioli ovatis glabris, paniculis axillaribus

bilimbi *Averrhoa coccinea* ~~nudo fructificante~~ ^{nervatis} foliis pinnatis foliolis ovato lanceo-
latis acuminatis ^{pub} subtus villosis

Bilimbi Rheed. malab. 3. p. 55. t. 49. 46.

Bilimbium teres Rumph. Amb. 1. p. 110. t. 36.

Averrhoa bilimbi caudice nudo fructificante, pomis oblongis ob-
tusangulis Flor. Zeyl. 177* f. v. p.

Habitat in India

Arbor foliis pinnatis 14-23. parium pedalia et ultra. Siliola opposita
brevisime petiolata ~~inferna~~ ^{ima} breviora superiora bipolliciana inte-
gemina avenia supra glabra subtus pallidiora, venis villosis
Petiolus villosus. Flores racemosi Pedunculi pubescentes. pedicelli
filiiformes semurquiculares alterni solitarii vel gemini Calyx
glaber foliolis lanceolatis, corolla pedicello longior.

2 carambola *Awenhoa* foliis pennatis foliolis ovatis ^{oblongis} glabris paniculis axilla-
ribus

Mata Goensia, fructu octangulati pomi vulgari magnitudine
Bauh. Pin. 433.

Tamara Tonga f. Carambolat Rheid. Mal. 3. p. 51. t. 43. 44.

Pneum. pellatum Rumph. Amb. 1. p. 115. t. 35

Awenhoa carambola axillis foliorum fructificantibus; pomis ob-
longis acutangulis ten *Fl. Leyl.* 170* *S. V.* pag 427.

Habitat in India

Arbor ramis verticibus glabris purpurascens. ^{fructuosa} folia alterna
petiolata pennata ⁴⁻⁵ jugis cum impari; foliola opposita
breve petiolata ^{semitis} extrosum ^{semitis} majora pollicaria, acuminata
integerrima avenia, subtus glauca utraque glaberrima
Peduncululi axillares solitarii rarius gemini sesquipollicia
res ramofi glabri, pedicelli breves filiformes medio bracteola
minuta. Flores parvi glabri