

Atyris

Atyris dida fus. h. V. Ceratodes orientalis, fruticosa Elsaagni folio Tournef.

Ceratoides Athyris <sup>Athyris</sup> foliis lanceolatis tomentosis, floribus femineis cava  
to Len. l. V. pag 846

Athyris vartheis papposa; foliis alternis, crassiusculis linear-

cuneatis obtusis Vorsk. Dejv. pag 48. no 66

Athyris fruticosa, floribus femineis lanatis Gmel. fl. Sibir. Tom 3.  
pag. 17. tab. 2. fig. 1.

Amaranthoides A. foliis ovatis, caule erecto, spicis simplicibus longis pl. p.  
13094. f. v.  
Gmel. fl. sib. 3. p. 21. Tab. 3.

Habitat in Dauria <sup>in</sup> fructus  
Caulis teres erectus ramosus. rami alterni floriferi vs 3-4  
aggregati inaequali partente inferne nudi superne folio  
si et floriferi. folia petiolata integerrima ovata armata  
nervi minuti, polliciana vel ultra plerumque tot quot  
rami. flores <sup>foeminae</sup> in axillis foliorum ramorum sessiles terni  
folia 3. ad basi inaequalia. bractea masculinum in  
apice ramorum breviter oblongum pedicelatum <sup>un</sup>

foeminae  
floribus axillaribus  
foeminae  
foliis lanceolatis  
ramorum masculinis terminatis pedicelatis  
sessi.

prostrata A. foliis obovatis, caule subdiviso, floribus capitatis. Lin. Spec. pl. p. 1390x  
Gmel. fl. sib. 3. p. 24. t. 4. fig. 2.

Habitat in Libria O

Caulis ramis primis pithamensi diffusus. Folia obovata, petio-  
lata. Floribus apices ramorum, conglomeratis, immixti  
solioli numerosi. Lin.

non vid.

eratoidea

*Hybrida* a foliis ovatis, caule erecto, fructu conglomeratis Linnæi. pl. p. 1390\*

Gmel. fl. sib. 3. p. 24<sup>29</sup> tab. 3. tab. 4. fig. 1

Habitat in Sibéria O

non vid.