

Alyxia

1. pusilla A. foliis cordatis glabris
2. longata A. foliis ovatis integris glaberrimis, germine pedicellato, nectario de
centrifido radiato
3. tomentosa A. foliis ovatis-subobtusis tomentosis
4. magna A. foliis cordatis pubescentibus, florum germine sessili

pusilla A. foliis cordatis glabris Len. Act. Holm. 1756. p. 23. t. 2. * L. V. 821.
ut et folio anomala, flore pentaphyllo purpureo, fructu pentacocco
municato Sloan hist. 1. pag. 209. t. 132. fig. 2.

Dayenia inermis, foliis oblongo-cordatis marginibus dentatis, flori-
bus axillaribus Mell. Diet. tab. 118.

Ayenia foliis ovatis acutis serratis, germine pedicellato, nectario plano
stellato Loeffl. it. 200.

Habitat in Jamaica, Cumana, Peru & 4

Caulis ramosus teres glaber. Folia petiolata alterna, inferiora
subrotunda superiora oblonga acuta omnia serrata basi integer-
rima venis utraque unguicularia petiolus filiformis. Flores axilla-
res solitarii.

Ayenia, *pusilla* Caule suffruticoso prostrato, foliis ovatis serratis glabris
Cavan. Diss. pag. 209. tab. 147

ad Monadelphiam amandatur

Coriata *Ayenia* foliis ovatis integris glaberrimis; germine pedicellato, necta
no decemfido radiato. Sw. prod. pag. 97.
Habitat in Tamaqua

non vid.

tomentosa A. foliis ovato-subrotundis tomentosis Loefl. 200. 257. Lin. S.V. pag. 821.
Habitat in Cumana.

non vid.

magna A. foliis cordatis pubescentibus, florum germine fessili Loeffl. iter. 199
Lin. S. V. pag. 821. Jacq. Plant. Amer. p. 296.

Habitat in Cumana Carthageno.

Inde ex erectus quinque pedalis. Folia cordata, acuminata, serrata
alterna, utrinque tomentosa pollicaria. Petiolus pollicaris
tomentosus. Pedunculi axillares quaterni, triflori, breves.
Flores exigui e viridi pallentes.

non vid.