

# Azalea

1. pontica A. foliis nitidis lanceolatis glabris, racemis <sup>utrinque</sup> terminalibus  
2. indica A. foliis lanceolatis ciliatis, floribus aggregatis <sup>terminalibus</sup> sessilibus gla-  
bri, calycibus <sup>staminibus</sup> cordata brevibus  
3. *propinqua* A. foliis <sup>concolorato ellipticis subciliatis</sup> ovatis, corollis pilosis, staminibus longioribus  
4. *viscosa* A. foliis ovatis <sup>marginatis</sup> serratis, corollis pilosis glutinosi.  
5. *capponica* A. foliis oblongis <sup>oppositis sessilibus</sup> ad presens punctatis excavatis reticulatis  
6. *procumbens* A. ramis diffusis procumbentibus, foliis oppositis <sup>cordatis</sup> <sup>marginibus</sup> revolutis  
7. *pelosa*

1 corollis campanulatis

no. 1. 2. 3. - 67.

corollis infundibuliformibus

pontica A. Zucc.

Habitat herb. Fusz.

Rami teretes, glabri, apice pilosi. Folio versus apicem, bipollicariis, oblongis, mucronata, supra avenae, glabra, subtus tenuissime nervosa, venosa, subvillosa, ciliolata, Petioli breves, villosi. Flores in apice aggregati, magnitudine fere viscosi, pollicares tubo villosi.

punctata Aralia folii margine scabris, floribus punctatis congestis Lour

Fl. Cochinch. pag 103.

Habitat in Cochinchina.

Arbor 5 pedali exilis. folia lanceolata, utraque vixima glabra  
aeterna. flori terminali albi. Calyx rubro punctatus

1 pontica *Aranea* foliis nitidis lanceolatis utrinque glabris, racemis terminalebus. Lin. Spec.  
pl. p. 1669 \* S. V. p. 190

*Chamaerodendron pontica maxima*, mespil. folio flore luteo Tournef. Corol. 42. Act.  
Panf. 1704. Buxb. cent. 5. p. 36. t. 69.

Habitat in Ponto, Trapezunte &

Simillima *Rhododendron pontico*, sed huius stamina. Corolla lutea. Folia minus  
sunt ovata, ciliata. Lin. L. c.

non vid.



rosmarinifolia A. Plombas solitarii, foliis linearibus lanceolatis margini  
reflexis hirsutis

Burm. fl. ind. 42. t. 3. fig. 3.

Habitat in India orientali

3 *mediflora* A. *Folius ovatis, corollis pilosis, staminibus longissimis* Lin. I. V.  
DuRoiel arb. 1. p. 85. t. 3.

*Cistus Virginiana*, periclymeni flore ampliori minus odorato Planch.  
man. 49.

Habitat in Virginia sicis

differt a sequente quod flor. & antequa folia vel sub ipsa vernatione

a *carnea* floribus carnis

β. *utilan* floribus saturate rubris, calycibus minutis

γ. *carnea* floribus pallide rubicundis: tubo basi rubro, calycibus foliaceis

δ. *alba* floribus albidis, calycibus mediooculis

ε. *bicolor*. florum limbo pallido; tubo rubro, calyce parvo, ramuli  
pilosi

ζ. *populeacea* floribus rubicundis: lacina infima alba, calycibus foliaceis

η. *partita* floribus carnis usque ad basin quinquepartiti

*Folius lanceolato ellipticus*

*Folia pubescentia costa pilosa*

4 viscosa A. foliis margine scabris, corollis pilosis-glandulosis Lin-Spec: pl. p. 2147

Custus virginiana, flore et odore peniclymeni Pluk. alm. 106. T. 161. fig.

4. Cat. fl. car. 1. p. 57. 8. 57.

Habitat in Virginia 5

Rami tenues <sup>cinere</sup> glabri. ramuli purpurascens pilis raris, raris  
ribus proferentibus superne adpressis. folia <sup>sub petiolate albescens</sup> lanceolata oblonga  
vel ovata, utraque <sup>acuta</sup> glabra nisi juniora interdum supra pilis

topi saepe attenuatis <sup>de</sup> venis <sup>semitinis</sup> <sup>centiculis</sup> minutissimis scabra, subiliata sequipolliciana  
mucronate supra avenia subtus venosa. Flores in apicibus ramorum  
aggregati, pedunculati. Pedunculi villosi. haec floret  
antequam portquam folia omnia adulta sunt

a. odorata floribus albis, ramis diffusis, foliis saturate viridibus laetidis

b. villosa floribus albis: cassis carnis, stylis elongatis apice rubris  
foliis pallidis ovato-oblongis

v. fusca floribus albis ad basin usque diffusis, foliis saturate viri-  
dibus laetidis

d. floribunda floribus albis, subtus glaucis, stylis corolla longioribus

e. glauca floribus albis, foliis utraque glaucis: junioribus supra pilis  
adpressis



glauca Cl. foliis lanceolato ovatis subtus glaucis, floribus albis  
paniculatis corollae ut longioribus La Mart  
Habitat in America septentrionali

varietas villosa

pelosa A. foliis pilosis ad apicem niveis, floribus odoratis, corol-  
lis rotatis La Martk  
Habitat in America ~~mer~~ boreali

non vidi



6 procumbens a ramis diffusis procumbentibus fl. lapp. 90. t. 6. fig. 2. 1. V. fl. Dec. 1. 9

Chamaecistus VII

Chamaecistus serpylli folia, floribus carnis Baub. pan. 466

Chamaerhodos Rupena ferruginea, thymifolia alpina Boie  
mus. 2. p. 64. t. 53.

Habitatio alpebus Europae

<sup>procumbens</sup>  
fruticulus <sup>procumbens</sup> caulis romosissimus teres glaber caespitae saepe caespites formans  
folia petiolata opposita, lineariblonga integerrima <sup>crasped</sup> impunctata  
lateribus reflexis semiunguiculata glaberrima. nervo  
lato subtus folium percurrente, crassifida avenis <sup>crasped</sup> exsertis  
parum reflexa. pedunculi superne 2. 4. 5. breves glabri. lacinae  
calycis lanceolati. petioli basi porum dilatatus  
foliis oppositi <sup>marginati</sup> margine <sup>reversis</sup> revolutis

2227

L

Michx

Calendula ca

B flamma

fulva

periclymenoides

nuda

canescens flores rosei