

## Begonia

- ♂ Pal. nullus. Corolla polypetala. Stamina numerosa  
♀ cal. nullus. Corol. polypetala bipinnata. Capsula alata, polyperma
1. apetala. B. fructuosa erecta, foliis glaberrimis inqualiter cordatis obsoletae dentatis, capsula alata maxima subrotunda
  2. ifoptera B. caulepina, foliis glabris semicordatis obsoletae dentatis, capsulae aliae subequalibus parallelis
  3. reniformis B. caulepina, foliis reniformibus angulatis dentatis, capsulae alae maxima acutangulae; reliquias parallelis minimis
  4. erminea B. caulepina, foliis cordatis acuminatis serratis, capsulae alae maxima subrotundis obsoletae
  5. crenata B. caulepina, foliis inqualiter cordatis subrotundis obtusis crenatae dentatae, capsulis bilobulatis
  6. venifolia B. caulepina, foliis inqualiter cordatis ovatis acuti angulatis obsoletae dentatis, capsulis bilobulatis
  7. ferruginea B. caulepina, foliis inqualiter cordatis dentatis, floris majori petalis oblongis subequalibus
  8. grandis B. caulepina, foliis inqualiter cordatis angulatis serratis, capsulae aliae parum inqualibus
  9. macrophylla B. caulepina, foliis inqualiter cordatis crenato-dentatis inferioribus angulatis, capsulae aliae obtusangulis una maxima

10. acutifolia B. caulepens; foliis ferme cordatis angulatis dentatis, capitulo ala  
maxima obtusangula; reliqui acutangulis
11. culminata B. caulepens; foliis hispidis ferme cordatis acuminatis inaequaliter den-  
tatis, capitulo ala maxima obtusangula, reliqui acutangulis
12. humilis B. caulepens; erecta, foliis hispidis ferme cordatis duplicito-ferratis,  
capitulo ali rotondato granum inaequalibus
13. horseta B. caulepens; foliis hispidis ferme cordatis duplicito-ferratis, capitulo ala  
maxima obtusangula; reliqui paralleli minimi
14. utricaria B. caulepens radicans; foliis utroque hispidis inaequaliter ovato-duplicato-  
ferratis, capitulo basi tricornibus
15. scandens B. scandens radicans; foliis ovato-subrotundis obsoleti dentatis, capitulo ala  
maxima obtusangula; reliqui paralleli minimi
16. tuberosa B. repens; foliis inaequaliter cordatis atul angulatis dentatis, capitulo ali  
paralleli
17. rotundifolia B. repens; foliis reniformi-subrotundis exeratis
18. nana B. acaulis; foliis tanè colatis capitulo subbifloro
19. Venera B. acaulis; foliis inaequaliter cordatis, floribus umbellatis
20. Diptera B. acaulis; foliis inaequaliter cordatis, pedunculis dikehotomis, capitulo  
ala una maxima, altera angusta, testa obsoleta
21. octopetala B. acaulis; foliis cordatis quinquelobis, pedunculis dikehotomis

Begonia

Habitat in Insula francie

Sola integriformis

Beyonia

Habitat in lava

Tota glabra . Folia remote denticulata . Pedunculi Dicotomi

Begonia

Habitat in Braplia herb. f.  
petioli lanati; & olia globra dentata

Beyoncia

Habitat in Madagascari Commer. herb. Guj.

Solia radice alia, glabra, bipinniana, basi subcordata, obsoleta multiloba, crenata, crenis mucronatis. Petioli longitudine folii. Scapi erecti, foliis parum longioribus, medio folis unico, flores racemosi, remoti, oppositi, superne bractea ovata ad base pedicellorum.

Begonia

Habitat in Madagascari Comme f. herb. Guy.

Tota glabra. Caulis brevissimus aut rotundus. Folia subrotunda, basi pubescens,  
inqualiter dentata: dentibus setaceis, usque pollicaria, quinque nervia.  
Scapus folius altior, superne bifidus.

Begonia

Petribat in Peru

Folia oblonga, angustiulata, alterna, acute, et marginem serrata: fera  
Tunis seta mucronatis. Stylo lanceolato. Pedunculi capillares, foliis mul-  
to longioribus, uniflori.

grandiflora Begonia foliis radice albus pubescentibus.

Habitat Lema herb. Guj.

Radix tuberosa rizofora. Folia cordato-veniformia, suethamoa, multilobata: lobi rotundati, inoque alter dentata, quinque nervia, nervi pubescentes. Scapus longissimus, multiflorus. Bractea orata, decidue. Flores masculi petalas 5: 7. g. foemina petala 5: 6.

Begonia

Habitat in Pene herb. fus.

~~Radice globosa, purpurea.~~ Pauli Veri, subnudus.  
Solia reniformia, publobata, inoequaliter dentata, carnosa, subbas albi-  
cantia, nitida, margine purpurea. Stipulae reniformes. Germen unicolor  
ore, in aqua <sup>Cappello cornuta</sup> dubio quatuor, 3 his longissimo, purpureo. Fructus velutin  
caulis Dom bey

Solia diametro transversali bipinnatis. Pedunculi elongati bi-j. triflori  
flores remoti

*Begonia erminea* B. caulepis, foliis cordatis acuminate fimbriatis; capsula ala  
materna falcata; reliquis obliteratis Br. in A. T. I. p. 162.

*Begonia erminea* herbacea, foliis subequalibus cordatis acuminate cilia  
40-dentatis, supra ciliato appendiculatis  
Herit. & N. L. p. 95 Tab 47.

Habitat in Madagascari

Stipula falcata, acuminata. Cymbi terminalis. Denteulo condato  
sparsa in pagina superiore

non s d

Ddt la manz

Nitida  
minor B.

Begonia roseo flore, folio aucto, minor et glabra. Plam. gen. p. 20

Begonia minor Gaéqu coll. 1. pag. 126.

Habitat in Cambodja

Pauci plures, teretes, erecti, debiles 3-angledae cospicie digitim manni. Stipe  
la oblonga, revoluta, caducis, gemina, acuminata, bifida, follicularis. Folia  
cordata, altero latere ferme deficiente, acuta, hastata, plana, obsoleta & rara  
alternas petiolata. Racemi axillares, compositi, paniculati: vertic  
multi-flori foliis longioribus, suberectantibus. Bractea subrotunda, siccis caduca  
Corolla carnea apetala duos opposita subrotundatae lato oblonga multo  
angustiora, longitudine aequalia. ♂ filamenta 25. calyx 0. ♀ calyx 2 phyllis  
filiolo late subrotundatis. Petala 5. supera crassa, obtusa, plana, magna. Germen  
+ natalium varia materia stylis 3. Stigmata bipartita Gaéqu

Det 4us per

1. nitida B. fimbriosa erecta, foliis glaberrimis inqualiter cordatis obsolete  
dentatis, capitulo alio maxima subrotunda Dr. in L. T. I. p. 154  
*Begonia obliqua* fimbriosa, foliis oblique cordatis carnosis glaberrimis  
stipulis triplenis L. Herit. Pl. nov. 1. p. 95. Tab. 46 ex dupl. synonymis planinis  
*Begonia minor* Jacq. coll. 1. p. 120.

*Begonia purpurea* caule fructuosa erecta; foliis cordatis ovato-lanceolatis  
obsolete serratis obliquis; floribus paniculatis  
S.W. Prod. 186.  
*Begonia nitida* fimbriosa erecta, foliis glaberrimis inqualiter cordatis acutis  
obsolete dentatis, stipulis caninatis  
H. Kew. 3. p. 352.

Habitat in Jamaica  
Paulo glaber - folia petiolata tripliciana levia attenuata  
utrinque glaber pubes septennaria, adspersa oculo  
armato frumenti minutis granis. Pedunculi diachotome  
ramospi

10. acutifolia Beg. caulescens, foliis feminis alto angulatis dentatis, capitulo  
ala maxima obtusangula; reliquias acutangulis Dr in Cen. T. 1. p. 165.  
Begonia acutifolia Jacq. coll. 1. p. 120. n. 4 ex et. syn. Plan.  
Aceniguetia herba anomala, floret et apetalo alto Pl. Rest.  
§ 127. fig. 1. 2.

Habitat in Jamaica

Caule teret, veli ferrugineo asperis, folia petiolata pubes-  
centi majoribus, parum ramosis ferrugineo villosa, attenuata  
bipinnata pollucem lata pedunculi dichotoma na-  
mosi

purpurea Jacq. coll. 1. p. 122. 24

sw 15 fl. an. 18994

Dichotoma Begonia caule fructuoso erectifolio, foliis dentatè cordatis  
veluti fribus rufis villoso  
Begonia dichotoma Gaugu. coll. 3. pag. 256.

Habitat ad Paracai.

Caulis ramosus obsoletè angustatus junore: a peli albi hispiduli. Tela  
petiolata, alterna, subrepanda, dentato-crenata, venosa, cordata, supra  
nitida glabra, pubescens pallide virens ad venas obsoletè hirsuta 10 polli  
lata. Stipulae gemello, ovato, integerrima, caducæ. Pedunculus  
communis famipedalis, pilis raro spinis adspersus. Bractea minute opposta  
pannicula Dichotoma ♂ Cal. O petala 4. 2. opposita subrotunda 2 oblongo  
qa minora filamento 30. ♀ Cal. O. petala 5: oblonga 2 extenuor  
minora. Germen 3 alatum. Styli 3. Stigma simplicia Gaugu.

non ordi

12. humilio B. canescens erecta, foliis hirsutis fimbriatis duplicito-ferra  
ti, capitulo aliis rotundatis panum inqualibus Hort. Kew. 3. pag.  
353. Dr. in L. Tr. 1. p. 166. Tab. 25

Habitat in Insula Trinidad.

Tota planta carnosa lucida. Caulis petiolis et pedunculis pallida rubescens.  
Ovalis teres granularis fumidus altero anno bipinnatus. Folio fimbriato  
circumnotatae pinnato-pinnata; pinnatus ciliatus; pinnas fimbriatae rufae,  
hirsuta e frangit molibus ericeti bofi tuberculatis, pubes pallida glaberrima  
ma postea frangit ranore in venis, ut in petiolis. Stipula fimbriata,  
conica, ciliata, hyalina. Pedunculi axillares, superius distichotomi. bractea  
ad basim peduncularum ovata ciliata minuta. Petala majora alba quor  
um cordata obtusa, magna; duo minima quo intendum debeat. Filamen  
ta unites 15. feminei petala 5 alba perspicillata crato oblonga; duo  
paulo angustiora. Germe in trigoneum. Styli tres. Stigmata bipartita  
Dryand.

2. *Isopelta B.* caulescens; foliis glabris semiordatis obsolete dentatis; capitulo  
alijs subequalibus parallelis &c. in L.T.I. p. 160 Smith Ge. 43.  
Habitat in Java.

Panicis erectis, cernuis, obsoleta frondis glaber. Dolia alterna petiolata  
semiorbitalia acuminate, undulata, obsoleta dentata, venosa, supra  
venosa, supra cote randa glaberrima, subtus pallide ferruginea.  
Panicea terminalia dichotoma glabra. Bractea oblonga membrana  
cera decidue. maxime Smith.

non vidi

3. reniformis B. caulescens; foliis reniformibus angulatis dentatis, cap-  
sula ala maxima acutangula; reliqui parallelis minime  
dis. in C. T. 1. pt. 161. Tab. 12. fig. 1. 2. \*

Habebat in Brasilia prope Rio de Janeiro in fessis rupium  
umbrosi.

Caulis carnosus, brevis, ramosus digitatus - Dolia alterno petiolata, latiora  
quam longa, sabreformia, exerto-dentata anguli 8-12. exqua  
libri acuti; basi cedata altero latere minore. Petiolis longitudine dia-  
metri longitudinem foliosam. Pedunculus communis fructiferus termina-  
tus cyano his dichotoma, dein tetracho ~~to~~ toma. Pediellis umbellatis  
corolla majora tetraptera pedata emarginata, petala alba, duo opposita  
majora, ovata integriformia, reliqua dimidio minoru oblongo - lanceola-  
ta, acute filamenta leviter 30. foeminei petala 5: oblonga subcylindri-  
ca acutiflora alba. Germen infernum ovatum triangularis. Stylis 3 bi-  
partiti solan.

non vidi

*s. crenata* Brz. caulescens, foliis inaequaliter cordatis subrotundis obtusis crenato-dentatis, capillis bicoloribus Dr. in C.T. I. p. 152. Tab. 14. \*

fig 3.

Habitat in Indie orientali insula Salfette.

Flori magnuli petala quod duo opposita angustiora: foeminei petala s.  
angustiora. Stylus unicus in quo

non vidi

*C. menziesii* Beg. caule piens, foliis inaequaliter cordatis ovatis acutis angula-  
tis obsolete dentatis, cappulis bilocularibus. Gr. in L. Tr. 1. pag. 162.  
Tab. 14. fig. 4. \*

Habitat in Prov. et fluit prope Favam.

magis clausa tetrapetala; compresa, albido incarnata, rubro striata.

Duo est tenera ovato subrotunda, bisp. parum cordata duo interiora menor  
ovato-oblonga, obtusipinula. Filamenta (100) foeminei petala 5;  
interiora ut in mare intimum relegui minus. Styli tres glabri longior

non vnde.

*B. ferruginea* B. Cauleffseni, foliis inaequaliter cordatis dentatis; floris ma  
jori petalis oblongis pedicellatis. Dr. in L. Tr. 1. p. 163. Smeth  
u 44

*Bergenia ferruginea* Fructosa, foliis integrernis, floribus penicu  
latis Lin. Suppl. 419. L. Marti Encycl. 1. p. 395. n. 9. Gaugu Coll. 1.  
p. 120. n. 1.

Habitat in nova Granada

Pauli suffrutescens; declinatus teres, caespitosus levigatus.  
ramuli alteri pubescens, foliosi. folia alterna petiolata, inaequa  
liber cordato acuta, opposte exata, subciliata; supra apicula ad  
venas pulchra subtili pallida squamulis maiori rotundatis albido  
lucido confertissimis teste, venae induritis, prominentes hirsuti. Petiole  
pubescentes. Hipsolo semi cordato ampliatiscaulis integrernis aucto  
subciliata, alterna duplo major. Panicle dichotoma axillaris  
vel terminalis. Pedunculi pubescentes bractea binaria ad fragilium  
flore unisexualis ovata acuta, subciliata, decidua. Flores purpurei  
nutantes. masculi flores petala 4. equalis lanceola duo lateris  
ra acuta. duo interiores minora emarginata. Staminea 9-10.  
feminae petala 6. extrema tria acuta interiora emarginata  
styli numerosi (24) dichotomi Smeth

non vidi

S. Grandis B. cauleſcens, foliis inqualiter cordatis angulatis ferratis, capitulo  
ali panum inqualibus Dr. in L. T. 1. p. 163.

In Haedo Bompf Ann. 1800. Sc. Tab. 20.

Begonia obliqua. foliis inqualiter denticulatis

Thunb. fl. Jap. 2314

Habitat in Japonia

Rad. et cauofa subgloſa magnitudo nucis. Caulis Versi ſimplex, car-  
nopt. vnde i punctis anterioribus bipedalis, varo ad oſte  
li ramulis parvo. Sola alterna petiolata, ovata, cordata  
latera altera breviora, duplicita ferata, nervosa, atullis par-  
vis aperto, glabra, fultis pallido palmaria. Petioli digitales.  
Paniceula terminalis dichotoma. Pedunculi glabri. pedicelli pubtri  
flori ſem. durfi in his pedicellis. bractea ovata obtusa concava  
integro glabra. Corolla petala quorū purpurea exteriora duocoda-  
ta, fimbriata interiora ſimilia quadriplo minora.

non vid.

*Begonia macrophylla* B. caulepens, foliis unequaliter cordatis crenato-dentatis  
inferioribus angulatis, capitulo alio obtusangulis: una maxima.

Dr. in C. T. I. p. 164.

*Begonia purpurea* et nivea maxima, folio aurito Plam. Ge: 34.

Tab. 45. fig. 1.

*Begonia grandifolia* Tai-ku. coll. 1. p. 120. n. 2. ex Chuf. Syu Brown

*Begonia grandifolia* Tai-ku coll. 1. p. 120. macrophylla Marti

Enigal. 1. p. 394. n. 6.

Habitat in Insulis Andic occidentalis.

non vidi

11. aëuminata Berg. caule pano; foliis bipidis semiordatis aëuminatis inqua  
lites dentatis; capitulo alla maxima obtusangula releguis acutis  
gulis Dr: in Cen T. 1. p. 166. Tab. 14. fig. 5. 6. \*

Habitat in montibus Tamaico.

masculi petala 4. duo opposita minora - feminei petala 5. duo minora  
fracteo duo acute serrato, germine dimidiis mucronis

non vidi

13 herpetia Beg. caulepens; foliis hirsutis fennicordatis duplicato - serratis, capite  
ala maxima obtusangula; reliquis parallelis minimis Dr. ea L. Trans.  
1. p. 167.

Begonia herpetia

Auct. Guian. 903. n. 340. La Mart. Encycl. 1. p. 393. n. 3.

Gaiger. coll. 1. p. 129. n. 8. excluso Synon. Plum.

Habitat in Guiana nebulas.

non ord:

14. utris Begonia caulescens radicans, foliis utnique hispidis inaequilateris  
ovatis duplicito-serratis, capsulis bafi in cornibus dicitur in L.T.  
1. pag 167. Smith. Plant. Ind. 2. pag. 245 tab. 45<sup>o</sup>  
Begonia urtica herbacea diffusa, foliis bipinnatis hispidis, pedunculis  
aristellatis elongatis seu sup. p. 426. Lamark Encycl. 1. p. 394.

India c. t. 45°.

Habitat in America. 4?

Caulis plurimi herbacei pedales ad scandentes, generatim  
ad nodos radicantes ramosi, foliosi testacei fulvi subflexuosi super  
ne hasti. Solea petiolo alternae, serratis apice velutinae,  
Tenebrionis rubra utnique petio raro hispida, fastigia pallida. Petioli hasti. Stipula  
ovata, membranacea apice setacea dentata extus pilosa  
Pedunculi axillares longitudo folii hasti subbiflori. Bracted  
membranacea ciliata dentata. flor alter terminalis petala 4 or  
ovata exterius apice extus pilosa subaequalia stamna 14-18.  
foenum 5. Styli 5. Stigmata profunda? Smith.

non vid.

15 Pandeni B. scandens radicans; foliis ovato subrotundis obsoletae dentatis;  
cappulae ala maxima obtusangula: reliquis parallelis minores  
Dr. in Lin. Trans. 1. p. 168.  
Begonia glabra Aubl. fl. ju. 916. t. 349 Lamk. Enc. 1. p. 394. n. 4  
Jacq. coll. 1. p. 129. n. 5.  
Begonia scandens: scandens radicans; foliis cordato-ovatis rectis obtuse sericeo-  
tri, floribus paniculatis Sw. prod. 96 et alijs synonymis Blumea  
q. habitat in Guiana et Jamaica.

monard-

16 Tuberosa B. repens, foliis inqualiter cordatis angulis dentatis, capitulo aliis  
parallelii dr. in L.T. I. p. 168.

Competnum aetosum Rumph. amb. 5. p. 457. tab. 169. fig. 2.

Begonia Tuberosa La March Enc. I. p. 393. n. 1.

Habitat in siccis insulanum Amboina, Moluccas et Celebes.

non vidi

17 rotundifolia Beg. repens; foliis reniformi-pubrotundis crenatis dr. en den  
T. pag. 169.

Begonia rosae flore, folio orbiculari Tournef. & R. H. p. 660. Plum  
Cat. pl. Am. p. 20. co. 33. v. 45.

Begonia obliqua A. Spec. pl. pag. 149. 8.

Begonia rotundifolia la Meurk Kniggl. p. 394 n. 7.

Habitat in Andes occidentali

non vid.

18 nana Bey. aculeis, foliis lanceolatis, fr. capo pubbifloro Dr. in L. Tr.

1 pag. 169

Begonia nana aculeis foliis equalibus, fr. capo pubbifloro

— L'Herit. Syst. nov. 1. p. 99. t. 40.

Habitat in Madagascari

palmari. Tela lanceolata - acuminate, ciliata ferrata. Scapus  
bis. inflorum

non vidi

19 Janv. B. acantho; foliis inquester cordatis, floribus umbellatis Dr. in  
act. Acad. Lin. Trans. t. p. 169. Tab. 164

Habitat in Zeylona.

Folia omnia radicibus, orbiculato-cordata, acuta inquester dentata  
membranacea supra fibrillis basi glandulosis gelueis adpressa  
fibrilla pubes raro profectio ad venas. Petoli teretes fibrillis  
adpresso sepe pedales. Scapo erecti vertice lutes petiolis tenuiori.  
Scapo radicale ovata circumdata concava, dorso canalis femur  
cavus. Flores umbellati masculi numerosi petala 4. nerva 2 us  
exteriora orbiculata extus fibrillis adpressa interiora ovata acuta  
minora utique glabra. Stamina 50. feminei petala 6 3 exteriora  
3 interiora. Germen triquetrum. Style 3. Umbella interdum compacta

Ita Vronej

non vidi

20. *Diptera* Beg. *accutis*, foliis inaequaliter cordatis, pedunculis dichotomis, capite  
et ala una maxima; altera angusta; Vertea obsoleta Dr. in C. T. p. 171.  
*Begonia* *Papenfussii* species capensis Lin. Mant. 502.  
*Begonia* *capensis* *accutis*, foliis inaequaliter dentatis  
Lin. Suppl. 420. Gaugu. coll. 1. p. 130 n. 9

Habitat in Anjulai Joann ad latera montium. Aeneulae  
Radix tuberosa, corolla <sup>Scapa</sup> verticillata, petiolis longioribus <sup>apice</sup> dichoto-  
miae. Folia radicilia, petiolata, oblique cordata, repanda, denti-  
culata. Duo petala obcordata et cordata

*Begonia obovata* aculeo, foliis cordatis quinquelobis, pedunculis de hoto no  
Dryand. in Ac Sin. Trans. 1. p. 171

*Begonia obovata* aculeo, foliis cordatis quinquelobis, non equaliter  
Dandie, Flora Bur. Maxima ~~et~~ petalis  
L'Herit. Steys. nov. 1. p. 181

Habitat in montibus Lino  
Folia nervosa venosa ut pubescens maxima vitis. Scapus bi  
pedales multiaffinis. Flores corymbosi. Mas petala 6-9 plerisque  
S. foemina 5-6.

non vidi

Malabancia B. caule exerto foliis obsoletis dentatis subtus hispatis pedunculis  
in infloris

Rheed - Malibg pag 167. tab 60

non red: