

Blasia

1. japonica B. foliis serratis glabris
2. villosa B. foliis serratis
3. Enjpa B. foliis oblongis crispis glabris

1. japonica *Bladhia* foliis serratis glabris
Thunb. nov. gen. pl. p. 7 cum tab.
pag. 95 tab. 10

S. V. pag. 237. fl. jap.

• *Qua-chi-tzet* et *Tabo-kofi* vulgo *Tanna Tadjibanna* *Kiamp.* Ann. exot.
p. 766 et *Sjiro Tadjibanna* ib.

Habitat in Japonia $\frac{1}{2}$

Caulis frutescens erectus palmari vel pedali rursusque ramifus.
Folia versus summitatem fraxentea opposita, petiolata
ovata acuta pollicaria. Flores axillares umbellati
carnosi, cernui. Pedunculus striatus glaber bypollisium
Thunb.

villosa B. foliis serratis villosis Thunb. fl. jap. 967. 19. V. p. 237.

2

Habitat in Japonia

Caulis filiformis ex herbis pilulis tomentosus digitalis. Solia
opposita petiolata, ovata ^{acuta} remote serrata, villosa -
lobata unguiculata. Petioli ^{ramiculi} laterales capillares tomen-
tosi pauciflori Thunb.

non vid.

3
Cnippa B. Folis oblongis crispis glabris Thunb. jap. p. 974 S. V. 237
Muhakutsi vulgo Sanna Taopi banna Kompp am. 5. p. 776.

Habitat in Japonia

Caulis teres, glaber simplex spithameus vel ultra. Folia alter-
na apice attenuata, obtusiuscula subtus pallidiora, nervis
superiora spithamea. Flores laterales paniculati
bracteis rubra magnitudine pipi

glabra B. foliis oppositis serratis glabris, caule erecto Thunb. in act. sci. lin.

Cond. 2. pag.

Habitat in Gaponia

non vidi

Bladhia

1. africana m. foliis ellipticis acutis
2. retusa. m. foliis obovatis obtusis apice emarginato-denticulatis