

Blechnum?

Semulatum e Blechn. fori huiusmodi. Pong. e Puerto Nuevo de San Luis  
Blechnum a Le Dni datum confer cum Plumieri feb. tab. 62.

*Semulatum Blechnum*

Habitat in Florida herb. Richardi

Stylos tenuis, leviss, glaber, superiore sulco, sesqui-pedales. Trons pennati: pinnae  
fasciatae, altera per panem remota, bi-follicularia et ultra, lanceolata, glabra,  
base superiore obliqua, semulata, supra obsolete striata

radicans B. frondibus bipinnatis: pinnis lanceolatis crenulatis: lineolis  
fimbriatis interruptis Lin. Mant. 307. f. V. p. 932.

Telex mos vulgaris similis, pinnulis amplioribus planis nec crenu-  
tis, virginiana Pluk. alm. 151. t. 179. fig. 2.

Habitat in Virginia et medere rimis rupum profundis argilla  
ceis

japonicum B. fronde bipinnatifida: pinnulis acutis obtusis serratis  
Thurb. fl. jap. pag. - f. v. 932.

Blechnum japonicum frondibus pinnatis: pinnis lanceolatis  
semipinnatifidis: lobis obtusis pinnatis len. Suppl. pag.

445.

Habitat in Japonia

virginicum B. - frondibus pinnatis pinnis multifidis L. Mart. 307 f.

S.V

Habitat in Virginia

caustalis B. frondibus pennatis: pinnis subsessilibus cordato-lanceolatis in  
terminis: inferioribus oppositis her. Mont. 130. t. V. p. 932  
Habitat ad C. b. p. i.

orientale B. frondibus pennatis: pennis lanceatis alternis Lin. Spei: pl.

May 1935

Habitat in China

Truncata: penna lanceolata alternis, valde attenuata, 5-6 polli  
caesi, extrorsum sensim minorer, integerrima: Linea per tota costam non inter  
rupta Lab. Roseni.

occidentale B. frondibus pinnatis: pinnis lancicollatis oppositis basi emarginatis

Lonchitis s. hemionitis pinnata juxta nervum pulverulenta fil.

Tab. 62. fig. B. Amer. 207. 29.

Lonchitis juxta nervum pulverulenta Pet. fil. 120. t. 3. fig. 9

Monf. hist. 3. p. 560. f. 14. tab. 2. f. 16.

Lilix minor in penna tantum divisa crebras non crenatas  
auniculatas, et lineis pulverulentis notatas Sloan. hist.

1. p. 174. 44. fig. 2.

Habitat in America meridionali.