

Borbonia

1. ericifolia B. foliis publinearibus acutis subtriangularibus; capitulis terminalibus
2. trinervia B. foliis linearibus - lanceolatis tri nervis integerimis, floribus terminalibus pedunculatis
3. lanceolata B. foliis ovato-lanceolatis multinervis integerimis floribus capitatis
4. cordata B. foliis cordatis - ovatis multinervis margine fimbriatis
5. crenata B. foliis cordatis multinervis rebiculatis dentatulatis

uni folia B.

pedunculi atellari et terminali. Legumen compresum, ore pollucere
herba maxima

super folia Borbonica foliis ovatis, pedunculis axillaribus uniflori, ramis angustis

Habitat in cap. b. fr. herb. Roraini 5

Tridex folius, glaber rigides. Rami a canina foliis decurrente angustis, sparsi, sepe
divaricati. Folia sessilia, ovata, acuta, ut angustularia, rigidissima, venosa, erecta,
patentia. Pedunculi arcu illaser, foliari, angulati, capillares, uniflori, folio con-
giore, apphylli. Flores parvi. Calyx quinque partedus: lacinias tubulatas, lan-
ceolata

an hucus genere

Borbonia

Aster. Morgenii a Cap b.-prei

Rami crassifl. penns. cgyneos, angulati : ramuli frequenti. spini

an Lipana habeo

Bontonia

Habitat in cap. b. fhei. herb. Shauanii &
Drindicularis ramosus, glaber. Sola unguiculata, ottunya.

habeo

Cineans Borboonia

Habitat in Cap. 6. spic herb. Rogen.

Rami aggregati, spic 4-5 sub verticillati, superne pilosi. Sola lineaia, glabra, angui
culana vel parum ultra, cissa, lucida, acutifolia. Flores terminales 4-5 per spicis
in capitulo glabro, involucrati foliolis ordinatis. Bractea oblonga, obtusa
fusca longe dulcine calycis, uti Calyx hispida. Calyx laevius ovoe-lanceolata
Corolla glabra, calyce longior.

habes

fractioidei Bottonia folii filiformibus; racemo attillaris.

Habitat in Cap. b-frei

Ramulus angulatus, glaber. Ramuli tuberculati. Solia ligata, glabra, sesquipedal
liana, foliata, mucronata, in ramulo confusa. Racemi breves; Cystisus
biflorus. Legumina fere ut in Aspalathus, orato-lanceolata semipeltaria. Verte
cum et canora villosa
an Spartii specie?

Linodes-Bortonia

Habitat in Cap. b. frice herb-Royer.

Rami tuberculati, glabi: ramuli vernati, glabri. Seta frequentissima, simplex,
nudicoria, alterna, linearis-lanceolata, acuta, exsertione nigra, glabra,
mediis fusa. Flores in capitulo vernali, globoso, hermato. Bractea et
Calyx lacinia lanceolata longitudine Corolla. Corolla parva

4 Cordata B. foliis cordatis ovatis
multinervis integerrimi Lin. Mant. 480. Lin
V.

Genista africana fuit spicata, rufa foliis nervis, flore luteo set
olentlande Tourn. For. h
Thef. I. p. 30. t. 24. fig. 3.

Habitat ad Cap. b. sprei

Ram. trigredi purpureo-fusco glabi subaggregati angulis acutis. Folia
semiamplexicaulia, minime reticulata, veno obscuro, unites novem
nervis, in acuminere pungente deponentia glaber rara, margine edentula,
merutis scabia, sequipollitana. Flores terminales 4-5. pedunculatae
Caulex glaber lacinia lanceolatis attenuatis longitudine pere corol
la. Vexillum sericeum

carthaginensis Cnephia Pfeifferi Coleolis obtusata Lin. S. V. pag. 642. Gaugu
Phakelis Alcedoas Coral arbor polypophyllas, foliis dunonibus non profusa
Platt alm. 293 - t. 214. fig. 4.
Habitat in américa calidore.

1 cnicifolia Boronia foliis sublinearibus acutis vellosis, capitaliis terminalibus ^{subtus} Len. Am. Ac
6 pag 92. n. 29 * S. V. pag 642.

Genista africana, cnicifolia, floribus parvis luteis in capitula congestis

Praj Suppl. 10. 9.

Habita ad P. bono pte^t

Tubex parvus fabr vellosus. T. olea alterna, parva, ovato-lancearia crenata
supra glabra, subtus vellosa, marginè revoluta. Capitula terminalia
fusiformia, floribus parvis Len. Ann. L. i.

In mea rami spiciformes foliorum ex dñe o. Verete super se cineris. Folia
vix semiunguiculata ovato-lanceolata inferiora latiora, subtus e peli
longi cornuti ad petioli cineris. Flores superne ^{parte} et axillæ spiculæ conferti in
formam capituli oblongi. Calyx siccis laevius longitudine rotollo

Rami aggregati verticillati, super se vellosi. Dolia sessilia sublanceo-
la, semi pollicaria, lanceo-lanceolata, idique glabra, externe nitida
laeva, etc. Flores 3-4 terminaler in capitulo, hispidae spinos. Legumi
no longitudine calycis herb. La March

Cum in mea Rama de cinqua differtum sit hujus generis si modo mea eadem au-
quod non dubito Cennoi

Cineari-
2 Trinervia B. foliis lanceolatis Trinervis integrerimis Lin. - S. V. culatis pinki
floribus terminalibus pedunculatis & theopictis, rufi angusto et minore folio Platten. alm. 1510

8. 297. f. 4.

Habitat ad C. b. sp. 5

Rami angulati, purpurascens juncei longiores quam in specie
derile dichotome diripi. Sola stipula angusta, polliciana rigida
pungentia, cum nervo marginalebus quinque nervis. Pedunculus
terminalis quinque sub flore parum exasperatus. Palycalyx brevior
calyx glaber, laciniis lanceolatis attenuatis rigidis corolla brevi-
bus pungentibus corolla utra reliqui

plane plegua?

3 lanceolata B. foliis lanceolatis multinerviis integerrimis. Lin LV
ovato- floribus capitatis (cru)
genita africana frutescens, rufi nervosae foliis Tournet J. R. H.

p. 644.

Spartium africanum frutescens, rufi foliis caulem ampleante
Com Hort. 2. p. 195 T. 90.

Endex Othequeur, foliis rufi, floribus papilionaceis senicea canescens
folia villosa Plein. aln. 159. T. 297. Fig. 3.

Habitat ad Cap. b. specie

Rami dichotomi ramosi Verdes, & cicutati, superiores hispidae. Solia
fusca vix prolixaria in acuminis pungente attenuata nervi undicim
proter marginales utriusque subtus magis conspicui glaberrima supra
lancea. Flores in capitulo terminali aggregati sepalis plures. Calyx
reflexissimi, lacinia seu lanceolata cupido deflexa figura foliorum
modo angustiora, corolla breviora. Petalum canna et alo extus
seniceo villosi.

metta 8.

Crenata Bob. foliis cordatis multinevris denticulatis. Lin: Spec: pl: p: 994 &
Trinitate & Othopea ex Leguminosar, foliis rufi majoribus in ambitu punctulis
fimbriatis Platan. alm: 159.
Planta leguminosa Othopea, foliis rufi Brag: Cat: 69. t. 28.

Habitat in Othopea

Rami sub drostone ramosi & linea a costa foliorum decurrente angulati:
adspersi pilis longis ranunculosis. folia amplecticula, rigida membranacea
pollicaria vel ultra, glabra, venis copiose reticulata, nervis & n. nervosa
nervis adscendentibus apice mucrone pungente terminata, punctulis
nervo margine denticulata. Racemus terminalis bipollicans; flores
copiose approximati. Calyx pilosus scutellum velloso fereum
dentes calycis corolla brevioribus acuminatis

et opolitorum

confidit