

Browallia

1. Demissa B. pedunculis unifloris calycibus hispatis axillantibus
2. erecta B. pedunculis unifloris multiflorisque subterranalibus cyl.
cabris glabriusculis

Diffoja Brownii

Habitat Limo Dombey Herb. Thouinii 4

Caules basi ramosi, rami simplices diffusi, spathamai dultra, glabri. Solia petro lata, unguiculata, ovata, acuta, glabra, avenia, enervia, remota. Flores Ver minales, vellopi. Affinis ericita

clata 13 pedunculi unifloris multiflorisque Len. Speci: pl. pag. 880 &

Habitat in Peru

Caulis exsicca ramosus & ex rameo ramosus adpersus. Ramo axillaris
ramosus simplices floriferi foliis dimidiis longioribus. Solea petiolata
alternata, ovata tipolligera, nervosa, indecora ^{vel} glabra vel
nudata. Pedunculi in ramulis ad apicem foliatis, terminales
caulis ramosus. Caducos glabriusculi nervosi floriferi tubulose
fructiferi obvoluti laevius lencioribus obtusis.

menalebius

calyculis glabriusculis pubes

Demissa B. pedunculus unifloris Hort. Upf. 1797 Hort Cliff. 318

Habita in America australi Panama C
dulce minor

Similis etata at rami longiori folia remota pedunculi acilla
res. Calyces hispiti fructiferi oblong cato oblongi hisp' rot
angustiores breviores

calycibus hispiti at illanibus

alienata 13 foliis super non basi oppoſitis, flaminibus duobus longitudine corolla
Lin. 1. V. pag. 572. Bell. Diet. et 68.

Habitat

O

non vide est Rullio paniculata

Kuellic