

Bunium

1. majus B. foliis caulibus angustis, involucrio universalis nullo, fructibus curvatis
acuminatis, stylis persistentibus
2. bulbocastanum B. foliis uniformibus, involucrio polyphylo, fructibus subglobosis
cum apice crispatis, stylis reflexis deciduis

magus B foliis caulinis angustis, involucrio universalis nullo, fructibus
ovatis acuminatis, figulis persistentibus Gouan illustr. p. 10.

Habitat in Europa Austriaci

Radix ut in sequente, Caulis subulatus teris basi et geniculis interdum
vellosis ramosis. Folia radicalia apice petiolatim tripinnata
pinnis trifidis ^{concoloratis} ^{6-9-4.} pinnatim incisus lateribus et brevioribus quam
caulinis. caulinis linearibus attenuatis. Umbello laterales
et terminales. Involucella dimidiata, folioli 3-4. subulatis
fructus ovatis compressi acuti

Bulboristanum Bunium involucrio polyphyllis, caule basi recto flexuoso
Smith. fl. Brit. pag. 301. fl. Dan. 7. 220
Bulboristanum Dod. pempt. 334.
Bunium magus Ger. em. 1064
Bulboristanum alterum caule firmiore Barl. G. 244

permelum S. petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris, foliolis ternatis
lineariibus subacutis petioli longitudine lina

~~Plumbea~~
Bulboea stanum Bunium. ~~Cent.~~ fl. Don. 1220

Nucula Terrestri Cotel. hist. 429.

Bulboea stanum magis, folio apii Bauh. pin. 162.

Habita in Germania, Anglia, Gallia, Saxonia &

Boetuberosa. Caules plures pedales et ultra teretes striati pa-
rum ramosi. Folia triplicato pennata pinnis linearibus
angustis pinis. Umbellae laterales et terminales. Involucra
pentaphylla fructus subglandulosi apice tumidi & uncinati.

minus B. foliis uniformibus, involucri polyphyllis, fructibus subglandulosi
apice crassioribus, stylis reflexis & eisdem gremio
alligatis. pag. 10.

flexuosum Bunium involucri subtriphylla, caule basi aphyllis attenuato flexuoso
Smith. fl. Brit. pag. 301.

Bulboea stanum minus Gort. emac. 1064

B. Bulboea stanum Curt. fl. lond. fasc. 4. Tab. 24.
an eadem ac minus

aromaticum Baniam involuellis triphyllis Lin. Man. pag. 2104

Ammi alterum femine apii

Ammi odor origani Bauh. hist. 3. pag. 25

Ammi Vertum creticum Tabernom. hist.

Habitat in Creta Syria

Caulis erectus laxis, alterne ramosus. Folia can. curvi, supra de
composita: folioli laciniis filiformibus lobis. Umbella lon
gus pedunculata, striata: radius 10 f. 12. umbellules breves radius
totidem. Involucrum puberulophyllum brevissimum subulatum
involucella 23. phylla longitudine umbelle. Petala aequalia.
Semina ovata, minuto Touli sive siabrusculi Lin

- seminebus ovate apice
craspe

m. h. ignotum