

Cacti

1. lebanotis C. foliis bipinnatis: foliolis linearibus acutis multifidis, seminibus ^{costatis}
2. monfroi C. foliis supraeicompositis pinnatis multifidis, seminibus oblongis ^{laevibus}
3. odontalgia C. foliis supraeicompositis radicalibus villosis canis, caule ^{subaphyllo} seminibus laevibus
4. panacisfolia C. foliis pinnatis ternatisque, foliolis oblongis crenatis ^{seminibus} ^{hispidis}
5. sicula C. foliis ^{hispidis} bipinnatis: foliolis linearibus acutis ~~simpliciter bifidis~~ involucri involucri ^{que} ramosi seminibus costatis appressi

peucedanoides *Cachrys*

Cachrys semina lavi fungosa, foliis pinnulatis Monf. ~~tab.~~ Umb. 62. tab. 3. fig. 1

Cachrys *peucedanoides*

Desfont. fl. Atlant. pag. 250

Habitat in arvis Algeriæ Desfont. 4

Folia quadripinnata: pinnae lineares, angustissimae, pollicares, nudae, stipulae
inermes: foliola et pinnae primariae basi aurata foliis bipinnatis. Folia
glabra

Cachrys?

Cachrys actua angelicae foliis cyphodeli radice Tournef.

Habitat in Breta herb. Mus.

Caules fere ceteri, glabres, consistit fere pennis cygneis. Folia suprema opposita, ternata, singula quinato pennata: pennulae crassa acuta, obtuse serrata, mucronata, glabra. Umbellulae apertae. Semina oblonga, unguiculata, mucronata, sulcata dorso convexa, acuminata.

Cachrys:

Libanotis apii folio, semine aspero Bauh. pin. 157

Cachrys cretica, angelico folio, Asphodeli radice Tournef. Cor. pag. 23.

Habitat in Creta herb. Tournef.

Caules crassissimi perno asperis, subternatis, glabris pilulis. Tolia ter nata, penna
ta, tripura: foliola inferiora subpennata: penna oblonga, obtuse serrata, ^{profundeque} pelli-
cans, sessile, glabra, fructus subinacerrimis. Involucrum subnerviophyllum.
Umbella abortiva: Involucella plura. Semina singula oblonga, curvata, ai-
ta, fere unguiculata, fusca, squa sulcata, convexa, feti fissi hesta.

Cretica Cachrys

Habitata Creta herb. Turc.

Caulis e linear decurrentibus, ^{fusillis} subangulatis, glaber. Folia petiolata, inferiora bipinna
ta, superiora pennata: pennula (obovata, oblonga vel lanceolata, grosse serrata: serrati
o mucronata, glabra. Lmina ovato-oblonga, unguiculata, acuminata, fusca,
setis hispida

Libanotis apii folio semine aspero Bauh. pin. 157.

Echinophora aphroditi radice nigricante et angustiore lucido angustiore folio.

Trum. feli. ap. fratrem. 15

Cretica Cactoy: foliis bipinnatis; folioli lanceolatis serratis seminebris-
fulcatis Cusperi La. munt. Encycl. 1. p. 252.

Cactoy: *cretica* angelica folio apphodelinadiice Tournef.

Corol. 23.

Habitat in Creta

non vidi

taunica Cactrys: folius bipinnatis: folioli linearibus acutis, serratis
peltatis tuberculatis Wilden: spec: plant pag. 1410.
Habitat in Tauna et Sibiri

non vidi

Libanotis Caehrys foliis bipinnatis: pinnis oppositis linearibus subpungentibus seminibus
falicatis glabris.

+ Caehrys Libanotis foliis bipinnatis: foliolis acatis multifidis, seminibus sulcatis
laevibus Lin. Sp. Pl.: plant. pag. 355: et Lup. Bauhag. monf. 105: quod
ad insignitatem pertinet.

Habitat in Sicilia

+ Caehrys semine lungoso falicato plano minore, foliis peucedani, angustis
Mont. hist. 3. p. 267. l. 9. v. 1. fig. 6

pubescens V. foliis ternatis utraque pubescentibus panicula trichotoma
bracteis longitudine florum calycis

Pflanzl. Ind. ex Her. Zeyl. pag. 195. n. 415. fide herbarii

Hermanni

Habitat in India Orientali in La Mart. 5

Rami tetragoni pubescentes.

Solia petiolata opposita, ternata: foliolo ovato, attenuato, ^{lespica, bipolita}
+ Care, lateralibus, supra tenuiter secundum nervos lineata subtus costato
venosa pubescentia, integerrima, supra glabra ^{subtomentosa} panicula
ramum minorum

Panicula terminalis, magna, dichotoma: folium ter
natum sub prima trichotomia demum dichotoma
florescens bracteis opposita oblongis sessilibus obtuse longitu
dine calycis. flores sessiles alterni, nullus in dichotomia

Calyx campanulatus, 5 dentatus.

Corolla calycis duplo longior extus tomentosa

Bractea magnitudinis repens tetrasperma

1-2 monifoni Cachrys. foliis supra decompositis pinnatis multifidis, seminibus lori-
bus glabris

Cachrys femina fungosa, lori, foliis fernulaceis Monif. umb. 62. tab.

B. 49. 1.

Cachrys libanotis. foliis supra decompositis, foliolis acutis, seminibus
fulcatis loricibus Geacan illustr. pag. 12.

Cachrys monifoni: foliolis linearibus, extremis binis aut ternis, fructibus
femivatis, loricibus, utrinque rotundatis Allegorie Auct. pag. 23.

Cachrys longata: foliis supra decompositis, fernulaceis laciniis pinnatis
brevibus, seminibus loricibus La Marti Encyclop.

Habitat in Hispania, Gallia australi, Italia

Caules striati, teres, glabres, ramosis. Rami oppositi, terni vel quater-
ni.

Folia quadripinnata: foliolis angustissimis

Seminibus oblongis, valde fungosis, unguicularibus, glaberrimis
absque costis elevatis.

humilis *Bachnys*
~~bracteata~~ ~~fruticosa~~ ^{1^o pedunculorum} foliis inferioribus bipinnatis, penam linearibus acutis
 superioribus oblongis tridentatis integrisque
 Habitat ad littora maris regni Marocani Da Schous boe. Crispa
 Caulis flexuosus fenuatus glaber. Folia petiolata alternata
 pinnata bipinnata foliola opposita pinnis linearibus parvis inter
 gro vel bifida laciniis divaricatis obtusiusculis cum mucrone.
 pedunculi laterales frequentes alterni elongati in medio
 foliola duo opposita interdum tertius versus versus umbellam oblongam
 obtusa interdum ^{unquidam} tridentata dentibus lateralibus parvis
 recurvis. Umbella composita. Involucrum pentaphyllum
 folioli lanceolati radius duplo brevius. Radius octo involucri
 linearis

petioli vagina
 et estinata
 longitudine
 foliorum

~~ex huius generis~~

^{foliolo}
~~cula~~ *Cachrys foliis bipinnatis*: foliolis linearibus acutis semisulcatis hispida Lin. Spec.
pag. 355. * S.V. p. 280

Hippomarathon eradicum Bauh. Prodr. 76. Bauh. Pin. 147.

Hippomarathon ficulium Boerh. fig. 37.

Cachrys semine fungosa sulcata, affinis, foliis pectoreo Catiuseulis Monf. h. 3.
pag. 267. f. g. t. 1. 2. fig. 3.

Habitat in Sicilia, Africa

Foliola linearia. Folia suprema opposita. Umbella univocalis terminalis, ses-
sili, involucri involucrique ramosis. Reliqua umbello pedunculato,
involucri involucrique simplicibus. Semina crassifolima, sulcata, hispida
De Lin. Spec. l. c.

monjoni C. foliis superindecompositis fetacis multifidis, seminibus lobatis

Cathrys ~~monjoni~~

monj. umb. Tab. 3. fig. 1.

Cathrys foliolis lanceatis extremis binis aut ternis: fructibus
semiovatis lobatis utrinque rotundatis. Her. all. auct. pag. 23.
Habitat in Italia, Hispania, Aegypto australi.

Caulis erectus striatus teres glaber pedalis et ultra ramosus; rami
oppositi terni vel quaterni. Folia quadrupinnata foliolis
angustissimis. Fructus oblongi valde fungosi unguiculose
glaberrimi absque costis qua nota a Libanotide distingui
tur cum illa a plurimis confusa.

Cathrys libanotis foliis superindecompositis, foliolis acutis, semi
nibus sulcatis lobatis Youan. ll. pag. 12.

Odontalgia \odot foliis radicalibus supra decompositis tomentoso canis, caule nudo
umbellifero, seminibus cortice feberoso Corusimo Lin. Suppl. 1 Pl. 4 1. V.
pag. 200

Pachys odontalgia Pall. N. 3. p. 720 V. G. fig. 1. 2. 3.

Habita copiose in desertis limosis aridissimis inter Wolgam et Taurum
Caulis erectus strigatus, fere triquetramus puberulus ramifera
rami dispersi fructu umbelliferi. Folia radicalia terna
quoad bipinnata villosa incana pennulis multifidis incurvis
nulla fere in caule nisi sub ramis stipulae floribus ^{pluribus} multifidis
involucra decidua radii universales 4. 6. pariter flores
flavissimi fructus \odot lebanotidis

Cachrys

panacis folia
ifolia Cachrys

hirsuta

foliis pinnatis. Ternatisque: foliolis oblongis crenatis, seminibus tomentosis

Panax ficulium ebul folio Boicon.

Panax ficulium folio ~~hirsuto~~ semine hirsuto Boicon: plant. sic. rar. pag. 1. Tab. 1.

Cachrys ungarica panacis folio Tournef. Inst. R. 4. pag. 325.

Legi in Castilia nova et ~~in~~ Barbana minus frequens &

Caulis tripedalis striatus, canescens, teres, fistulosus.

Folia radicalia pinnata plerumque quina, caulina ternata. Soleola oblonga, proflexa, magna, crenata, extrema subconfluentia, extrema tria subconfluentia, crenata, venis villosa, scabra, subtus pallidiora, lateralia basi altero latere obliqua, terminale reliquis major.

Petioli striati, ali etiam nervi costales.

Umbello terminales, conicava, trid in radiato pariales conformes

Involucrum

Involucra 7-8 phyllis, foliolis linearibus subulatis, reflexis, villosis,

radius multoties brevioribus. Involucella simplex, capitofolialis capitofloribus

Petala minuta, alba.

Semina oblonga, hirsuta, incana, parum suberosa, Styli binii, reflexi, perispermici, seminibus breviores.