

Cactus

Parasiticus G.

Habitat

herbaris

Rami verticillati, quinque. Flores sepales alterni, parvi.

nobilis *C. quadecimangulata* Len. Mont. 243 \*

~~Habitat~~ in Mexico

nobilis



parafiticus & ~~ependyses~~ stratus mutius

Delectatur cum nil nisi videri ~~ependyses~~ epidentis est quod in herbis hinc  
figura pleuriscis hinc ceteris. pleuriscis. ~~ependyses~~ epidentis monstrat asperitatem



mammellari P. subrotundis Yecker Tuberculis ovatis barbatis Kunz. l.

<sup>p.</sup>  
Tucoides f. Tucis americana sphaerica tuberculata lactescens  
flore albo Comm. bot. 1. p. 109. t. 55. Bradl. f. 3.  
p. 11. t. 29.

Tucoides f. melocactus mammellari glabra sulcis carens  
fructum suum undique pendens Pluken. alm. 140. t.  
29. f. 1.

Echinus melocactus - minor lactescens, tuberculis f. mammil-  
li majoribus Herm. parad. 136. t. 136

Habitat in America calidiori in partibus t

Melocactus <sup>Q</sup> subrotundus quatuordecim angularis Lin. p. V

Melocactus <sup>Q</sup> subrotundus occidentalis Bauh. pin. 3. p. 4

Cereus melocactus Claf. ex ot. 91. t. 92. Bradl. Juc. 4. p. 9. t.

<sup>32.</sup>  
β Cactus subrotundus 14 angularis: spinis longis recurvis albidis  
Mull. Dict.

V. Cactus subrotundus 15 angularis: spinis latis recurvis Cereus  
nervis Mull. Dict.

α Cactus subrotundus 15 angularis, spinis erectis, angulis in  
fueram contortis Mull. Dict.

Habitat in America meridione, Caribis &

Lesquipedalis diametro pedali et ultra angulis ad stellatum  
aculeatis. Capitulum demum ruffum exferens palmarum  
ve stelli spinosi multiradiati basi immixta lana  
albida



Nygmow *C. globosa* flore duplo minore.

Habitat in Brasilia Commerson Thour

Planta magnitudinis juglandis majori globosa. Stellis  
multiradiatis <sup>punctis</sup> fuscis nonnulla longitudine  
in fusis planta basi glabra. Flori bipollicari ~~est~~ en  
apice globi erectus <sup>est</sup> fuscis ~~est~~ lanatus intermedium  
ferris setaceis fuscis petala glabra mucronata



*Papaya P. erectus* *Mianzulani*

*Gaiqu*

*Habitat.*

Tetragonus P. erectus quadrangularis longus, angulis compressis

Lin. b. V. p. 4

Caulis erectus minor, fructu puncto, costarum numero variis

Hern. p. 117.

Habitatio Curacao, America calidior.

pentagonus.  $\odot$  erectus subquinguanzulari longus adserulatus Lin - 1. v  
Hot. Cliff. 1824  
Habitat Carthago 5

non vidi



hexagonus Q. erectus sexangulus longus: angulis distantibus. Lin 1. ✓  
p.

*Cereus punnamiensis* A. N. S. p. 393. 7. 7. 0.

Melocactus monotonos, flore albo, fructu atropurpureo Plum.

Spec. 19. c. 191?

*Cereus erectus maximus americanus hexangulus*, flore albo  
radiato Bradl. succ. 1. p. 1. 8. 1.

Habitat punnami

heptagonus  $\odot$  erectus oblongus septemangularis Hort. Cliff. 1018  
Habitat in America.  $\dagger$

peruvianus. Cereus longus subdangulans: angulis obtusis Len. p. V.

Luphorbii abortivi effigie Lobel. ii. 2. p. 25

Cereus peruvianus spinosus, fructu rubro nuclei magnitudine

Bauh. pin. 45. P.

Habitat in Jamaica, Peru apricis aridis montibus 5



repandus. C. erectus longus octangulans: angulis compressis undatis, spinis  
lana longioribus. Arn. t. V

Cereus altissimus gracilior, fructu extus lacteo, intus nullo. seminibus  
nigris pleno Sloan Hist. 2. p. 150. New. chet. v. 14.

Habitat in America calidioribus

Canagrodus C erectus longus subnoemangulari: angulis obsoletis, spinis  
lana brevioribus. Hort. Cliff. 102.  
Habitat in Curacao 5

na. 22.

Royeni <sup>♀</sup> erectus articulatus novemangulans: articulis subrotatis, spinis  
canum oquantibus Lix. t. V  
Cereus erectus, fructu rubro non spinoso, lanuginoso. Herm. parisi  
115  
Habitat in America &



coqueombanus. Glengus decemangulatus, angulis obtusi spicis longis  
rectis Molin. bot. nat. Chil. p. 146  
Habitat in Chili

non radi

Tringulani & repens Tringulani L. V. p. Faigu. Act. helv

5. p. 268 & 2.

Melocadua americana repens Tringulus, flore albo, fructu violaceo

Plum. ii: 199. 200?

Cereus americanus Tringulani radicosus Bradl. succ. 1.

p. 4. t. 3. A. N. C. 1752. v. 9 app. 199. v. 10. fig. 14 A. N. C. 1754

v. 10. app. 349. t. 3.

Cactus debilis brachyatus aequali Triquetus scandens f. repens  
specimens brevissimi compositis Brown. Jam. 230. 1. p. 4. 83.

Habitat in Brasilia, Jamaica



grandiflorus C. repens subquinguanzularis Lin. t. V

Cereus americanus major articulatus, flore maximo nocte se  
apertente s. suavisimum odorem ferante Solth. hesp. 1. p. 133. Y.

<sup>134.</sup>  
Cereus gracilis scandens ramosus plenusque pentanzularis flore  
virgati atque fragranti A. N. C. 1752. v. 9. app. 177. Y. 11-12.

<sup>3.</sup>  
Cereus scandens minor polygonus articulatus Mill. u. Y. 90.  
Cactus scandens, angulis quinque pluribusque obtusi Hort.

<sup>Upl. 1217</sup>  
Habitat in Jamaica, Vera cruce &

Tubus corollae s. pollicari crassitie pollicis pelis longis  
hispidis basi squamosis. Diameter limbi ex parte ultra  
pitham non

Herm. no. 2. 20



flagelliformis P. - reverendissimi angulans Lin. f. V.

*Tricoides americanum* f. *Cereus minima* *Serpens americana* Plukin  
alm. 140. V. 150. pag. 6.

Habitat in America calidioribus  
felli parvis copiosis spinulis setosis flores 4-5 pollicares  
laterales purpurei

monileformis & articulato-prolifer, articulis globosis spinosis glomeratis. *Lin.*

*L. V.*  
Melocactis, ex plurimis globulis opuntia modo nascentibus;  
Spinosissimus Plum. spec. 20. 1798.

Habitat in America calidioribus.

~~Plum. spec. 20.~~

non vidi.



Opuntia C. articulato-prolifera Caxus, articulatis ovatis, spinis setaceis hinc  
L.V.

Ficus indica, folio spinoso, fructu majore Bauh. pin. 45. 0.

Opuntia vulgo herbariorum Bauh. hist. 1. p. 154. Mill. ic. 191.

Habitat in America, Virginia, nunc in Europa australi et

Barbarâ ubi pro sepius herbariorum utitur &

Articuli compressi varie magnitudinis obovato tuberculis  
lanatis setula sulphurea obtusa oblonga



Ficus indica C. articulato-prolifer, articulis ovato-oblongis, spinis setaceis  
Len. l. V

Cactus compressus articulatus ramosus, articulis ovato-oblongis  
spinis setaceis Hort. Cliff. 103.

Habitat in amenis calidioribus

*Tuna*  $\odot$  articulata-prolifer, articulis ovato-oblongis: spinis subulatis lin

L. V.

*Opuntia* major, foliis oblongo rotundo: spinis longis et validissimis,  
flore luteo. Sloan. hist. 2. p. 149. t. 224. fig. 1.

*Tuna* major, spinis validis flavicantibus, flore yellow Dall  
Calth. 396. t. 295. fig. 30.

Habitat in Jamaica, America calidore.

non vidi



Cochinillefer *C. articulato-prolifer*, articulis ovato-oblongis subincurvatis

Len. S. V.

*Sida* india major levis s. spinosa vermiculos proferens Plukin  
alm. 146. t. 201. fig. 303.

*Opuntia maxima*, folio oblongo rotundo majore spinulis nonnullis  
et innocentiis obtuso Moan. hist. 2. p. 152. t. 8. fig. 1. 2.

*Tuna mitior*, flore sanguinea, cochinillifera Dill. Elth. 399.  
t. 297. fig. 303.

Habitat in Jamaica et America calidioribus

non vido



*Cerasperium* Q articulato-prolifer, articulis cylindrico <sup>ntu</sup> verrucosis compressis hinc

p. v.

*Telus indiae* f. *opuntia* minor caulescens arbutula in modum  
ramis carentis, *Spinosoma* Pluken. alm. 147. t. 2. pl. fig. 3.

*Telus indiae* f. *opuntia* *Cerasperia* minima Comm. hort. 1. p. 107.

t. 56.

*Opuntia* minima americana *Spinosoma* Bradl. succ. 1. p. 5. t. 4.

Habitat in Cuneaco

Phyllanthus <sup>C</sup> prolifer ensiformi compressis serrato repandus Linn.

L. V

Phyllanthos americana, seu opis foliis longis Pluken. alm. 296.

N. 247. fig. 5.

Pennisolopendini foliis brachiato Dill. Elth. 73. N. 64. fig. 74.

Habitat in Brasilia Linnæo 5

*Seneciojuncus* C. caule erecto compresso, ramis oppositis bifariis compres-

sis, spinis setaceis Hort. Kew. 2. p. 155

*Opuntia seneciojuncina* Mill. Dict.

*Cactus seneciojuncus* Martyn. Hort. Cantabr. 1780.

Habitat in Jamaica 5



alatus, prolifer, ensiformis compressus crenatus Sw. prodr. p. 77.  
opuntia non fructifera Sloan hist. 3. p. 159. 2.  
Habitat in Jamaica &

non videt

pendulus P. pendulus ramis verticillatis Verticibus glabris muticis Sw  
prod. 77.

Vesicium

Novan bot. 2. p. 93. Tab. 201. fig. 2.

*Cajupha polyperma* Mill. ii.

Habitat in Jamaica Hispaniola &

Habitus visci. Rami remoti verticillati quibus tenues

~~non vidi~~



*Pereskia* P. caule arboreo tereti aculeis geminis recurvis, foliis lanceolatis  
ovatis Lin. l. V.

*Malus americana* spinosa, pedunculato foliis, fructu foliis, semine  
reniforme splendentes Comm. hort. l. p. 135. t. 70.

*Portulacca americana* latifolia ad folium ortum lanugine obdusa  
longioribus aculeis horrida Plukn. alm. 135. t. 215. fig. 6.

*Pereskia aculeata*, flore albo, fructu flavoefcente Plun. gen 35.  
Dill. Clth. 303. t. 227. fig. 294.

Habitat in America calidior, Jamaica, Margartha &

Rami teretes glabri. folia elliptica pollicaria alterna utraque  
actuata acuta integerrima pedunculi superne distan-  
tis alterni sesqui pollicares dentibus minus parvis remotis  
vilosis & tracheis deciduis



portulacifolius C. caule tereti arboreo spinoso, foliis cuneiformibus retu-  
fis Lin. l. V

Opuntia arbor spinosissima, foliis portulacis cordatis Plum. spec.

6. 2. 197. per 1.

Habitat in America calidioribus