

Cahile

Anata Bunias

Caule graeca filiqua *Anata* brevi Tournef.

Habitat in herb. Lus.

Caulis glaber, ramosus, laxis. Folia pennatifida, petiolata, tripollicaria: laciniis lanceolatis obtusis, integerrimis vel extrorsum remote serratis, suprema triplo.

Flores flavae

Oxydium M. foliulis angulatis, foliis tripartitis Lin. f. V. p. 5044 Spec.

pl. pag. 895. 7

Habitat in Aegypto

Species Buncades habitans. Caulis divaricatus racemis virgatis
foliis petiolata tripartita vel quinquepartita dentata
Capsula duobus articulis tetragonis. Flores lutei. An
nobis Buncas? Lin.

non vidi

Terapiacus Cathula
Cathula ~~terapiaci~~ foliulis ovatis lobis ancipitibus Len. f. v. Mart 1730

Cathula Terapiaci Lob. id. 223.

Enicla maritima Italica, flegua haste cuspide simili Bauh. pin.

⁹⁹
Habitat in Europa, Africa, a menis maritimis ☉

Caulis latus ramosis sulcatus uti tota planta glaber.

Folia petiolata carnosa, pentactifida vel obtusidantata
obtus. flores purpurei

~~Specimen ex India occidentali foliis petiolatis lanceolatis
triserratis vix carnosis flegua biarticulatis
acchulo infimo brevi absque auricula laterali
superiore subulato tetragono fructo an specie diversa.~~

ferratifolia foliis petiolatis lanceolatis serratis, foliulis subulatis
tetragonis

Specimen herb. haur bona

pennatifolia P foliis petiolatis lanceolatis serratis integerrimisque
articulo infimo ² pliquis ³ unauriculatis.

Habitat in India occidentali.

est varietas pennatifida vel Bumadi Calicuti hinc

bidentata
repanda

13. foliis petiolatis oblongis repandis ^{articulo inferiore} filiculis oblongis bidentato
superiore tetragonis canaliculata
Bunias aegyptiaca Dorsk.

varietas Bunias thakile

Symb. bot.

Habitat in Aegypto.

Caulis ramosis flexuosis glaberis. Folia carnosae obtusa
racemi terminales

varietas latifolia Kun

Cabule
Enicago

Bunias

Bunias foliulis ovatis lobibus ancipitibus Lin. I. V. pag. 603

Folia aegyptiaca Dorff. descr. pag. 121.
sinuata foliis carnosis, pinnatis, subdentatis Dorff. descr. pag. 121.

β. Cabule sive enicia marina latifolia Bauh. hist. 2. pag. 868.

Folia aegyptiaca Dorff. descr. pag. 121.

β. Caulis herbaceus, vane flexus, vereo, crassitie panno in feno,
glaber uti tota planta

Folia alterna, pollicaria vel ultra, oblonga, obtusa carnosa
in aequaliter crenato-sinuata, ^{undulata} cavena, basi in petiolum desin-
nentia.

Petiolum interdum longitudine folii

Siliacula biarticulata; articulus inferius obovatus versus apicem
utrinque dente obtuso; ultimus ovato-acuminatus, apice
compresso-ancipite, inferius duplo longior

Semen unicum in singulo loculo.

(An species differantur? haec a varietate alicuius singularis
foliis latis et indivisi qualem nunquam in his observatur.

pinnata B. foliis pinnatis filiculis oblongo ^{longioribus} subulatis acutis anticipitibus
4-fatis pinnata Torr.

Habitat in Aegypto
vide Symb. Bot.

icum Anthoxanthum spica unean, ~~prop. unean~~

3. Fl. Zeyl. 25. Sp. pl. p. 40. 2.

Habitat in India

anthoxanth. ind.

Reveris

myagroides 13 filiculis biarticulatis ancipitibus superne tonulosis,
foliis pennatis pinibus reflexis Len. Mant. 96. + S. V. p 603.

Habitat in Sibiria C

Caulis erectus bypedali lavi paniculato-ramosis. Folia
inferiora pennata f. bipennata latiora non carnosu
pinnis oblongis dentatis. Summa simillema sed angusta
lineana omnia habent pinnis ad egressum pennarum
deorsum reflexis. Racemi terminales longi pauci. flores
subsiles. Calyx oblongus. Petala purpurea. Inguis pedun-
culata. Pedunculo brevi rigido facie vixi appropinqua
to facie Myagri articulo inferiori cylindrico bivalvi
monospermo via dispermo. valvulis striata unica etara
tu. Superiori compresso subarcepi monospermus
obtusius utroque fuit auncula protuberante
notatus her