

Calicotana

1. nana C. scapis subappulso-pappis unifloris, foliis ovatis integerrimis
2. ~~uniflora~~ C. scapis lobatis glabris unifloris, foliis oblongis & lobis superiore
ferratis. ^{scapis vellosis subsifloris}
3. plantaginea C. foliis rhombicis ovatis ferratis margine pilosis. ^{scapis}
4. Fothergellii C. pedunculis scapiformibus unifloris, foliis spatulatis inte-
gerrimis. xx ^{caulescentes}
5. integrifolia C. foliis lanceolatis serratis, paniculis terminalibus
6. ovata C. foliis ovatis crenatis, pedunculis axillaribus geminis
7. persfoliata C. foliis persfoliatis, spatulatis sagittatis
8. pinnata C. foliis pinnatis

paralia C. ^{dentatis} ~~tormentosi~~ ^{dentatis} radicalibus petiolatis superioribus connatis, capsu-
lis tormentosi

Calceolaria paralia foliis oblongo-ovatis, ^{dentatis} ~~tormentosi~~ ^{dentatis}, superioribus connatis, radicalibus petiolatis: capsulis tormentosi. Cavan. ic. 5. p. 29. tab. 447.

Habitat Chili:

Caulis herbaceus, bi pedalis, erectus. Sola inaequaliter dentata, nervo longitudinali obscure violaceo, radicalia in petiolum attenuata. Pediculi dichotomi, pedicelli duo oppositi: pedicelli duo simplices in dichotomia: folia lanceolata sa sub duobus duo junctis. Corolla labium superius brevissimum; inferius versus faucem saepe angustatum

Composita 11. Palaeoloma foliis radicalibus ovatis cordatisque petiolatis bicrenatis, caulinis cordatis semiamplexicaulis fl. per. 1. p. 14. t. 20 f. 6. +

Habitat in umbrosis Chili

Hirsuta. ^{inferne in simplex axillaris} Cauli bipedalis, ~~simplex erectus~~ superne dichotomus foliosus. Folia radicalia ampla, obtusa integerrima, subtus albidula, venosae, nulla in caule nisi superne ad divisuras, integerrima. Pedicelli terminales et axillares, bis vel ter bifidi; pedicelli in dichotomia uniflori, saepe gemini, ultimi terni. Corolla lutea, lineis et punctis sanguineis variegata. St. ~~per. 1. c.~~ per. 1. c.

4 *Dotheyllia Calicolaria* foliis spatulatis integerrimis, pedunculis scapiformibus unifloris Hort. Kew. 1. p. 30. Tab. 1. & La Mart. T. En. pag. 52. fig. 1
Habitat in Tâpulis falk Landis B

Caules vix unciali, prope radicem subterri. Folia opposita
reticulata obtusa, supra pilosa vix uncialia. Pedunculi
terminales plantari vel gemini teretes foliis duplo
longior. Calycis lacina acuta apice inflexa. H. Kew.

^{narrow}
folia extrosum crenata
Calicolaria Dotheyllii foliis spatulatis crenatis, velopis. pedunculis scapiformibus
unifloris Pavan. ii: v. pag. 25. Tab. 422. fig. 1.

nondum

crenatiflora 9. Calceolaria foliis obovato-oblongis inaequaliter serratis & ubi
tomentis, labio inferiore corollae tridentato +

Calceolaria crenatiflora; foliis ovatis, parvis tomentosis: floribus
corymbosis, corollae tridentata. Cavan. ic. 5. p. 287. 446.

Habitat in humidis St. Caroli de Chile

Caulis sesquipedalis, subtomentosus, superne bifidus. Folia radica-
lia plura, late oblonga-ovata, basi versus attenuata, caulina
paucia oblonga, dus inferiora subpetiolata, superiora sessilia.

Pedicelli racemosi, uniflori. Calycis lacinis ovatis, acuta,
trinerviis: fructifero patentibus. Corollae luteae: labium inferius
maculis rubris variegatum; superius brava. Capsula chartacea
fulva. Cavan. l. 1.

St. Caroli

umbellatis. Cavan. ic. 1. p. 257. 441.

Calceolaria polyrhiza; foliis ovatis in pediculis alternatis: plerumque
pedicellis umbellatis.

Calceolaria subcaulis, foliis oblongis petiolatis subsessilibus,
cuneiformibus

polyrhiza

cana 8. Calceolana, foliis cuneiformibus tomentosis incanis integerrimis,
caule descendente, pedunculis dichotomis. +

Calceolana cana: foliis oppositis, confertis, crassis, lanatis, ovatis,
inferne attenuatis Caran. i. 5. p. 27. t. 443. f. 2.

Habitat in regno Peninsulari

Caulis bipollicaris simplex, basi d. folia approximata, oblonga
basi attenuata, densa tomentosa, duo ^{ramulorum supra reliquos} seorsus mediana pediculis;
sessilia, minor, oblonga. Pedunculus bifidus bipartitus, partiales
dichotomis, duo pedicelli duo in dichotomia, uniflori, folia duo sub
divisura. Corolla parva, tub. ca. Caran. l. c.

montana ~~Callaeolana~~ ^{inqualiter} foliis radicalibus obovatis ^{inqualite} dentatis rugosi nervis, pedunculis di-
chotomis

Callaeolana montana. foliis radicalibus spatulatis rugosis, tomentosis in-
qualiter dentatis Cavan. ^{ic 5} pag 24. ~~pl~~ 443. fig 2.

Habitat in Cordillera

Caulis saepe sesqui-pedalis, teres, rubescens, tomentosus, statura nudus, superne
divisus in pedunculos duos. Solia in petiolum attenuata, inqualiter
dentata, ad divisa sursum sessilia. Pedunculi bis bifidi: pedicelli uniflori.
Calycis lacina ovata, trinervis Cavan.

racemosa. Calceolaria foliis oblongis dentatis rugosis tomentosis, pedunculis
terminalibus bifidis, pedicellis racemosis +

Calceolaria racemosa; foliis ovatis, dentatis, rugosis tomentosis:
floribus terminalibus racemosis. Cavan. ic. 5. p. 29. t. 448

Habitat inter arbusta prope artem St. Caroli, & in portu vulgo
Dapado Chili & in insulis Malouianis.

Caulis herbaceus, 6 + 8 vel decem pollicaris, teres, tomentosus.

Folia plurima radicalia, basin versus parum attenuata, subsessilia

duo vel quatuor in caule, angustata. Pedunculi laterales bifidi
bifidi, biflori cum pedicello in medio unifloro; terminales bifidi pedi-

celli racemosi & unito in medio divisura unifloro. Calycis fo-
lacia villosa, trinervis. Corolla labium superius breve, infe-
rius ovatum. Cavan. l. c.

Calceolaria racemosa; foliis ovatis, dentatis, rugosis, tomentosis, pedunculis
terminalibus bifidis, pedicellis racemosis
racemosa

pinifolia & foliis linearibus margine revolutis, pedunculis bifidis, pedicellis un-
follatis

Calceolaria pinifolia: foliis linearibus, angustifimis, confertis, limbo revolutis
Cavan. icon. v. pag. 26. Tab. 448. fig. 2

Habitat in Cordilleris Chili.

Caulis vix pollicaris, propè basin sapa diviser. folia frequentia, approximata,
opposita, pollicaris vel parum ultra. Pedunculus caulem verumtaxam,
superne ad diviseram folia duo fructura caulium modo minor, 6
pollicares et ultra. Pedicelli 4^{or} duo uniflori breviores, duo biflori
folium ovatum acutum ad diviseram. Corolla lactea labium superius mi-
nimum Cavan.

montana b. Calceolaria, ^{sub} caulis, foliis obovatis inaequaliter dentatis rugosis
incanis, pedunculis dichotomis. +

Calceolaria montana; foliis radicalibus spatulatis, ^{tomentosis} rugosis, inaequaliter dentatis Cavan. c. 5. p. 27. t. 443. f. 3.

Habitat in Cordilleras.

Folia radicalia, ^{plura} capitula; sesquipedalia, ^{terres-} terre; subscen-
tomentosus, stata nudus, bis bifidus. cum pedicello solitario uni-
floro in secunda divisione, lateralibus quadrifloris. foliola ^{duo} ovata.
sessiliba sub divi singula divisione. Calycis laciniis ovatis,
trinerviis. Cavan. l. c.

montana
~~Calceolaria foliis obovatis inaequaliter dentatis rugosis incanis
pedunculis bifidis dichotomis~~
Calceolaria montana; foliis radicalibus spatulatis, rugosis, inaequaliter dentatis

pini folia s. Calceolaria subcaulis, foliis linearibus, ^{margine revolutis} pedunculis & capi formi-
bus trifidis, pedicellis umbellatis +

Calceolaria pini folia; foliis linearibus angustis binis, confertis, limbo
revolutis. Cavan. ic. 5. p. 26. t. 442. f. 2

Habitat in Cordilleras Chili 7

Caulis six pollicaris, prope basin saepe divisus. Folia frequentia,
approximata, pollicaria vel paucis ultra. Pedunculus termina-
tus, bipollicaris et ultra; apice folia duo structura cauli nonum
sub umbella: pedicelli quatuor, duo intermedia uni flori, latera-
les biflori: foliola duo ovata ad divisuram. Corolla lutea: Labium
superius minimum Cavan. l. c.

polyhiza 4. Calceolaria subcaulis, foliis lanceiformibus subserratis, ^{acutis} pedunculis
scapiformibus, pedicellis umbellatis +

Calceolaria polyhiza; foliis ovatis in petiolum attenuatis: floribus
umbellatis. Cavan. ic. 5. p. 25. t. 446.

Habitat in America meridionalis parte vulgo Desceado locis humidis
et in pulis & altilandis

Radix obliqua. Caulis vix pollicaris, simplex. Folia approximata,
oblonga, basi attenuata, remote obscure dentata vel integerrima.

Pedunculus tri vel quadri pollicaris; a pice foliis & pedicelli quin
que, inaequales, plerumque: ^{unifloris} folia duo ^{parva sessilia} ~~bracteae~~, ad bas sub umbella.

Calycis laciniis ovatis, trispartitis, sub villosis. Corolla lutea, rubro
punctata: Labium superius breve, concavum cuneatum; inferius

ferè pollicare, cartilagineo, apice ascendenti. Capsula conico,
bisulca; bivalvis, bilocula Cavan. l. c.

1 nana C. Scapi uniflori, foliis ovatis integerrimis Smith. Ic. pl.

1. pag. 1. tab. 7.

Habitat ad fretum magellanicum 4

Folia ad radicem congesta, plurima obtusifolia, subavenia
enervis oculo armato levissime pubescentia, breviter
petiolata. Scapi plurimi biunciales, uniflori erecti
teretes subpapuloso scabri. Flores magni ratione plantae
scari. Smith.

subpapuloso scabri

Racemosa uniflora foliis ovatis integris in petiolum attenuatis
radicalibus, scapi uniflori, tubo corollae maximo pendulo Ca
na arb. t. En. pag. 52.

eadem uniflorum

Tothergillii 3. Calceolana foliis obovatis subcrenatis, ^{supra} ~~pedunculis~~ ^{sub} pilosis, pedunculis & scapiformibus unifloris.

Calceolana Tothergillii, foliis spatulatis integerrimis, pedunculis & scapiformibus unifloris Hort. New. 1. p. 30. t. 1. La Mart. ^{manth.} illustr. 1. p. 52. t. 15. f. 1.

Calceolana Tothergillii, foliis spatulatis, crenatis, villosis: pedunculis & scapiformibus unifloris Cavan. ic. 5. p. 25. t. 442. f. 1.

Habitat in insulis Falklandiis B.

Caules vix pollicares, prope radicem ^{sub} divisi, nisi perascentes. Folia in petiolum attenuata, vix pollicaria, basi connata, extorsum obscure crenata. Pedunculi terminales, solitarii vel gemini, tunc tripollicares, teretes, purpurascens, villosi, glutinosi, Calycis laciniis ovato, acuta uniflori; folium parvum oblongum interdum versus medium: Calycis laciniis ovato, acuta. *

^{diandra}
Dichotoma V. foliis oblongo ovatis serratis, spicis terminalibus et Dichotomis elevatis

Verbenae dichotoma: diandra spicis longissimis terminalibus at et dichotomis, foliis ovatis oblongisque serratis fl. Penn. 1. pag 23. Tab 34. fig. 6.

Habitat in sylvis Quehens

Caulis suffruticosus, tripedalis, erectus, inferne teres, parum ramosus: rami bracteati; dichotomi, superne secundum articulationes compressi: articulationibus his pedis. Folia opposita, petiolata, acuta, venosa, subtus hispidula: serraturis acuminatis. Spicis pedales, solitane, arcuata, subulata. Flores adpressi. Bractea subulata longitudine calycis, persistenter. Calyx prismaticus, squae dentulatus. Semina duo, ex uno striata

foliis oblongo ovatis serratis, ramis hispidis bracteis
concoloratis longitudine calycis

prope Jam.

nana 2. ^{subcaulis} Calceolaria foliis oblongo-ovatis subintegerrimis, ^{pedunculis - scapibus} scapis unifloris
mibus unifloris

Calceolaria uniflora; foliis ovatis integris in petiolum attenuatis radicalibus, scapis unifloris, calice corolla maximo pedulo ^{Comant} ~~Smith~~
illustr. 1. p. 52. t. 15. f. 3.

Calceolaria nana; scapis unifloris, foliis ovatis integerrimis Smith
icon. ined. 1. p. 1. t. 1.

Habitat ad fratum Magellanicum 2

^{opposita, conferta} folia ^{radicalia plura}, vix semipollicaria, petiolata, ^{vel sessilia} integerrima vel
caulorum leviter denticulata in eadem planta, oculo armato vix pub
glabrescunt, arearia, subtus obscura nervosa. ^{Pedunculis} scapi solitarii vel plures,
bipedlicares vel parum ultra, teretes, erecti, ^{ad ascendentes}. Flores
magni, flavi.

Caulis unguiculatus vix semipollicaris, decumbens.

plantaginea 1. Calicolaria foliis ^{rhombicis} ~~rhombicis~~ ^{denticulatis} ~~ovatis serratis~~ margine pilosis,
scapis subbifloris.

Calicolaria biflora; foliis rhombicis ovatis dentatis, scapo nudo bifloro
Lo March. illustr. 1. p. 92

Calicolaria plantaginea; foliis ~~rhombicis ovatis serratis~~ scapis
paucifloris, foliis rhombicis serratis Smith. G. ined. 1. p. 2. t. 2.

Fovelliana scapiflora; foliis ovatis serratis, scapis inaequalibus
unifloris Fl. per. 1. p. 13. t. 10. f. 6.

Habitat ad fructum magellanicum et in alpidibus Peruvia 4.

Folia plura, basi in petiolum ^{en} brevissimum attenuata, pollicaria
inaequaliter denticulata, basi versus integerrima, juniora prosetina
margine pilosa, nervosa. Scapi solitarii vel plures, stipe inferne
glabri per subsythamam; perpetuas teretes; perpetuascentes; inferne
glabriusculi, superne ^{velero} piloso-conescentes, unifloris vel bifloris.
Calycis laciniis oblongis, villosis. Corolla lutea.

~~Forcellana~~

183. Inor Flora peruviana sui Ino und Oltuniqua apud
Inor Oadit, Cario et per. maatra petas und liden
p. roy foudi ditta Syblid iden 4 id et mitte d. j. Wouque
Saluam. moqit. tel puchos.

6
oblonga [12. Calceolana foliis oblongis serratis petiolatis, pedunculis trifidis
ramis tri-8. sex floris, caule simplicissimo. +

M. 177.

Calceolana oblonga; foliis oblongis serratis, pedunculis trifidis, corol-
lis punctatis fl. per. 1. p. 15. t. 24. f. 6.

Habitat in Panatahuas nemoribus.

caulis, ramis,
Caulis herbaeus, sesquipedalis, erectus, teres. Folia breviter petio-
lata. Pedunculus terminalis, trifidus, ^{es} partialiter simpliciter
semel vel bis trifidi; pedicelli uniflori. Calyx hirsutus. Fl. per.
t. c.

57
punicia 13. Calicolana foliis ovalibus serratis, caule repente Fl.

per. 1. p. 15. t. 24. f. a +

Habitat in Panatahuas nemoribus

Hirsuta: Caulis herbaceus, ramosus. Rami erecti. Folia ~~hirsuta~~
supra glabra. Petioli breves. Pediculi terminales bifidi, 7-8 flori.

Septem-velo flori: pedicelli umbellati, inaequales. Corolla punicea, glabra Fl. per. t. c.

per. t. c.

cana ^{integerrimus} C. foliis oblongis tomentosis incanis, caule ascendente, pedunculis dichoto-
^{mis} *Calceolaria cana*, foliis oppositis, confertis, crassis, lanatis, ovatis, inferne alba
nucatis Baran. Ic. v. pag. 27. tab. 449. fig. 2.

Habitat in regno Peruviano. 4

Caulis bipollicaris, simplex in pedunculo comuni ^{elongato} *caespitoso*; basi dicam
bens, secundum figuram pilosus. Folia ^{opposita} *approximata*, basi in petiolum alba
nucata, dense tomentosa, duo sessilia *pauculem* supra reliqui *minor*
sessilia. Pedunculi *periales* dichotomi, pedicelli duo in dichotomis uni
flori, folia duo sub dichotomis. Corolla *lutea* parva

Scabra 14 Calcicolana foliis oblongis lineatis dentatis hispida, pedunculi axillaribus terminalibusque solitariis unifloris +

Habitat Calcicolana scabra; foliis oblongis venoso-lineatis dentatis, caule aspero Sl. Per. 1. p. 19. t. 29. f. a.

Habitat Pen in praeceptis

Caules plures, suffruticosi, tripedales, virgati, teretes superne disto-
tome divisi, teretes, hispida scabri, purpureo ferruginei. Folia appro-
ximata, subsessilia, patentia, rugosa, secundum venas lineata,
marginibus revoluta. Pedunculi longitudine foliorum. Sl. Per. 1. c.

punctata 15. Calceolaria foliis oblongo-ovatis biserratis glabris punctatis, pedun-
culis axillaribus terminalibusque, caule fruticoso + corollae lobis subaequalibus,
foveolata punctata; foliis ovato-oblongis duplicato serratis, pedun-
culis multi-floris cymosis Fl. per. t. p. 15 t. 18. f. a.

Habitat in sylvis Chili

Caulis tripedatis, erectus, teres. Rami teneri pubescentes, glanduliferi.
Folia petiolata, subtus albida, nonnulla supra villosa. Florae integerr-
mae, omnia utrinque purpureo punctata. Paucicelli umbellati, uni-
vel subquadri-flori. Calycis laciniis ovatis, punctatis. Corolla alborio-
lacea, macula pallida punctisque purpureis variegata. Tubus breviter
basi villis articulis hirsutus. Stigma emarginatum Fl. per. l. c.

punicia Coll. foliis ovalibus serratis caula repente R. & P. fl. Per. 1. p. 15. tab. 24

fig. 6.

Habitat in paludibus nemoribus

Herpeta. Caulis herbaceus, ramosus, rami erecti. Folia opposita, petiolata
supra glabra. Petioli breves. Pedunculi terminales bifidi, 7-8 flori. Padi
celli umbellati, ^{inopiales. Copia punicia glabra} fl. Per. 6. 7.

pulverulenta 16. Calceolaria foliis oblongo-lanceolatis dentato-serratis,
ramis pulverulentis fl. per. 1. p. 19. +

Habitat in Pando praeceptis

Caulis suffruticosus, orgyalis, ramosissimus, erectus; Vires: Rami
erecto patuli, a pulvere canescenti asper. folia breviter petiolo =
to. Pedunculi axillares, solitarii, subquadriflori; foliolum uni =
cum pubbinis pedicellis fl. Per. l. c.

~~Verdita fl. foliis lanceolatis anguste bifurcatis oppositi ternis glabris
Calceolaria Verdita foliis erectis anguste bifurcatis fl. per. 1. p. 112. tab. 29. fig. 5
fl.
Habitat in Pando praeceptis
Ramosus suffruticosus, orgyalis, ramosissimus, erectus, vires: Rami
erecto patuli, a pulvere canescenti asper. folia breviter petiolo =
to. Pedunculi axillares, solitarii, subquadriflori; foliolum uni =
glabris, serratis, angustis. Vires: pedicelli ternis per axillares biflori. Rosetta
terminis, his vel ter dimis. pedicelli ternis per axillares biflori. Rosetta
glabra fl. per.~~

virgata G. foliis ovatis obtuse serratis, oppositis ternisque pubescentibus; pedunculis
axillaribus terminalibusque, ramis virgatis

Calceolona virgata foliis ovatis obtuse serratis, ramis virgatis, pedunculis axil-
laribus multifloris fl. Peruv. 1. p. 20. Tab. 31. fig. 6

Habitat in Peruvia Centa.

Caulis suffruticosus, bipedalis, erectus; teres: rami oppositi ternique, inaequales, frag-
li; ramis perennascentibus, leviter pubescentes. Folia breviter petiolata, pa-
tentia, venosis pinnatis, obtusa, utraque pubescentia. Pedunculi axillares soli-
tarii: pedicelli 4 or laterales 2-3 flori, terminales gemini bis bifidi. Calycis
pubescentes. Corolla parva basi villosa fl. Peruv.

populonea. Folia ovata serrata, opposita, ternis, virgata
centa. Linte. Guadalupe. Peruv. 1. p. 20. Tab. 31. fig. 6
Habitat in Peruvia Centa.

Salicifolia 17. Calceolaria foliis ovato-lanceolatis serratis supra nitidis viscosis,
subtus rugosiusculis cinereis, pedicellis erectis +
Calceolaria salicifolia; foliis lanceolatis serratis, pedunculis
geminis terminalibus umbellatis dichotomisque Fl. per.
1. p. 10. t. 19. f. 6.

Habitat in praeceptis et uliginosis Peruvia f

glaberrima. Caulis suffruticosus, sesipedalis, erectus, teres,
ramosus, fragilis, duplici cortice textus; exteriori cinereo,
membranacea; interiori ferruginea: Rami brachiati, obsolete
tetragoni, obsolete tetragoni, viscoso-resinosi. Velia paten-
tia vel deflexa, petiolata, acuta, subtus venoso-reticulata
instar salvi officinalis. Pedunculi terminales, gemini, basi utri-
que folio serrato: pedicelli quatuor, intermediis uniflori, laterales
triflori. Calyx fructiferus deflexus. Corolla maxima,
pubescens, villis glandulosis Fl. per. l. 6. pag. 1. 6.

oblonga *P. hispida*, foliis oblongis serratis, pedunculis trifidis tri f. *scrophioidi*
corollis intus punctatis caule simplicissimo

Caliceolana oblonga, foliis oblongis serratis, pedunculis trifidis, corollis
intus punctatis *Bl. Penns. f. pag. 15. Tab. 24. fig. 6.*

Habitat in Panatahecas nemoribus.

Caulis herbaceus, erectus, teres, sesqui-pedalis. Folia breviter petiolata.
Pedunculus terminalis trifidus subdichotomis. Flores 3-6 in pa-
gulis pedunculo partiali, cum pedunculo in dichotomia subdividitur
Calyx *hispidus*

deflexa, v. Calceolaria foliis ovato-lanceolatis serrulatis subtus canescenti-
bus, pedunculis axillaribus terminalibus, ^{que?} pedicellis nudantibus villosis +
Calceolaria deflexa; foliis ovato-lanceolatis serrulatis, floribus ter-
minialibus corymbosis: pedicellis ^{quadri-quinque} 4-5 floris nudantibus 8l. per. 1.
p. 10. t. 30. f. 6

Habitat in provincia Casatambo prope torrentes 5

Caulis suffruticosus, biulnaris, teres: Rami erecto, patuli, purpurei,
teneri, viscoso-resinosi, villosiusculi. Folia breviter petiolata, deflexa
acuta, supra lucida: floralia integerrima. Pedunculi gemini: pedi-
cellis umbellatis, intermedii duo uni flori, reliqui tri- vel quadri flori,
in aequaler. 8l. per. 1. c. per. 1. c.

punctata C. foliis ² ovatis ¹ oblongo duplicato ^{biferratis} subtus ^{lobis punctatis} albidis pedunculis
axillaribus terminalibusq; caule fruticoso

Novellana punctata: foliis ovato-oblongis duplicato-ferratis, pedunculis
multifloris corymbosis cymosis fl. Peruv. 1. 13. tab. 10. fig.

Habitat in sylvis Chile.

Caulis tripedalis erectus; ramosus, teres, compressifolius. Rami tenes
pubercenter, glanduliferi. Folia opposita, petiolata, subtus alba, nonnul
la supra ^{pedicelli umbellati: 4 per duo cuneales 3 Her.} glabra; lobis ^{emarginatis} integerrimis; cuncta utraque purpurea
punctata. Calyx 4 partibus: lacinis ovatis punctatis. Corolla albo violacea
macula ^{pellida} purpurea punctata variegata. Tubus bract
eae hirsutus velis articulatis limbis labiis subaequalibus. Stamina extra
intus ⁱⁿ tubo corollae tubi opposita. Stigma emarginatum fl. Peruv.

viscosa 19. Caliceolaria viscoso-resinosa, foliis ovalis acutis serratis subtus
laevibus, calycibus tomentosis +

Caliceolaria viscosa; foliis ovalis acutis serratis viscosissima, ca-
lycibus subtomentosis. Fl. per. 1. p. 10. t. 30. f. a.

Habitat in alpibus Peruvia 3.

Tota viscoso-resinosa. Caulis diffusivus, erectus, teres. Rami
compressiusculi, obsolete tetragoni. Folia petiolata, subt interdum
biserrata, subtus venosa. Pedunculi axillares et terminales: pedi-
celli umbellati, quatuor, tomentosi, ^{int axillis} uniflori, laterales triflori. Corolla
extus leviter pubescens Fl. per. per. ped. l. l.

gemelliflora 20. Calceolaria foliis ternis ovatis serratis subsessilibus, pe-
dunculis axillaribus bifloris +

Calceolaria gemelliflora; foliis verticillatis, ovatis, serratis: pedun-
culis ternis bifloris. Cavan. ic. 5. p. 30. t. 450. f. 1.

Habitat in saxosis regni Peruviani.

Caulis teres, ramosus. Folia acuta, glauca. Pedunculi superne,
Binculus ex binculo ala, foliis breviores; folia duo ad basin pedi-
cellorum. Calycis laciniis trinerviis, ovata. Labium corollae labi-
um inferius versus faucem sensim angustatum Cavan. l. c.

An a C. angustifolia diversa? angustiflora diversa?

52

terniflora 21. Calceolaria foliis ^{is} ternatis, petiolatis ovato-lanceolatis serratis,
pedunculis axillaribus trifloris. †

Calceolaria terniflora; foliis verticillatis, ternis, ovato-oblongis,
serratis: pedunculis ternis trifloris. Cavan. ic. 5. p. 30. t. 450. f. 2.
Habitat in regno Peruviano.

Caulis erectus, teres, fuscus Tripedalis, teres, fusco-violaceus, bis
tripedalis. Rami terni. Folia glauca, superiora sessilia.
Pedunculi superne, singuli ex singula ala foliorum: folia
duo ad basin pedicellorum. Calyx major quam in procedente,
ope lentis submentosus. Cavan. l. c.

^{glaberrima} ^{lenatis}
salicifolia C. foliis ovato lanceolatis supra nitidis viscosi, subtus rugosiusculis
cinereis, ramis tetragonis, duobus catis

Calceolana salicifolia foliis lanceolatis serratis, pedunculis geminis vel ternatis
umbellatis dichotomisque fl. Peruv. 1. pag. 10. Tab. 19. fig. 6.

Habitat in praeceptis et uliginosis Peruviae

glaberrima. Caulis suffruticosus, sesipedatus, erectus, teres, ramosis, fragilis
duplexi cortice ductus; externi cinerea, membranacea; internon geminigena
Rami bracteati; obsolete tetragoni viscoso-resinosi. Folio patentia vel ^{depressa} depende
tia pedicelata, acuta, subtus venoso-reticulata instar salicifoliae. Pedun
culi terminaliter gemini utraque ^{folio} serrato fere ad basin: pedicelli quatuor
intermediis uni flori, laterales triflori. Calyx quatuor fere deflexus. Corolla
maxima pubescens, cellis glandulosis fl. Per.

Deflexa C. foliis ovato lanceolatis serratis ^{ulatis} subtus canescentibus, pedunculis axillari-
bus terminalibusque pedicellis nutantibus villosi

Caliceo lano deflexa. foliis ovato-lanceolatis serratis, ^{ulatis} terminalibus
compositis: pedicellis 4-5 floris nutantibus fl. peris. 1. p. 10. tab 30 fig. 6.

Habitat in provincia Paratambo prope Torontor.

Caulis suffruticosus biulnaris, teres: rami erecto-patuli, purpurei tenes viscosi-
resinosi, villosissimi. Folia breviter petiolata, deflexa, acuta supra lucida: flora
la integerrima. Pedunculi gemini: pedicelli ^{ulati} umbellati intermedio duo
uni flori reliqui 3-4 flori, inaequalis fl. Per: 6. c.

cuneiformis 23 Calicotaria foliis cuneiformi-ovatis inciso serratis Fl. per. l. p. 14.

t. 27. f. 6. +

Habitat in Carthago et Tarmo alpibus 5

Caulis suffruticosus, bipedalis, erectus, ramosissimus, cortice rimoso be-
cedente. Rami brachiati, breves superne dichotomi, teretes, glabri,
ferrugini. Folia approximata, petiolata, supra lineata, hirsuta,
subtus tomentosa, incana, margine leviter reflexa. Peduncululi
superne, apice diphylli: pedicelli umbellati, tres vel quatuor, la-
terales triflori, intermediis uniflori. Calycis laciniis ovatis, acutis,
lutescentibus Fl. per. l. c.

7

perfoliata Callicolana foliis perfoliatis spatulato-sagittatis L.V. p. 65. 3. Suppl. p. 86.

Habitat in Nova Granada

Callicolana foliis perfoliatis: foliis perfoliatis sagittatis utrinque
villoso Smith. pl. ic. 1. pag. 4. V. 47

Habitat in Nova Granada vscota

Herba, exceptis corolla villosa. Caulis teres, corymbo foliosus multi
florus terminatus. Stipula connato-perfoliata, venis reticula
ta subtus densissime lanata, basi lata medium versus attenua
ta deorsum ampliato in lobum deltoideum margine inaequaliter
dentata, flores in summitate ramulorum. Bracteae foliis
summi florum laevia ovata sessiles non perfoliata. Pedunculi
ramosi filiformes ramis vel simplicibus. Corolla flavo-lutea
Smith

Callicolana perfoliata foliis sagittatis dentatis, petioli alatis perfolia
tis fl. Penns. pag. 15. Tab. 21. fig. 1.

rugosa subtus venoso reticulata. folia duo ~~et~~ interdum solitaria sessilibus

ad in pedicellum pedicellonem, ovata sessilibus

Pedunculi ^{longius, uni} axillares oppositi terminales terni pariter et. inter
net duo uniflor. laterales. laterales ~~triflori~~ biflori
non vid.

multiflora 24 Calceolaria foliis ternatis ovatis, serratis ^{subbilobis} subsessilibus, flori-
bus paniculatis. pedunculis ramosis +

Calceolaria multiflora; foliis verticillatis, ternis, subsessilibus,
ovato-acutis, serratis; floribus paniculatis. Cavan. ic. 5. p. 29. t. 449.

Habitat in regno Peruviana et versus Limam locis siccis

Caulis ergyalis, ramosus. Rami teretes, obscura purpurei, rare villo-
si, ubi tota planta. Folia subcordata, acuta. Panícula terminalis.

pedalis: pedunculi axillares, oppositi, bifido ramosi: folium utrinque
nastrum ad divisuras. Calycis lacina trinervis. Corolla labium
superius inferius versus faucem angustatum Cavan. l. c.

Calceolaria multiflora Cavan. ic. 5. p. 29. t. 449. f. 10. f. 320. f. 1. Peruviana
et abbat in Mexico 2

viscosa ^{viscoso-resinosa} C. foliis ovatis acutis serratis, ^{tubulis canescentibus} calycibus tomentosis

Caliceolana viscosa; foliis ovatis acutis serratis viscosissimis, calycibus subterminalibus fl. Penn. 1. pag. 10. Tab. 30. fig. a.

Habitat in alpebus Penns.

Tota viscoso-resinosa. Caulis suffruticosus, erectus, teres: rami compressi, peltati, obsolete tetragoni. Evla petiolato, subtus venosa, interdum bipinnata. Peduncul. axillares et terminales: pedicelli umbellati ^{tomentosi} 4, ^{non flori}, vel laterales triflori. Corolla extus leviter pubescens fl. Penn. l. c.

violacea v Calceolaria foliis petiolatis ovatis grosse serratis, pedunculis
terminalibus ternis ramosis, corollo labiis equalibus +

Calceolaria violacea; caule fruticoso. foliis oppositis ovatis dentatis
floribus terminalibus corymbosis Cavan. ic. 5. p. 31. t. 452.

Habitat ad Littora maris Pacifici America. 5

Stem quadrivel. sex pedalis. Rami cortice violaceo rubri. Folia
petiolorum longitudine, dentibus aliquot serrata, subtus glauca
albida villis aliquot minimis. Pedicelli tres vel quatuor, uni vel
bi flori, capillares, ovulo armato villosi. Corolla dilute violacea
intus maculis saturationibus variegata. Labia subaequalia, can-
na nuda patentia, concavo, limbo villosa Cavan. l. c.

multiflora. C. foliis ternatis ovatis serratis subsessilibus, pedunculis axillaribus
ramosi

Calceolaria multiflora foliis verticillatis ternis, subsessilibus, ovato-acutis, serratis.
Floribus paniculatis. Pavan: Flor. 5: p. 29. tab. 449

Habitat in regno Peruviano. Descriptio hinc a Linn. p. 115.

Caulis ergo, ramosi: rami teretes, obscure purpurei, vix villosi, uti tota
planta. Folia acuta, subsessata. Panicula terminalis pedalis: pedunculis axi-
llaribus singulis foliorum axilla, bifido, ramosi. folium utroque parvum ad
diversam. Calycis lacina trinervis. Corolla labium superius brevius, infe-
riori versus faucem angustatum.

triandra 26. Calicolana foliis inciso-pinnatifidis, ramis pedunculis mar-
ginibusque calycis glanduloso pilosis, floribus triandris +
Novellana triandra; foliis inciso-pinnatifidis, floribus trian-
dra Cavan. ii. 5. p. 32. t. 453.

Habitat in Peru

Caulis fruticosus, teres tripedalis vel ultra: Rami cortice atro-
sanguineo. Folio interstitio multo brevior: laciniis utrinque
serratis ^(duobus - tribus) subtus glauca. Petioli folio brevioras, basi mem-
brana amplectente aucti. Pedunculi dichotomi: pedicelli ge-
mini, uniflori in dichotomia. Corolla latius suboqua lobis,
concavis. Filamenta tria, brevissima. Germen tomentosum.
Cavan. t. 6.

ros marini folia Calicolaria folis lanceolatis margine revolutis subtus incanis: pedicellis
umbellatis, ramis caule glabro

Habitat in Peru herb. Gusf.

Caulis fruticosus, erectus, glaber, purpureo f. exteri. Folia sessilia, bipollicaria et ultra,
lanceolata, acuta, e nervis, glutinosa, supra glabra, subtus tomentosa-incana, mar-
gine parum revoluta, ramuli in axillis. Pedunculi ex axillis superioribus et
apice, longitudine folii: pedicelli saepe ^{em} decussate non bellati. Calycis glutinosi

affinis ferruginea Cavan.

V. D. D. Gusf.

virgata 27. Calceolaria foliis oppositis ternisque ovatis obtuse serratis pubescentibus, pedunculis axillaribus terminalibusque multifloris +
Calceolaria virgata; foliis ovatis obtuse serratis, ramis virgatis,
pedunculis capillaribus multifloris Fl. Per. per. 1. p. 20. t. 31. f. a
Habitat in circuito Canto 5

Caulis suffruticosus, bipedalis, erectus, teres. Rami oppositi vel terni
virgati, inaequales, fragiles, teneri, pubescentes, laniabiles pubescent-
es. Folia breviter petiolata, patentia, obtusa, venosisima, utrin-
que pubescentia. Pedunculi filiformes, pubescentes; axillares
solitarii, pedicelli quatuor bi- & triflori; terminales gemini, bis bi-
fidi. Calyx pubescens. Corolla parva, basi villosa. Fl. per. l. c.

Virgata
Calceolaria foliis ovatis obt. serratis

angustiflora C. foliis oppositis ternisque ovato oblongis acute serratis, pedunculis axillaribus
ternis terminalibusque quadrifloris, corollis basi angustiformis

Calceolana angustiflora foliis ovato lanceolatis acute serratis, pedunculis quadrifloris,
corollis basi angustiformis fl. Penw. 1. pag. 17. tab. 20. fig. a.

Habitat in Costa vesperis circa quendam vicum Obrajillo.

Caulis suffruticosus, bipedalis, erectus, teres, ramis flexuosis, hirsutus. Rami oppositi, terni
que, fragiles, teretes, patentes. Terni hirsuti, patentes. Folia breviter petiolata, utrinque
pubescentia, tenuia: duo subpedicellis integerrima. Pedicelli plerumque hirsuti,
foliis brevioribus, ternis. Pedicelli gemulis subaequalibus. Calycis lacinae pubescentes.
Corolla parva, intus ^{nuncius} maculis purpureis maculata.

confer cum gemella Cavan. et si diversa differentia ultimus exquirere

Dentata 20- Calceolaria foliis oppositis ternisque ovatis argute duplicato
dentatis glabris, pedicellis racemosis secundis +

Calceolaria dentata foliis ovatis argute bidentatis El. per. l.
10. t. 29. f. 6.

Habitat in sylvis Chili

* Viscosa. Caulis ramosus bimus. Rami teretes, virgati; hispidi
inferne glabri. Folia petiolata, juniora hispidata, etate glabra.

Pedunculi terminales gemini, bifidi cum pedicello unifloro
in divisa, reliqui racemosi, alterni uniflori El. per. l. c.

Terniflora C. foliis ternatis, petiolati ovato lanceolati serratis, pedunculis
axillaribus ternifloris

Calceolaria terniflora: foliis verticillatis, ternis, ovato-oblongis, serratis: pe-
dunculis ternis: 1. flori Cavanal. Ic. 5. pag. 30. tab. 450. fig. 1.

Habitat in regno Peruviano

Caulis erectus, teres, fusco-violaceus, bi-tripedalis, ramis ternis. Folia glau-
ca, superiora sessilia. Pedunculi superni, singulis ex singula ala foliorum
folia duo ad basin pedicellorum. Calyx major quam in precedenti, ore cen-
tis subtomentosus.

ovata 29. Caliceolaria foliis ovatis serratis crenatisque, pedunculis geminis fili-
formibus Fl. per. 1. p. 16. t. 20. fig. a (C. biflora).

Caliceolaria integrifolia; foliis ovatis indivisis serratis Lin. Suppl. 86
nae Syst. veg.

Caliceolaria dichotoma; foliis & implicibus ovatis obsolete crenatis, inferioribus petiolatis, caule dichotomo pubescente La ^{mark} ~~mark~~ illustr. 1. p. 52.

Caliceolaria ovata; caule ramoso, foliis ovatis crenatis Smith. ic. inod
1. p. 3. t. 3. Ex herbario

Habitat in Peru. ~~Fl.~~ Insulari O

Caulis semipedalis, superne dichotome diviso; erectus, teres; dense ^{pilosus} pubes-
centi pilis albidis, longis, articulatis, intermittentibus brevioribus;

Rami inferne oppositi, ^{minor} superne dichotome divisi. Folia breviter
petiolata, basi pollicaria vel ^{minor} ultra, remota, acuta obscure crenat-
ta vel integerrima ~~pedunculi pilosa~~. Pedunculi gemini interdum
terni, ex axillis alternis, ^{filiformes,} pubescentes, foliis longiores. Calycis
laciniis ovato. Corolla parva.

~~integri-folia Calicolaria~~

~~Calicolaria dichotoma La Mart.~~

~~Habitat in Pene herb. Guss.~~

~~Caulis herbaceus, simplicissimus, tenax, apice dichotomus, semipedalis, villosus;
Folios. Eolia petiolata, ovata, integerrima, vel serrata obtuse serrata, obtusi-
si-ula. Peduncululi oppositi, solitarii, semipollicares, uniflori. Calycis laciniis
ovato.~~

uni flora 30. Caliceolana foliis oppositis ternisque ovatis serratis, pedunculis axil-
laribus solitariis, ^{unifloris} caule suffruticoso +

Caliceolana uniflora: foliis ovatis serratis, pedunculis longis filiformibus unifloris. Fl. Per. 1. p. 16. t. 20. f. c.

Habitat in umbrosis Tarma ad Curio ♀

Caulis quadripedalis, ramis bimus; teres; pubescens. Ramis junioribus pubescenter, altero latere purpureo. Folia saepe ternis, breviter petiolata, pubescentia, tenera subtus tomentosa, Pedunculi in medio
diphylli; foliis ut saepe ternis utrinque pubescentibus. Calyx pubes-
center. Fl. Per. l. c.

Gemelliflora C. foliis ternis ovatis serratis subsessilibus; pedunculis axillaribus; biflo-
ris

Calceolaria gemelliflora: foliis verticillatis, ovatis, serratis; pedunculis ternis;
bifloris Bavan. Hb. G. pag. 30. tab. 450. fig. 1.

Habitat in saxoſi regni Peruviani.

Caulis teres, ramosus. Folia acuta, glauca. Pedunculi superne, singulae
e singulo axilla; folio brevior: folia duo parva ad basi pedicellorum
Calycis lobis ternis, ovatis. Labium inferius versus faucem profunde
angustatum

62

inflexa 31. Calicolonia foliis ovatis ~~obtusis~~ serratis, caula & scandente, ramis
adscendentibus, pedicellis umbellatis unifloris

Calicolonia serrata; foliis simplicibus sessilibus ovatis serratis,
floribus cymosis terminalibus ^{La Mart.} La Mart. illustr. t. 1. p. 51

Calicolonia inflexa; foliis ovatis acutis crenulatis, pedunculis
inflexis ^{tri-quinquefl.} per. 1. p. 16. t. 25. f. a.

Habitat in Carta promptis. Herb. Furbisi 5.

Caulis suffruticosus, ramis & ramis, teris; inferna ramis inferne
loras, glabris, superne tomento tenui ferrugineo vestiti, oppositi brachiati. Folia

remota, pollicaria, inferiore breviter petiolata, superiora sessi-
lia, patentissima, acuta, suprema integerrima, basin versus uti

suprema integerrima, supra glabra sublineata, subtus nervosa

venosa, pubescens. Pedunculi axillares et terminales, tri-quinqueflori.

pedicelli semipollicares. Calycis laciniis ovata.

arguta bi *oppositis* *ternis* *que* *glabris*
dentata *C. foliis* *ovatis* *dentatis*, *pedicellis* *racemosis* *secundis*
dentata *Calicolana* *foliis* *ovatis* *arguta* *bidentatis* *fl. penult. puz. 1. C.*
Tab. 29. fig. 6.
Habitat *in* *silvis* *Chili*
hispida *virgata*. *Caulis* *ramosissimus*: *rami* *terni*, *virgati* *inferne*
glabri. *Solia* *petiolata*, *adulta* *glabra* *pedunculi* *terminales* *gemini* *bi*
pedi *pedicellis* *in* *diversis*, *reliqui* *racemosi* *alterni* *uniflori*
Corolla *glabra*

bicolor 32. Calicodania foliis oppositis ternisque ovatis biserratis ~~venosis~~ rugosis
pedunculis axillaribus. Var. minimalibus que subdichotomis f.

Calicodania bicolor; foliis ovato cordatis acutis venosisissimis rugosis
biserratis, pedunculis multifloris dichotomo umbellatis Fl. per.
1. p. 16. t. 25. f. 6.

Habitat in Canto praeoptis, argillosis et petrosis f.

Caulis suffruticosus, biennaris, erectus, teres, pubescens, incanus.
Rami subpendantes, obtuse tetragoni, lignosi, fragiles, ferrugineo-
-purpurei. folia petiolata, patentia; duo vel tria sessilia sub
pedunculis et duo sub pedicellis parva, integerrima. Pedicelli te-
nues, villis glandulosis adpersi, uniflori. Corolla basi alba, super-
ne aureo-sulphurea. Fl. per. l. c.

in voluta 33. Calicolaria foliis ovatis acutis serratis glabris, pedunculis axillaribus terminalibusque unifloris, corollis involutis. †

Calicolaria involuta, foliis ovatis acutis serratis glabris, corollis involutis calycem gemitegentibus Fl. per. l. p. 15: t. 23. f. a

Habitat in Panotahuas nemoribus. †

Glabra. Caulis suffruticosus, tripedalis, erectus, teres ramosus.

Folia breviter petiolata, rugosa. Pedunculi ex axillis superioribus plerumque duo vel tres utrinque, uniflori. Calyx reflexus. Fl. per. l. c.

uniflora C. foliis ternis oppositis, ovatis serratis, pedunculis filiformibus unifloris
axillaribus, solitariis foliis
Caliceolana uniflora: foliis ovatis serratis, pedunculis longis filiformibus unifloris. fl. per.
1. pag. 16. tab. 20. fig. 5

Habitat in umbris Ternae ad Curia

Caulis suffruticosus, quadripedalis, rarisissimus; rami juniores pubescentes, alteri
latera purpurei. Folia saepe ternis, breviter petiolata, pubescentia, ternis subtus
tomentosa. Pedunculi axillares, solitarii, medio bifidi, foliis ² integerrimis,
utrinque pubescentibus. Calyx pubescens

bicrenata 34 Calceolaria foliis ovatis duplicato serratis subtus tomentosis,
pedicellis umbellatis unifloris +
Calceolaria bicrenata; foliis ovatis bipinnatis & subtus tomentosis Bl.
per. 1. p. 15. t. 23. f. 6.

Habitat in Cuchero nemoribus.

Caulis herbaceus, bipedalis, erectus, teres, ramosus. Folia breviter
petiolata, obtuse bipinnata, rugosa. Petioli hirsuti axillares et
terminales, apice & diphylli; pedicelli quinque ad septem,
inequales, hirsuti. Calyx villosus. Bl. per. 6. c.

Crenatiflora C. foliis oblongis ovatis ^{inaequaliter dentatis} subtomentosis, pedunculis dichotomis, lobis inferiore
corolla 4-dentata.

Calceolaria crenatiflora: foliis ovatis, parce tomentosis: floribus corymbosis, corolla
4-nerviata Cavan. Ic. 5. p. 20 Tab. 446.

Habitat in humidis s^u p^{ar}te d^e Chiloe.

Caulis sesqui-pedalis, ^{sub}tomentosus, superne bipartitus. Stipes radicalis late oblongo
obovato in petiolum attenuata: caulina oblonga subsessilis, suprema sessilis

Calycis lacina ovata, acuta, 4-nervis: fructiferis patentibus. Corolla lutea
^{lobis} maculis purpureis rubris variegata: sigenus breve. Capsula chalcidica fulva.

heterophylla 35 Calceolaria foliis ovatis-ellipticis subcordatisque serratis, ⁹²
pedunculis longissimis dichotomis Fl. per. 1. p. 16. t. 21. f. 6. +

Habitat Peru in nemoribus

Hirsutissima, villis ferrugineis, biformes, longiores & elosi, articulati;
breves glandula terminatis. Caulis herbaceus, pedalis, quadrangulus;
rami purpurascens, erecto-patuli. Folia petiolata,
patentia, interdum quoque subrotunda oblongave, & ore duplici-
cato-serrata, subtus venosissima. Pedunculi ex axillis superioribus
et apice viscosi: pedicelli uniflori, duo a dichotomia.
Calyx striatus, patentissimus. Corolla glabra, semiaperta.
Stamina exserta. Fl. Peru. l. c.

violacea *C.* foliis petiolatis oppositis ovatis grosse serratis, pedunculis terminalibus
ternis, ^{ramosis} caule fruticoso

Habitat Caliedana violacea; caule fruticoso: foliis oppositis, ovatis, dentatis: flombus
terminalibus corymbosis *Desv. in. 5. p. 31. tab 452.*

Habitat ad littora mari Tolucahuani America 5

Stipex 4-6 pedalis, ramis oppositis, cortice violaceo rubro. Folia petiolis
longitudine, dentibus aliquot profundi serrata, subtus glauca albida
villosa aliquot minimis. Pedicelli 3 vel 4. capillares, oculo armato villosi
uni-biflori. Corolla dilute violacea, maculis saturationibus interne
variegata, bilabata: labiis sub aequalibus campanulato-patentibus
concavo limbo villosis.

crenata 36 Calceolaria foliis cordatis lanceolatis sessilibus crenatis ³ sulturnianis,
pedunculis terminalibus, axillaribus, pedicelli sparsis.

Calceolaria crenata; foliis sessilibus oblongis acutis crenatis, floribus
cymosis caules et ramulos terminantibus ^{marck} La Mont. Dict. 1. p. illud.

1. p. 52

Ex herbario

Habitat in Peru. Herb. Fuscoi 4

Caulis fruticosus, teres. Rami erecti, villosi. Folia sesquipedalia,
acuta, tenuis pime venosa, avenia, supra villosa. Pedunculi et
axillis supremis et apice, foliis longiores, villosi-viscosi, uti pedicel-
li et calyces: pedicelli uniflori vel ramosi, filiformes.
Quam nullis a Cavanil. vel Flor. Per. quadrat.

heterophylla C. foliis ovatis, ellipticis subcordatisque serratis, pedunculis longis semis dicto
Tomis fl. Per. pag. 16. Tab. 21. fig. 6.

Habitat in monte nemorosus.

Herb. pubescentia. Caulis herbaceus, villis ferrugineis, biformes; longiores setosi, axillares
et breviores glandulosa. Terminali. Caulis herbaceus, erectus, pedalis, quadrangulus,
ramosus: Rami perperascentes, erecti, potuli. Folia petiolata, patentia
interdum quoque subrotunda, oblonga, saepe duplicato serrata, subtus venosissima.
Pedunculi ex axillis superioribus et apice nascuntur: pedicelli uniflori, duo a dichotomia
calyce striatus, patentissimus. Corolla glabra, semipetala. Stamina exserta fl. P. l. c.

trifida 37. Calceolaria foliis cordato-ovatis obtuse serratis subtus canescenti-
bus; inferioribus oppositis petiolatis, superioribus ternis [†] sessilibus.
Calceolaria trifida; foliis cordatis ovatisque crenato-serratis,
pedunculis trifidis multifloris umbellatis Fl. per. 1. p. 17. t. 26.
f. 6.

Habitat in locis umbratis prope aquas Chentini

Caulis suffruticosus, bi-3. tripedalis, ramosus, erectus; teres, glabri-
sculus. folia superiora sessilia, supra leviter pubescentia;
villi glanduliferi. Pedunculi axillares et terminales: pedi-
celli umbellati, canescentes, quatuor, duo laterales triflori, in-
termedia uniflori. Fl. per. 1, c.

crenata Pollicolana

Habitat in Ven. Lib. Hist.

Caulis fruticosus, teres. Rami villosi, erecti. Folia sessilia cordata, lanicolata, sequi-
pollucana, acuta crenata, tenuissime nervosa, arena, villosa, subtus incana.
Pedunculi ex axillis supremis et apice, foliis longiores, villosi viscosi uti pedicelli
et calyces: pedicelli sparsi, uni-flori vel compositi, faliiformes.

verticillata s. Calicotaria foliis ternis cordatis acutis serratis, peduncu-
lis quadrifloris 8l. Per. 1. p. 17. +

Habitat in praeceptis Canto. f.

Q. Tab. Caulis suffruticosus, erectus, teres. Rami pa-
laccii coloris, erecto-patuli. Folia omnia verticillato ternis,
breviter petiolata. Pedunculis axillaribus, foliolis unicis sub
singulis binis pedicellis 8l. Per. 1.

ternatis oppositisque
bicolor *C. incana*, foliis ^{cordatis} ovatis rugosis biferratis venosis, pedunculis axillaribus
Veroninalibusque ^{dichotomis} suboppositis.

Caliceolana bicolor: foliis ovatis cordatis acutis venosis biferratis, pedun-
culis multifloris, dichotomo umbellatis fl. paucis. pag. 16. tab. 25. fig. 2.

Habitat in Panto praeruptis, argillosis et petrosi.

Caulis suffruticosus, pubescens, vicius, brulians, erectus, terreo, ramosis. Rami
subpendentes, obtuse quadranguli, lignosi, fragiles, ferrugineo-purpurei. Folia
petiolata, patentia. Pedunculati folia duo sesquialtera per pedunculis ^{et} pedicellis
parvis integerrimis, pedicelli tenues villos glandulosi adpressi unius flori. Corolla a
ad basin albo, superne aureo sulphurea.

flexuosa 39. Calicolaria villosa glandulosa, foliis cordatis inequaliter obtu-
se serratis, caule ~~fruto~~ ramis flexuosis, pedicellis umbellatis. +

Calicolaria flexuosa; foliis cordatis crenatis, pedunculis mul-
tifloris umbellatis Bl. per. 1. p. 17. t. 26. f. a (Crenata) in tab.

Habitatio proupti Canto +

Villi articulati. Caulis fruticosus, erectus, ramosus, teres, asper.

Folia petiolata, remota, patentia, supra aspera, subtus venosa.

Pedunculi axillares et terminales, multiflori: pedicelli

quadruor, duo intermedii biniflori, laterales triflori. Calyx

quadrifidus laciniis laterales latiores. Bl. Per. l. c.

inflexa C. foliis ovatis extropis serratis, caule scandente, ramis adscendentibus,
pedicellis umbellatis unifloris
Calceolaria inflexa; foliis ovatis, acutis crenulatis, pedunculis inflexis 3-4 floris
fl. Per. 1. pag. 16. tab. 25. fig. a.

Habitat in Canto prorepti

Caulis suffruticosus, ramis oppositis, teres, cortice fibrinifido, tenui seradente
tectus, tandem ferrugineo purpurascens, lavis nitidiusculus. Rami brachiati.
Folia petiolata, acuta, horizontaliter saepe deflexa, patentia, subtus venosa
fibrinosa. Pedunculi axillares et terminales, brachiati, 3- vel 4 flori, folium
utraque ad apicem ^{sub} sesple: pedicelli subaeuales fl. Peruv. l. c.

Lobata 40 Calceolaria foliis cordatis lobatis serratis subtus inaeano-tomentosis,
caule dichotomo piloso. +

Calceolaria pilosa lobata, caule erecto, dichotomo: foliis cordatis, lobatis
tomentosis Cavan. ic. 5. p. 26. t. 443. f. 1.

Habitat in regno Peruviano locis siccis.

Caulis bipedalis, rubescens. folia opposita, petiolata, quinque lobis;
lobi breves, supra villosa, subtus tomento molli vestita. Petioli
valde pilosus, foliis paucis longiores. Pedunculi terminaliter,
pilosi, quatuor duo laterales biflori, intermedii uniflori, breviores.
Calycis laciniis ovatis, tribulosis. Corolla lutea: labium inferius
longitudinaliter lineatum Cavan. l. c.

Ferrata Calicolana

Habitat in Pene herb. Guss.

Caulis erectus, teres, lavis, ^{rami oppositi} super ne villosus. Folia remota, sessilia, pellucida, ovata, acuta, serrata, venosa, subtus pallidiora, superiora integerrima. Peduncululi axillares, oppositi, terminales 4or: Pedicelli 4or - 6 umbellati. Calycis laciniae ovatae.

petiolari 41 Calceolaria foliis inferioribus oblongo-ovatis basi attenuatis inaequa-
liter dentatis, superioribus subcordatis. +
Calceolaria petiolari: foliis oppositis, ovato-acutis in petiolum alatum
attenuatis, inaequaliter dentatis: floribus paniculatis. Cavan. i. 5. p.

30. t. 445.

Habitat prope Quoyaguil

Caulis herbaceus, sesquipedalis. Folia acuta, inferiora basi attenuata,
usque ad basin petioli decurrentia; superiora sessilia ovato-cordata, aequa-
liter dentata, floralia integerrima. Pedunculi ^{superne} axillares, oppositi, tri-
fidi, terminales terni: pedicelli racemosi, uni vel quadri flori;
foliulae duae oppositae, foliola duae ad basin singuli, uti calyces villosi-
glandulosi. Corolla lobis subaequalibus. Filamenta corollae parum bre-
viora. Germen subvillosum glandulosum. Cavan. l. c.

Encodes Calceolaria ?

Habitat in Peru herb. Tuss.

~~Truncus ramifusus, teres, glaber, superne villosus: rami frequenter, sparsi, incani, tuberculati
e caelo foliorum. Folia sessilia, opposita, semisingulana, linearia, villosa: fasciuli
ramulorum in axillis omnibus, hinc quasi fasciculata. Pedunculi ex apice ramo-
rum et ramulorum, solitarii, uniflori. Calycis foliola ovata, incana.~~

61
tomentosa 42. Caliceolaria foliis perfoliatis spatulato-cordatis inaequaliter
serratis, subtus tomentosis, caule glabro t.

Caliceolaria tomentosa; foliis cordato-triangularibus, duplicato-ser-
ratis subtus tomentosis, petiolis ~~connatis~~ ^{sex-oclo-} pedunculis ~~6-8~~ floris

Fl. Per. l. p. 15. t. 22. f. 6.

Habitat in umbrosis Tarro, Cuchero.

Caulis herbaceus, quadripedalis, erectus, ramosus, teres, glaber.

Folia lata, supra leviter pubescentia, rugosa, ala petiolorum quo-
que serrata. Pedunculi terminalis, teres, pubes-

tes, sex-ociflori; pedicelli umbellati. Calyx viridiluteus & viri-
di-lutescens. Fl. Per. l. c.

base dilatata
connata

involuta \odot foliis ovatis acutis serratis glabris, corollis involutis calycem semiternis
foliis *And. Flor. peruv. l. pag. 15 tab. 23 - fig. a*

Habitat in Patatahuasi nemoribus

Herba glabra - Caulis suffruticosus; Tripedalis, erectus, teres, ramosus. Folia breviter petiolata, rugosa. Peduncululi ex axillis supremis et apice ramorum uniflori. Calyce reflexo. *fl. Peruv. l. c.*

perfoliata 43. Calceolaria foliis perfoliatis spatulato-sagittatis ^{dentato-incisus,} ^{subtus tomentosus,}
caule villosa.

Calceolaria perfoliata; foliis perfoliatis spatulato-sagittatis lin.
Suppl. 86.

Calceolaria perfoliata: foliis perfoliatis sagittatis utrinque
villosis Smith ic. ined. t. p. 4. t. 4

Calceolaria perfoliata; foliis sagittatis dentatis, petiolis alatis per-
foliatis Fl. Per. t. p. 15. t. 21. a. Et herbois

Habitat in Pan, nova Granada. Herb. Guajiri

Tota, exceptis corolla villosa viscosa. Caulis herbacuus, ter infer-
ne parum ramosus, teres. Folia dentato-incisa, dentibus ora-
tis, inaequaliter serratis, supra villosa, subtus dense tomentosa,
venoso-reticulata, viciosa. Petiolis e foliis decurrente alatis,
ala dentata, basi dilatata, connata. Pedunculi axillares oppo-
siti, terminales terni, dipnici & diphylli: foliis ovatis, sessibus
serratis, pedunculi parciales quatuor, intermediis unifloris, later-
ali 2-6 flori. Calycis laciniis ovatis. Corolla lutea.

tomentosa. C. foliis spatulato cordatis perfoliatis subtus tomentosi ^{inqualiter} duplicato serratis

^{caulis glabro}

Calceolana tomentosa. foliis cordato triangularibus duplicato serratis subtus
tomentosis, petiolo cordatis, pedunculis 6. O. floris R. et P. fl. Per. 1. pag. 15. 1. 22. p. 6.

Habitat in umbrosis Termis, Eucheris

Caulis 4 pedalis, erectus, ramosus, teres, glaber herbaceus. Folia lato supra
laeviter pubescentia, rugosa, ala petiolorum quoque serrata. Pedunculi termi-
nales, teretes, pubescentes, sex-8 flori pedicelli umbellati. Calyx viridi cute
siccus

tripartita 44 Calceolaria foliis tripartitis, lobis ovatis serratis fl. per. 1. p. 14.

t. 22. f. a. +

Habitat in nemoribus Panatukas O

Hirsuta. Caulis teres, ramosus. Folia petiolata: lobus intermedius major. Pedunculi terminales cymbosi: pedicelli quinque vel sex, inæuales. Corolla lutea fl. Per. l. c.

lobata C foliis cordatis lobatis ^{peratis} fulvis incano tomentosi, caule dichotomo piloso

Calceolaria lobata caule erecto dichotomo; foliis cordatis, lobatis, tomentosi
Bavan. ii. 5. pag. 26. tab 4 & 3. fig. 1.

Habitat in Regno Peruviano in hinc

Caulis bipedalis pubescens. Solum oppositum, petiolatum, quinquelobum, lobi breves
acuti, supra villosa, subtus tomento ^{pubescente} nullo tecta. Petiolus valde pilosus folio parum
longior. Pedunculi terminales 4. duo laterales biflori; intermedii uniflori
breviores. Calycis lacina ovata, ^{pubescente} bifida. Corolla lutea; labium superius
breve antheras non tegens; inferius longitudinaliter lineatum
Bavan.

pinnata 45 Calceolonia foliis pinnatis Lin. in Act. Mant. 171. Act. Holm
1770. p. 206. t. 0. Part. bot. mag. vol. 4.

Calceolonia foliis & labiosa vulgaris Seville peruv. B. 3. 1. 12. f. 7.

Calceolonia pinnata, foliis pinnatis, caule dichotomo radican-
te Sl. per. 1. p. 14. t. 19. f. a.

H. Sagelia

Habitat in Pen locis humidis. 0

Schwenche in

Act. Bot. Pottersam.
1 p. 473.

Caulis bipedalis, erectus, teres, fragilis, densissime pubescens, basi
radicans. Rami dichotomi. Folia intermediis breviora, supra
pubescentia, pulchra sataseo pellucida rorida, subtus atomis

subviscida: foliola 7 septem - undecim, alterna vel opposita
 serrata, obtusiuscula. Pedunculi & dichotomia & axillis

superioribus, solitarii vel gemini. Corolla flava. Lin. Et Per.

Flor. Per. l. c. ^{et} Variat fo maxime variat foliis ratione loci Sl. Per. l. c.

Lanceolata C. foliis lanceolatis integerrimis subultrifidis, pedunculis terminalibus
uni-floris. Ravon. *Fl.* 5. pag. 27. tab. 444. fig. 1.

Habitat in caulis ^{puberulis} Macloriana, rami oppositi.
Caulis pollicari, basi utrinque ~~ramo~~. Folia radicalia pedicellata, ramea
sessilia, utrinque acuta. Pedunculus terminalis, uniflorus. Corolla lutea

glaucia 46. Calceolaria foliis oppositis ternisque lanceolatis ^{inqualiter} serratis, pedicellis
umbellatis trifloris +
axillaribus terminalibusque subquadrifloris +

Calceolaria glauca; foliis lanceolatis serratis, pedunculis tri-
quadrifloris, corollis maculatis Bl. per. l. p. 17. t. 27. f. c.

Habitat in Canto circuito 3

Caulis suffruticosus, tripedalis, ramosissimus, teres. Rami oppositi
vel alterni, fragiles, teretes; terni leviter pubescentes, subper-
porei. Folia breviter petiolata, patentia, venosa, utrinque
leviter pubescentia, supra glauca. Pedunculi superne: pedi-
celli tres vel quatuor, umbellati, triflori. folium lanceolatum, an-
gustum, ad basin pedunculorum partiali um et pedicellorum. Corol-
la intus basi maculis purpureis Bl. Per. l. c.

Calceolaria glauca foliis oppositis ternisque lanceolatis serratis, pedicellis
umbellatis trifloris + axillaribus terminalibusque subquadrifloris +

Bessilis 47. Calceolaria foliis lanceolatis serratis semiamplexicaulibus nervosis
canescentibus. Fl. per. l. p. 10. +

Habitat in locis aridis Chili;

Caulis suffruticosus, bipedalis, erectus, ramosus, teres, fragilis. Folia
acuta. Pedunculi terminales, longi, umbellati, dichotomi, pedicel-
li longi, uniflori. Fl. Per. l. c.

subtus canescentibus +

Trifida P. foliis cordato ovatis obtuse serratis ~~inferioribus oppositis petiolatis supra~~
mis sessilibus ternis.

Calceolana Trifida foliis cordatis ovatisque crenato serratis, pedunculatis
Trifidis multifloris umbellatis T.C. Penn. 1 p 17. tab. 26. fig 6.

Habitat locis um. brosis prope aquas. *Beuchen*.
Caulis suffruticosus, bi- / tripedalis ramosus, erectus teris, glabris pilis.
Folia supra leviter pubescentia, subtus velli glanduliferi. Pedunculi axilla-
res et terminales: pedicelli umbellati ^{canescentes} quatuor duo laterales tri flori inter
medii uniflori flori pedicellati.

negosa 40 Calceolaria foliis lanceolatis ^{inequaliter} serratis rugosis, pedunculis terminalibus
libri dichotomis. †

Calceolaria Salviae folia, vulgo Phacaul. Seuil. peruv. 3. p. 13. t. 8.
f. 1.

Calceolaria integrifolia, foliis indivisis Lin. in Act. Holm. 1770.
Syst. veg. Ed. 13. p. 61.

Calceolaria negosa. foliis lanceolatis bidentatis, petiolis connatis
alatis, pedunculis dichotomis multifloris Fl. Per. 1. p. 19.
t. 20. f. 6.

Habitat in Chili arvis argillosis. †.

Habitus Sal. officinalis. Caulis suffruticosus, pubescens bipeda-
lis, erectus, inferne ramosus, teres, pubescens. Folia basi attenu-
ata, subtus venosisima. Pedunculi terminaliter, terni, bis vel
ter bifidi: pedicelli solitarii in divisis, ultimi triflori.
Fl. Per. l. c.

lanceiformis C foliis lanceiformi-orati incisio serratis fl. Peruv. 1. pag. 19 Tab. 27.
fig. 6.

Habitat in Peruvia et Tamao alpebus

Caulis bipedalis, suffruticosus, herbaceus erectus, ramosissimus; cortice rimoso siccitate. Rami brachiaci breves; superiores dichotomi, scabi ferruginei, teretes
Folia approximata, petiolata, supra lineata herbata, subtus tomentosa in
margine leviter reflexa. Pedunculi superiores axillares et terminales
oppositi diphylli: pedicelli umbellati 3-4. intermedii uniflori laterales
triflori. Calyx lacinusato, acuto, leviter

salvia folia
integrifolia
neg. al.

~~Calicolaria foliis lanceolatis serratis rugosis, pedunculis ter
minalibus +~~

Calicolaria salvia folis, vulgo Charaul. Deuil. per. 3. p. 13. t.
7. f. 1.

Calicolaria integrifolia; foliis indivisi lin. in Act. Holm. 1770. Syst.
veg. 2. 13. p. 61

Calicolaria vulgo

ros marini folia 50. Calceolaria ^{integerrimis.} foliis linear-lanceolatis margine reflexis
subtus tomentosis, floribus umbellatis.

Calceolaria ros marini folia, foliis linearibus integerrimis
margine reflexis subtus tomentosis, caule glabro ^{mark} Lamour. Dict.
1. p. 556. illustr. 1. p. 52.

Calceolaria ferruginea, foliis linearibus ^{bus} lanceolatis, margine
revolutis, subtus tomentosis: umbelli terminalibus florum termi-
nalibus binis Casan. ic. 5. p. 27. t. 445. f. 1.

^{Est herba}
in Peru. ^{Herb.}
no Gussioi 5

^{in Peru}
~~Habitat in~~ Habitat in ~~solo saxe inundata~~
Cordillanum Chili in solo saxe inundata
Caulis fruticulosus, erectus. Folia sessilia, bipollicaria sul-
tra, cuneata, enervia, glutinosa, supra glabra; rudimenta
ramulorum in axillis. Pedunculi ex axillis superioribus et
apice; longitudine foliorum: pedicelli saepe decem, umbellati.
Calycis glutinosi.

Quamvis caulis glaber in specimine Gussioi, attamen in omni-
bus reliquis tam simili b. ferruginea Casan. ut separare non
audeo, forte quod caulis tomentositatem deponit, ut accidit in aliis

reticulata C. foliis ternis cordatis acutis serratis, pedunculis quadrifloris flor. penur
pag. 17.

Habitata praeruptis Caucis

Octabr., Caudis suffruticosus, erectus, ergyalis, ramifus, teras: rami paleacei coloris, erecto-patuli. Solia omnia reticulato ternis, breviter petiolata. Pediculi axillares, quadriflori sub singulis brachiis pedicellis foliolum unicum fl. p. l. c.

linearis 51. Calceolaria foliis linearibus integerrimis subtus albidis, pedunculis axillaribus unifloris Fl. per. 1. p. 19. †

Habitat in declivibus collium provinciae Xauxa †

Caulis suffruticosus, bipedalis erectus, ramosis bimus, teres, fragilis.

Folia sessilia supra nitida. Pedunculi teretes, pubescentes. Ca-

lyx subtomentosus. Fl. Per. l. c.

Calceolaria foliis lanceolatis integerrimis subnullis pedunculis axillaribus unifloris Fl. per. 1. p. 27. f. 444. f. l. †
Habitat in insulis Martonari.
Caulis pollicaris, subramosus. Folia radicalia pollicaria, ramosa sessilia, utrinque ovata. Corolla rotunda, terminalis uniflora. Corolla l. c.

brevire nata. P. foliis ovatis biserratis subtus tomentosis. Fl. Penns. 1. p. 15. tab. 23 fig.

b.

Habitat in Cuckers nemoribus.

Caulis herbaceus, bipedalis, erectus, teris, ramosus. Solia breviter, palmata
suprema simpliciter serrata ~~lespha~~, ^{oblongales} caetera obtuse biserrata, rugosa. Petio-
li herpiti. Pedunculi terminales, ^{herpiti} solum utroque ad basin pedunculorum,
lespha simpliciter serratum. Calyx villosus

alba 52. Calceolaria foliis linearibus et inversum remote serratis, pedun-
culo internosis dichotomis. †

Calceolaria alba, foliis linearibus denticulatis, racemis longis,
floribus umbellatis; umbellis compositis Sl. per. t. p. 19. v. 27. f. 6.

Habitat in collibus aridis Chili;

Caulis plures, suffruticosi, resinoso-viscosi, simplicis sive ligno-

si, fragiles, teretes, aurei coloris. folia frequentia, angustissima,

sessilia, margine scabra: fasciculi foliorum in axillis. Pedun-

culis elongatus: partialiter oppositi, bis vel ter divisi: pedicellus

solitarius in prima dichotomia; gemini in secunda, ultimi tres:

folium lineare sub pedunculis partialibus et dichotomis. Corolla

alba. Odor Rosmarini Sl. Per. t. c.

4 *integrifolia* C. foliis lanceolatis serratis ^{flor. pedunculis} dichotomis ^{Veronacibus} ~~Smith~~
Calceolaria foliosa folio, vulgo Chataul. Fern. peruv. 3. p. 13.

Tab. 7. fig. 1.

Calceolaria integrifolia Lin. S. V. ed. 13. p. 61.

Habitat in Lima.

Calceolaria nigra: foliis lanceolatis bidentatis; petalis connatis
alatis, pedunculi dichotomi multiflori fl. Peruv. 1. p. 14. Tab.
20. fig. 6

Habitat Chili andis aridioribus

Habitat S. Officialis. Caulis suffruticosus; pubescens, bipedalis ere-
tus inferne ramosis, teres. Folia basi attenuata, nigra, subtus
venosissima. Pedunculi terminaliter terni bis vel ter. bifidi pedun-
culo solitarii ⁱⁿ diversis, ultimi 3 flori
nigra flor. Peruv. Tab. 20. fig. 6. fl. Caran. H. 5.

non vidi

~~in caecata de Manu~~

alternifolia 53. Calceolaria foliis linearibus alternis, pedunculis ~~axi~~ axil-
laribus trifloris. Cavan. s. p. 20. t. 445. f. 2. +

Habitat in regno Peruviano

Caulis erectus, bipedalis, sulcatus, tomentosus. Folia vix pollicaria,
sessilia, margine revoluta, subtus tomentosa. Pedunculi versus summita-
tem: folium utrinque ad basin pedicellorum. Corolla labium su-
perius sensu inferius sensim versus faucem angustatum Cavan.

l. c.

Diversa ab omnibus foliis alternis.

lineans P. folia linearibus, uterinis latis albis, pedunculis axillaribus unifloris
fl. Penn. 1. pag. 19.

Habitat in dactylis collium montis Xauro.

Caulis suffruticosus, bipedalis, erectus, ramis simplicibus, teres, fragilis, lignosus. Folia
sessilia, ut supra nitida. Pedunculi teretes, pubescentes. Calyx subtomentosus

104

encoides 54. Callicolaria? foliis linearibus integerrimis villosis, pedunculis
axillaribus & terminalibus ~~que~~ ^{ex herbario} solitariis unifloris.

Habitat in Pene Herb. Fuscidi?

Textum ramosum, Caulis fruticosus, acutus, inferne glaber, superne vil-

losus. Nervi frequentes & parvi, incani, tuberculati a caelo foliorum.

Folia & sessilia, q. semiunguicularia, opposita: fasciculi foliorum
in axillis omnibus. Pedunculi ex apice ramorum & ramulorum

Polycis folio laciniis ovata, incano. Capsula pubescens.

Flores equidem non vidi, at Capsula ut in Callicolaria

Habitus. Folia in omnibus opposita, excepto n. 53. Reliqua di-
versa in diversis speciebus.

alterni folia C foliis linearibus alternis, pedunculis axillaribus trifloris
Cavan. Ic. 5 pag. 20. tab. 2449. fig. 2

Habitat in regno Peruviano

Caulis erectus, bipedalis, sulcatus, tomentosus. Folia vix pollicaria, margine
revoluta, subtus tomentosa, sessilia. Pedunculi serpsimmitatem; Pedicelli
basi folium utriusque ad basim pedicellorum. Corolla labium superius
brevissimum; inferius faucem serpsim angustatum. Cavan.

Calceolaria. ~~Cor. ringens, inflata. Caps. biloculari, bivalvis. Cal.~~
~~4-partitus aequali.~~

~~45~~
~~44~~ 45 Calceolaria. Cal. 4-partitus. Cor. 2-labiata: labium inferius
in flatum, caliceiforme. Caps. semibivalvis: valvan-
tis 2-fidis.