

# Calea

1. jamaicensis C. floribus subternis pedunculatis foliis ovato-oblongis subseratis petio  
latis
2. oppositifolia C. corymbis congestis, pedunculis longissimis, foliis lanceolatis, caule  
herbaceo
3. amellus C. floribus subpaniculatis, calycibus brevibus, seminibus nudis, foliis ova  
to-lanceolatis petiolatis
4. lobata C. corymbis congestis, foliis alternis superioribus ovato-lanceolatis, inferioribus  
dentato-hastatis, sinuato-seratis
5. sioparia C. caule suffruticoso, ramis suboppositis angulatis, foliis sublineari-bus  
minutis, floribus terminalibus solitariis
6. leptophylla C. foliis linearibus obtusis subtus tomentosis sparsis, floribus terminalibus  
subsesquialibus congestis

<sup>Leptophylla</sup>  
6. Cinerea Pilea foliis linearibus <sup>obtusis</sup> subtomentosis <sup>majoribus</sup> ~~subaequalibus~~ ~~subaequalibus~~ floribus terminalibus <sup>congestis</sup> ~~subaequalibus~~  
+ sub sessilibus.

+ Habitat in nova Zelandia

Trunculus humilis foliis et floribus minoribus. Rami tomentosi cinerei. Folia sessilia, lineari-oblonga, supra glabra. Flores ex apice ramorum cymulosis ~~sessilibus~~ Pediculi breves semi-solida calycina lanicolata glabra

Pilea Leptophylla floribus terminalibus ternis quinisque congestis, foliis oblongis imbricatis integerrimis sessilibus caule lacteoso Forst. prod. n. 287.

an rami oppositi et folia

5 Scoparia Colea cauda suffruticosa, ramis suboppositis angulatis L. Syst. Nat. 3, p. 234 \*

Habitat in Jamaica

Causis partibus scoparii. Rami oppositi. Ramuli alterni oppositi, limi, longitudine subsaequalis.  
Folia minuta sublinearia, obtusa levia. Flores ternales solitarii sessilibus, minuti, albi.  
L. S. N. L. C.

Specimen herb. Mus. <sup>an</sup> ~~est~~ Linnaei, de enumeratione a vero cel. Poyllus  
Scoparium gota. folia cordata acuta, sub ramulis folia minuta obtusa  
quae obtusa

~~mus. Lin.~~

1. Jamaicensis Calca floribus subternis pedunculatis foliis ovato-oblongis subferratis petiolatis  
Lin-Am. acad. 5. p. 404. \* I.V. p. 740.  
<sup>sub ~~nomine~~ nomine Sabitulina</sup>

Santolina subhirsuta, foliis ovatis acuminatis oppositis capitulis axillaribus,  
pedunculis ternatis sessilibus associatis Brown. jam. 315.

Habitat in Jamaica. 5.

Caules angusti, teretes, obsoleta tomentosi. Folia ovato-oblonga, pabra trinervia.  
Flores terminales saepe terni: propriis pedicellis longitudine florum. Calyx imbricatus coloratus. Corolla sanguinea lutea. Statura Phytosoma, sed Pales colorata, longitudine calycis. Semina Pappo coronata. Pappus scaber longitudine floris L. Am. l. c.

2 oppositifolia Pales corymbis congestis, pedunculis longissimis foliis lanceolatis, caule herbaeae L. V.  
pag 740.

~~Santolena subhirsuta, foliis ovatis acuminatis oppositis, capitulis axillaribus, pedunculis  
ternatis~~

Santolena erecta, foliis lanceolatis oppositis f. ternatis, floribus remotis terminalibus  
Brown. Jam. 315.

Santolena oppositifolia Lin. Am. Acad. 5. p. 404 \*

Habitat in Jamaica caulis rigidus sculus simplex, erectus, angustus, striatus, pubescens.

Caulis rigidus sculus simplex, erectus, angustus, striatus, pubescens. Folia opposita  
sive ternata, subpetiolata, lanceolata, integra, triplinervia. Pedunculi ex ul-  
timum et penultimum alii, longi, apice diphylli, terminati. Spicis albis, ovatis,  
subsessilibus, congestis. Semina nuda Pales intermediis longiores Lin. Am. l. c.

4 Lobata Calca conyzae congestis, foliis alternis superioribus ovato-lanceolatis, inferioribus denta-  
to hastatis, sinuato- serratis Schw. prodr. p. 113

Vinca aurea major f. Donia folio sinuato hispido Sloan. h. 1260 t. 152. f. 2.

Conyza arborescens lutea, folio trifido Plum. prec. q. 4: 46.

Sambolnia 2. Brown. Jam. 315.

Conyza lobata foliis inferioribus trifidis, superioribus ovato-lanceolatis obsolete serratis,  
floribus Conyzae Len. S. V. p.

Habitat in Vera cruce, Jamaica &

Rami striato-angulati, pubescentes, sola petiolata, alterna,  <sup>basi attenuata</sup> supra glabra subtus  
inferiora hastato pubescentia. Equae Calycis glabri foliolis oblongis ap. a medio fuscis.  
lobata.

aspera *Q* aspera foliis petiolatis oppositis caulinis deltoidibus lanceolatisque  
caule tetragono <sup>inequaliter serrate</sup>

*Pala* aspera Jacq. coll. 2 p. 290.

Habitat in Amer. merid.  $\frac{1}{2}$

Tota aspera cauli solitarius ab ipsa ramifera 2 pedalis tetragonus ceteris ramis  
adversariis maculatus. Folia opposita, petiolata, caulina deltoidia  
religiosa lanceolata, acuminata, inequaliter serrata, subtriplicemve, versus  
basim bipedalia ad pedunculos alterna. Pedunculi elongati aphylli  
tetragoni terminales ramorum et cauli interdum simpliciter interdum  
ramum divisi. Calyx subtrilocularis squamis lanceolatis. Corolla alba  
antheris nigris. Semina tetragona. Pappus satis paucis cum involucri  
ante maturitatem feminum deciduus. Pala oblonga. Jacq.

carolinica Cal. floribus paniculatis, foliis alternis lanceolatis  
subferatis sesquipedibus Walt. fl. Carol. pag. 200  
Habitat in Carolina

non vidi.



penifolia Calen pedunculis terminalibus congestis, foliis lineari-  
acropis, caule fruticoso. Fr. fl. <sup>pub.</sup> auct. pag 55.  
Habitat

non vidi.